

12
EXAMINATIO

&

EMENDATIO

Mathematicæ Hodiernæ.

Qualis explicatur in libris Johannis *Wallisi* Geometriæ Professoris *Saviliani* in Academia *Oxonienfi*.

Distributa in sex Dialogos.

Authore

THOMA HOBBS Malmesburiensi.

Aug: 31

L O N D I N I,

Excusum sumptibus *Andreae Crooke*, sub signo *Draconis*.
viridis in Cœmiterio *B. Pauli*. 1660.



Clarissimo Viro Domino Verdusio nobili
Aquitano *Χαίρει.*

Charissime Verdusi,

Mitto ad te libellum recens editum,
tibi do, & dedico. Primo, Quia
placuium credo. Mibine, tu-
us, inquires, hominis Hære-
tici? Ne tumultuare. Nihil hic inve-
nies quod non possis sine scandalo Ecclesiæ
tuæ approbare. Geometria, si hæretica est,
tanto forte probabilior est. In doctrinis e-
nim purè humanis, nihil tam Catholicum
est quam Errare. Condonemus ergo mutuò
(ut Homericè loquar *οἱ μὲν ἕρως, σὺ δὲ μὴ*) ea quæ
diversè didicimus in Sacris. Secundo, Quia,
ingenium tuum novi liberum, candidum, a-
cultum.

acutum. Postremò, Quia amicitiam nostram
aliquo modo signatam esse volui, nec alio
potui. Quod tam paucis te alloquar, si id
quoque amicitiae tribueris, facies quod æ-
quum est. Vale.

Servorum tuorum obsequentissimus

Jul. 1660.

THO. HOBBS

Dialogus


<i>Dialogus</i>	<i>Primus.</i>	De Mathematicæ Origine, & Principiis Scientiæ, & de natura Demonstrationis.	page 1
	<i>Secund.</i>	De Principiis traditis ab <i>Euclide.</i>	p. 35
	<i>Tertius.</i>	De Demonstratione Operationum Arithmeticarum & Regulæ Aureæ.	p. 57
	<i>Quartus.</i>	De Rationibus	p. 85
	<i>Quintus.</i>	De Angulo Contactus, de Sectionibus Coni, & Arithmetica Infinitorum.	p. 105
	<i>Sextus.</i>	Dimensio Circuli tribus Methodis demonstrata, quarum prior habet propositiones 25. Secunda 11. Tertia 3. Item Cycloidis veræ descriptio & Proprietates aliquot.	p. 127

Figuræ (præter eas quæ sunt impressæ in marginem)
ad finem cujusq; *Dialogi* reperientur.



ERRATA sic Corrigenda.

PAge 4. li. 27. pro notā se lege notasse. p. 5. l. 27. pro A--² lege A--³.
p. 6. l. 16. pro ipsa lege ipsi. p. 7. l. 9. pro A te lege Arte. p. 9. l. 40.
pro apponere lege opponere. p. 19. l. 2. pro entes lege orientes. p. 20. l. 10.
pro Geometria Arithmetica lege Geometria & Arithmetica, & pro scientia
lege scientias. p. 24. l. 17. pro quod lege quid, & l. 14. pro effectione lege
Affectione. p. 37. l. 10. pro è lege a, & l. 15. pro divisibili lege indivisi-
bili. p. 40. l. 20. pro ita qua lege Itaq;. p. 43. l. 21. dele &. p. 53. l. 3.
pro Rationem lege Rationum. p. 61. l. 26. lege bipedalis bipedali addita. p.
119. l. penult. pro $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ lege $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. p. 123. l. 19. dele quod. p. 170. l. 16. adde
ad finem lineæ n^o 2 ad 1.



Dialogus Primus.

B. **S** Alve mi A.

A. & tu mi B. Quid adfers novi?

B. Novum librum.

A. De qua re?

B. Mathematica.

A. Legisti?

B. Legi.

A. Accuratè scriptum?

B. Accuratissimè; quantum saltem ego judico.

A. Videam quæso. [*Johan. Wallisii Oratio inauguralis, Mathesis universalis sive Arithmeticum opus integrum, & adversus Meibomii de proportionibus dialogum, tractatus Elencticus.*] Quid illud tibi vult, *Mathesis universalis, sive Arithmeticum opus integrum*? Num *Mathesin* nihilo latius patere arbitratum quam *Arithmetica*?

B. Sic dixit fortasse, quod *Doctrinam Rationum* (quæ totam comprehendit *Mathesin*) *Arithmetica* potius considerationis esse judicaverit quam *Geometrica*.

A. Quamobrem autem?

B. Causam quidem non ostendit, sed in *Epistola* dedicatoria illud affirmat, & ad *Geometriam* fuisse relegatam ab *Arithmeticis*, propterea quod sine *Geometria*, magnam in calculandis fractionibus invenerunt difficultatem.

A. Eandemne rem esse censet *Rationem* & *Fractionem*?

B. Ita plane, & id pluribus tum hujus, tum aliorum suorum Librorum locis, disertis verbis asserit.

A. Asserenti tantum, non etiam demonstranti, non est necesse ut assen-

B

tiamus.

tiamur. Sed legamus [*Quantumvis non sim ego prorsus nescius quanto substat intervallo*] Quantumvis Wallisus doctus sit Mathematicus, non est certe Latine linguæ peritissimus.

B. Rogo, quidni?

A. Quia qui dicit *Quantumvis* rem determinandam relinquit arbitrio tuo; qui dicit *Prorsus*, ipse determinat. Itaque *Quantumvis* & *Prorsus* non coherent. *Quantumvis* doctus Latine dicitur, sed *Quantumvis* doctissimus non item. Similiter *Quantumvis* magnus dicitur, sed non *Quantumvis* infinitus. *Quantumvis* & *Etsi*, non idem sonant semper.

B. Negligentia huic, si hoc loco non Oratorem egisset, sed Mathematicum, facile ignosci potuisset.

A. Pergamus. [*Norunt melius quam ut mihi sit opus sigilla im illa repetendo singula immorari.*] Videturne tibi verba hæc Latina esse?

B. Minime sane. Nam dictum oportuit *singulis*, ut & ipse alias loquitur.

A. Erratum ergo est Typographi. [*Unde hic solus selectus fuit qui serenissimam Angliæ Reginam Elizabetham in Græcis litteris instruat.*] Latine hoc?

B. Minime. Erat enim scribendum *instrueret*.

A. Utius est ergo tempore presente pro *præterito* imperfecto.

B. Ita.

A. An & sæpe?

B. Sæpissime.

A. Absolvamus ergo Typographum.

B. Recte. Verum ego illum non laudavi a Grammatica, quanquam ipse alias non intelligere & loqui Latine, dedecus esse censet Academico.

A.] Numeros etiam reperimus ab ipsis mundi primordiis (prout in *etatum Patriarcharum* Catalogo liquet) per *Monadas*, *Decadas*, *Centurias*; apud dispositos, gradibus scilicet, ne inordinata numerorum multitudo & *arctia* laboret calculus, vel quidem nullus omnino sit] Quod iterum tempore presente utatur pro imperfecto, quoniam tu ita vis, prætereo. Hoc tantum a te quæro, utrum ab eo quod *Gen. cap. 5.* ætates Patriarcharum usque ad diluvium per centurias, decadas, monadas numerentur inferri possit, Numerorum nomina eo tempore ita ordinata fuisse.

B. Siquidem caput illud quintum ante diluvium scriptum fuisset, illatio illa esset bona. Sed quoniam vel a *Mose*, vel longo post *Mosem* tempore ab *Esdra* scriptum esse omnes consentiunt, fatendum est bonam non esse.

A. Desideramus ergo in *Wallisio aræstibus* illam logices quam exigimus a Mathematicis [*Mathesis* apud Chaldaeos post Diluvium primo floruisse creditur, deinde apud *Aegyptios*---cum hoc tamen discrimine; Chaldaeorum *Astronomia*, *Aegyptiorum Geometria* celebrata est.] Unde

de scit? Quare creditur? Cui Historico? oportuit nominasse authorem suum. Nam contra, Astronomiam Chaldaeos ab Aegyptiis didicisse author est Historiae veteris scriptor *Diodorus Siculus* in secundae parte Libri primi, sic scribens. *Chaldaeos etiam dicunt, qui in Babylone sunt colonos Aegyptiorum, propter Astrologiam celebrari, quam a sacerdotibus Aegyptiis didicerunt.* Quis hæc conciliabit?

B. Etiam *Wallisium* credibile est, ejus quod hic dicit, authorem habuisse Historiographum aliquem; nam dissentire inter se Historicos mirandum non est.

A. [Et præter varia Theoremata de novo inventa, ipsa inveniendi methodus multum facilitatur. Algebra nempe, sive Analytica usus ultra quam qui veteribus innotuit, jam innotescit.]

B. Quænam sunt illa Theoremata nova per Algebram inventa?

A. Intelligit fortasse ea quæ sunt in *Oughtredi* clave Mathematica. Sed tamen multa illis pulchriora in libro septimo *Pappi*, extant inventa per Algebram, etsi sine Symbolis demonstrata sint; sed neutrius Theoremata alia sunt quam quæ continentur in doctrina rectorum & triangulorum rectilineorum. Falsum etiam est (quod ille inuit) Algebram & Analyticam eandem esse rem. Falsum item Algebram methodum esse inveniendi. Sed hæc posterius magisque suo loco examinabimus. [Astronomia eximie inventis instauratur.] Numerat hoc loco observationem stellarum circa Jovem. Solis maculas. Saturni ansulas. Jovis fascias. Lunæ asperitatem. Sed quid hæc ad Algebram? ne a Geometria quidem aut Astronomo ullo inventa hæc sunt, sed ab illiterato quodam Batavo. Nam illi cui inventio debetur Telescopii, debetur quoque detectio stellarum Jovialium, macularum solarium &c. nonne & tibi sic videtur?

B. Omnino.

A. [Mathematicum studia non modo pro ea quam in se habent veritate colenda esse (qua tamen ipsa per se conspicua & ultra Scepticorum litigia posita animum reficiet valde & oblectabit) sed & quod rerum aliarum cognitioni non uno quidem nomine conducant multum.] Id quod de studio Mathematicæ hic dicit, nonne tibi videtur dici etiam posse de studio Physicæ vel Ethicæ, vel Politicæ, vel denique scientiæ cujuscunque?

B. Non. Nam Theoremata Physicæ, quia actiones naturales præterque sensum fugiunt; Ethica propter voluntatis humanæ inconstantiam; Politica propter Ethicæ ignorationem pauca possunt demonstrari. Præterea, habet Mathematica cetera quædam & indubitata demonstrandi Principia; qualia sunt Definitiones, Axiomata, Petitiones quæ non habet neque Politica, neque Ethica, neque etiam Physica. Quare Mathematicam extra litigia Scepticorum solum eminere rectè dicit.

A. Nonne etiam rationis lineæ ad lineam, vel cujuslibet magnitudi-

dinis ad aliam magnitudinem *ἀνεξέτα* sensum fugit? Potest tamen demonstrari. An non & veræ Physicæ sua inest veritas, quæ vel affirmativè vel negativè enuntiarì potest? Nonne litigat cum Mathematicis non minùs quam cum Dogmaticis Sextus Empiricus *Scepticus*? Præterea non minùs oblectat animum in Physicis, vel Ethicis, vel Politicis inventa veritas, quàm in Geometricis.

B. Imo magis, quanto scilicet in illis sæpius erratur, quam in Geometria.

A. Etiam vocabula quibus in Physica, Ethica, Politica Philosopho utendum est, an definiri non possunt?

B. Possunt.

A. Cur ergo in his magis quam in illis desideras principia? An si assumerentur in Physicis, Ethicis, & Politicis Postulata, Peritionesq; , sicut in Euclidis Elementis Geometriæ, cone firmiores fore demonstrationes esse judicas? Si ita judicas, toto cælo erras. Sunt enim eo infirmiores. Quicquid enim assumitur precariò naturam tollit demonstrationis.

B. Intelligo jam quid dicendum erat Wallisio, si sententiam suam *ἀνεξέτα* voluisset explicare, nempe, scientiam unam altera neq; veriore, neq; evidentiorè esse, sed Doctores alium alio peritiore esse, id est; veritatem magis intelligere, melius demonstrare, a tricis verborum melius cavere, & in illas, si forte incidat, faciliùs se inde extricare posse.

A. [*Vix item maturo magis iudicio quispiam est quam qui rebus hisce exercitati, vel Sophismatum fallacias feliciter det ger, vel Syllogismorum vires justamq; sequelam assequetur.*] Hoc quidem de exercitatis in rebus ipsis verum, sed de exercitatis in libris falsum.

B. Exemplo esse potest ipse Wallisius. Atq; hæc sufficiat notâ se in Oratione Inaugurali, nisi quod præterire non possum ve baillius hæc. [*Quod ego interim non pro forma tantum opto.*] Nam *pro forma* vox est Scholastica, non Latina. Reliqua quæ summi se legi, vulgaria, vilia esse facile cum legebas ipse animadvertisti. Transeamus jam ad Epistolam Dedicatorem.

A. [*Cum quæ in publicum prodeant, pro more scilicet (eoq; satis inveterato) nonnullis inscripta solent prodire.*] Non intelligo hæc. An ille ipse quoties in publicum prodit, inscriptus (*ισχυρος*) prodit?

B. Ad vocem illam Relativum quæ, subaudiendum est, pro Antecedente, non *Omnia*, sed *Scrip. a.*

A. Bene est. Hoc ergo vult, Edicta regum quando publica fiunt, inscripta esse, nimirum ipsorum nomina regum. Et verum est.

B. Ah, neq; sic intelligendum est, sed solummodo de libris.

A. Si se ita intelligi voluit, quàm faciliè scripsisse potuit; *Cum libri qui in publicum prodeunt &c. (non prodeant, ut hic scriptum est.)* Verùm non satis intelligo quid sibi hic vult vox *ca nonnullis*, quæ solitarie posita, sine

sine substantivo semper subaudiam habet vocem *rebus*. Quibus ergo rebus inscribi solere dicit libros?

B. Quibus? nisi nominibus, ut (post *quinq;* aut *sex* versus) ex his verbis *vestra libuit nomina seligere, quibus qui sequitur tractatum duxerim inscribendum*, cuilibet manifestum esse potest.

A. At melius fuisset si præcedentia sequentibus prætulissent potius lucem quam debuissent, sed pergo. [*Id mihi maxime visum est incumbere, ut justissimis votis suis, quantum in me est, satisfaciam.*] Suis hic pro illius (nempe D. H. Savilii) non rectè utitur. Sed nolle te Grammaticam hoc loco examinari oblitus eram. [*Ex quo, inquam hæc (id est Symbolica) introducta est Vieta, Oughtredi, Harriotti, Cartesii ope, quam ingentes feceris profectus Mathesis universa, nemo hisce rebus vel leviter exercitatus ignorare possit.*] Audin?

B. Audio. A. Ne ipsi quidem Analyticae per potestates ascribi possunt, quæ ille hic ascribit Symbolis; nam quæcunq; inveniri possunt per Symbola ista nova, inveniri etiam potuissent per antiquissima Symbola, nimirum verba. Deinde quinam sunt ingentes illi profectus quos fecisse dicit Mathesin universam ope authorum illorum quos hic nominat. Si mihi unam solummodo propositionem indicaveris Symbolicæ hujus ope inventam, præter aliquot Rectangulorum & Triangulorum retilineorum metamorphoses, quæ & ipsæ sine Algebra inveniri poterunt, concedam tibi omnia quæ dixeris, & quanquam per Algebram (ut nonnulli existimaverunt) nullum non Problema solvi posset, nihil tamen hoc ad laudem faceret Symbolorum; idem enim fieri per verba posset. Quæritur quis numerus sit, qui, siue assumens ternarium, siue multiplicans producit idem. Diceret Wallisus. Sit quæsitum A . Quare $3+A=3A$. Et (dempto utrinq; A) $3=2A$. & $A=\frac{3}{2}$. Nonne idem esset si diceremus 3 una cum Quæsto æquari triplo Quæsto, & dñb Quæsta æquari ternario, & proinde Quæsitum æquari $\frac{3}{2}$. Vides ergo Symbolicam istam, quam jaçant nil omnino propter Symbola sed propter solam a supposito ad consequentia ratiocinationem valere; quæ securius aliquanto, & multo magis perspicue perficitur Oratione.

B. At mihi quidem utilis videtur propter Symbolorum breviterem.

A. Quæ ratio? Nonne vim demonstrationum Symbolicè scriptarum quam Latrè memoria tenere difficilius est? Et quanquam Analytica per Symbola brevius scribatur quam Oratione pleni, non tamen clarius, neq; ut a tam multis possit intelligi, partim quod eadem Symbola paucis sint communia, partim etiam quod verba ipsa (non sola Symbola) animo simul percurrenda sunt. Cur autem Arithmeticam speciosam ope Vieta, Oughtredi, &c. introductam esse dicit? Quasi veteris Algebrae notæ, quibus Radix, Quadratum, Cubus, cæteræq;

Potestates significabantur à *Diophanto* non essent Symbola.

B. Quid? Nihilne addidit *Algebrae Vieta*, sed veterum notas cum literis Alphabeti tantum commutavit?

A. Nihil omnino.

B. Sed ipsam Artem sive Methodum, quâ a supposito ad Quæsitum via brevissima pervenitur, quis excogitavit primus?

A. Nescio, nisi verum sit (quod memini me alicubi legisse) fuisse Arabem quendam *Ghebrum*, a quo etiam artem ipsam (si modo Ars sit potius quam casus) denominatam esse *Algebra*. Symbola quidem addere, subtrahere, multiplicare, dividere Binomia, Trinomia, &c. Artis esse fateor, non magna. Sed ut ex supposito inveniat id quod quæritur (nisi in facillimis quæstionibus) id verò pernego. Quid enim Magistri Symbolicæ hodiernæ maximi *Oughtredus* & *Cartesius* Aliud præcipiunt, quàm ut pro Quantitate quæsita supponamus aliquam ex Alphabeto litteram, & inde apta ratiocinatione procedamus ad Consequentia? At si Ars esset, deberent quamnam sit illa apta ratiocinatio ipsa ostendere. Quod cum non faciant, Algebraistæ modò ab uno supposito, modò ab alio incipere, & modò unam, modò aliam viam ingredi coguntur. Adeo ut non minùs fortuito Quæsitum inveniunt quam si quis in cubiculo jussu initio facto a limine diligenter totum cubiculum intentis oculis & animo percurrere inveniret latentem aciculam. Præterea, Logarithmos invenitne *Neperus* ope *Algebrae*? Aut qui Canonem condidit sinuum, Tangentium & Secantium, per Arithmeticam speciosam id fecit? Denique quæ Propositio inventa per *Algebra* non dependet a 16^a 1^a Elementorum *Euclidis*, & a 47^a 1^a ejusdem, aliisq; notissimis Propositionibus quas oportet prius scire quam quis possit uti regula *Algebrae*. Adeo Geometriæ *Algebra* debetur, non illi Geometria. Nam absq; hac, Quæsitum, et si in Equatione contineatur sapissimè ignoratur. Imò verò ipsa *Analytica* per Potestates sive cum Symbolis, sive absq; Symbolis exerceatur, adeò est ex una pars *Analytica* universalis, ut nullus ejus, neq; in Angulis, neq; in Circulis, neq; in Solidis usus sit, sed solummodo in Parallelogrammis Rectangulis, & Triangulis Rectilineis. Etiam in his, hoc tantum præstat, ut id quod in (illarum quas modo dixi Propositionum) verborum involucri continetur eruere valeamus. *Analysis* enim per potestates, non procedit ab effectu ad causam, sed ab una proprietate ad aliam, non (ut est natura causæ) priorem, sed ab eadem causâ genitam. *Analytica* ergo hæc res admodum angusta est, quanquam ad Trigonometriam in rectis lineis exercendam non omnino inutilis; verum ob magnam multitudinem Symbolorum, quibus hodie oneratur, unâ cum falsa opinione quod plus valeat ipsa Methodus quam revera valet, pro peste Geometriæ habenda est. Inde enim est quod investigatio causarum (a qua sola sperari potest scientia) negligitur, nimirum, propter spem factam a parum

parum acutè videntibus Magistris, posse per Arithmeticam speciosam nullum non Problema solvi; cum tamen Problemata, quæ veteres solvere non potuerunt, ad hunc usq; diem maneant insoluta. Jam si quid contra hæc dicendum habeas audiamus.

B. Nihil contrà dico. Etsi enim multi hac methodo in Problematis solidis usi sint, in eo tamen processus eorum semper desinit, ut pronuntient Problema, cujus constructionem querunt per eam Geometriam quæ nunc extat, esse insolubile, atq; adeo opus esse ad constructionem ejus quibusdam aliis lineis quæ nulla A te accuratè duci possunt.

A. Legamus ergo ulterius, [partim etiam quod Arithmetices pomaria tam stricta fecerint, ut veris numeris (rationalibus scil. & quidem integris) coercesantur.]

B. Prævideo hic quid reprehensurus es.

A. Quid?

B. Quod Arithmeticam versari putet circa aliud præter numeros. Nam qui numerus verus non est, omnino non est numerus.

A. Rectè. Sed & illud quoq; reprehensurus eram, quod explicet qui sint verè numeri per *Rationales & quidem integros*, nam numerus ad numerum irrationalis esse, non potest, quoniam omnes meretur unitas. Quem ergo ille numerum non verum, & alii *sursum* dicunt, quantitas continua est, & pertinet, non ad Arithmeticam, sed ad Geometriam. Præterea non rectè a veris numeris distinguit Fractiones: quanquam enim soleant appellari Numeri Fracti, non tamen numerus frangitur, sed res in rerum numerum. Itaq; duæ unciæ non minùs numerus verus est, quam duo Asses. Desideratur ergo hic *ἀριθμητικὴ* illa quæ tam necessaria est Geometria, quam intelligere & loqui Latine Academico. Sed pergo [Ut reapse ostendam etiam Geometrica Problemata (quatenus saltem a positione sive locali situ abstrahunt) a Principiis Arithmeticis vel maxime dependere. Et quidem eo usq; abesse, ut ad Problemata sive Theoremata purè Arithmetica statuminanda (quod tamen non raro factum video) Geometricæ plane demonstrationes sint huc forinsecus advocandæ, ut contra quæ Geometrica habebantur simplicius quidem & universalius ex purè Arithmeticis, adeoq; universalibus demonstranda videantur.] Prætereo in gratiam tuam quod vox *abstrahunt* hoc in loco Scholasticum sit, Latinum non sit. Sed rogo te ubi probat id quod hic dicit?

B. Probant ipsius per totum hoc opus a Principiis Arithmeticis demonstratæ conclusiones Geometricæ.

A. Id ergo videbimus inferius. Interea verò mirari mihi liceat visum esse necessarium *Euclidi* numeros alios planos, alios solidos appellare, & tam multa de illis demonstrare. Numerus enim, neq; superficies est, ut possit propriè dici planus, neq; corpus, ut possit vocari, solidus. Sed forte *Euclides* numerum à divisione continui, & demonstrationes Arithmeticas.

meticas, a Geometricis, non contra (ut *Wallisius*) derivavit. Distulit ergo Theoremata Arithmetica ad Elementum septimum ut in illis demonstrandis imitaretur demonstrationes quasdam quæ sunt in Elementis Geometricis Antecedentibus. Itaq; noni Elem. propositiones 18^a & 19^a fundantur in 16^a & 17^a Elem. 6^a Item decem primæ propositiones Elem. 2^a in numeris demonstrari possunt, Sex posteriores non possunt propterea quod non omnes Lineæ sunt commensurabiles. Ostendat tibi *Wallisius*, si potest, duos numeros, quorum major ad minorem eandem habeat rationem quam majus segmentum Lineæ divisæ extrema & media ratione, ad segmentum minus; vel quam habet quadrati Diagonalis ad latus. Ipsum latus appellabit fortasse *numerus*, sed ut te fallat, non scribet *latus* sed *l*. vel *p*, vel aliud aliquod Symbolum. Coge igitur illum numeros suos eloqui. Dicit credo numerum alterum saltem esse surdum. *Surdum* autem est quod effabile non est. Jam si series proponatur numerorum ab unitate incipientium, & unitate crescentium infinita, nonne in illa serie numeros omnes contineri putares?

B. Certe.

A. Aut ullum eorum esse ineffabilem?

B. Nullum.

A. Nullus ergo numerus, surdus est. Sed pergamus. [*Quod autem vel Philologica vel etiam alia Philosophica Mathematicis immiscuerim; partim illud ad subjecti explicationem commodum videbatur, partim etiam condimenti loco, &c.*] Quid illud est quod apparat Condimenti Scientiæ per se jucundissimæ; An *γελοιοποιον* an *γελοιον* a^urus est?

B. Nihil minus. Nam per Philologica ea intelligit quæ continentur in Cap. 6. & quibusdam sequentibus de Etyologiis nominum numeralium Latinorum plena ingenii, qualia sunt, Latinorum vocem *unum* derivari a Græco ἓν; *duo* a δύο; *tres* a τρεῖς; *quatuor* a τέσσαρες, *πέντε* a πέντε, & hoc a τέσσαρες; *quinque* a πέντε, posito *quin* pro πν & *quo* pro π.

A. Unde hæc conjicit?

B. Nescio nisi a congruitate literarum.

A. Non est inter ἓν & *unum*, neq; inter *quatuor*, & τέσσαρες, neq; inter *quinque* & πέντε magna affinitas literarum, & quilibet etiam puer tantundem conjicere potuit.

B. Deinde *Bellum* (inquit) a πόλεμος fortasse dictum est. An tantundem conjiceret etiam puer?

A. Minimè. Non est enim derivatio illa neq; vera, neq; verisimilis, sed ridicula condimenti causa.

B. Exemplum a simili derivari dicit, ideoq; non exemplum sed *exemplum* debere scribi.

A. Quidni & *exsero* pro *exero*, & *exsisto* pro *existo*, & *exsuo* pro *exuo*, &

& exsequia pro exequiis, & similia multa scribi jubet, qualia nemo Latinorum unquam scripsit? Eadem enim est ratio in his, quæ in *Exemplum*. Cr. do sperasse illum novitate hac fore olim ut distingueretur ab indoctis hominibus hujus seculi. Sed errat: sicut enim nullius *exemplum* secutus est ille, ita nemo illius *exemplum* est sequuturus. Sed quanam sunt ea quæ appellat *condimenta Philo sophica*?

B. Nescio, nisi ea intelligat quæ disseruit de natura Mathematicæ, & de natura Demonstrationis.

A. Pergamus ergo ad reliqua Epistolæ Dedicatoriæ. Excusans se quod tardius prodieris liber ejus quam speraverat, [*Interea (inquit) temporis bis occurrebat castigandus Hobbins; Latini è primum, Elencho meo in ipsum edito, quo ipse in Libro de Corpore ἀνομομαχία castigatur, & f. flus reprimitur; deinde & Anglicè, ob scriptum ipsius Anglicanum contritiis factum, quo scurram agit, &c.*]

B. Hoc habet mercedis ob Politicam suam (Leviathan.)

A. Fortasse *Wallisius* contra illum iratus scripsit, & tanto asperius, quanto liber ille Hominiibus honestis magis placuit. Sed videamus an in hoc libro *Wallisii* nihil sit quod mereatur castigari.

A. Accedentibus jam ad ipsum opus Mathematicum, ubi orationi scientificæ debitam *ἀκριβειαν* exigere non modo iniquum non est, sed etiam necessarium, quicquid non accuratissime dictum, id liberum erit reprehendere. De rebus enim quarum scientia certa esse potest, idem est non accurate, & false dicere. Itaque qui propter inscitiam scribere vel disserere accurate nesciunt, quoties reprehenduntur, hac defensione uti solent, non esse litigandum de verbis, ubi res constat; cum tamen de veritate rei, nisi accuratissimis verbis constare non possit. Non moror ergo homines illos ambitiose graves, qui propriæ imperitiæ aliorum prætendunt *λογωμαχίαν*. Quasi aut esset disputatio aliqua, quæ *λογωμαχία* non esset, aut veritas aliqua, quæ non esset verborum veritas. In quocumque igitur libro, de quacumque scientia, hujusmodi verba inveneris, *vera est hæc λογωμαχία: non placet, dum de re conflet, de verbis litigare*, pro certo habeas scriptorem illum scientiæ quam tractat imperitum esse, ignorantiamque suam gravitate (ut videtur ipsi) sententiolæ velle tegere. Nec molestum tibi sit, si quicquid, sive in dictionibus hujus authoris, sive ratiocinatione, *ἀκριβεια* debita carere videro, notavero, eâ saltem lege, si quomodo eadem *ἀκριβεις* enuntianda sunt, simul docuero.

B. Non iniquum postulas.

A. Præterea in Philologicis illis (ut vocat) condimentis, postulo ut liceat mihi conjecturis illius apponere conjecturas meas.

B. Neque hoc iniquum est.

A. Inscrībatur Caput primum de *Mathesi* in genere, & de Objecto & Distri-

Distributione ejus. Videamus ergo quàm sit accuratum. [*Disciplina Mathematica dicuntur omnes illa sive Artes, sive scientia, qua circa Quantitatem peculiari modo versantur, sive Continuum, sive Discretam.*] Tunc Definitionem hanc censere esse accuratam?

B. Ego verò satis. Et si vox illa *peculiari modo*, nisi ex sequentibus non facile intelligitur.

A. Expone ergo verba illa ex sequentibus.

B. Intelligit Quantitatem *peculiari modo*, id est, strictiore sensu, prout ad numerum & magnitudinem restringi solet.

A. At intelligi ita non possunt. Nam *versari circa Quantitatem, sive Continuum sive Discretam* (quæ eadem sunt cum Magnitudine & Numero) posita sunt in ipsa Definitione?

B. Minime. Nam in definitione per *Quantitatem continuum* intelligit solam quantitatem Corporum, nempe Lineam, Superficiem, & Solidum, exclusa quantitate Temporis, Loci, Motus, & Ponderis. Per *Quantitatem autem discretam* (exclusa Oratione) solum Numerum, propterea quod Tempus, Locus, Motus, Pondus, *vix ullam* (inquit) *subiungunt speculationem Mathematicam, nisi ad modum vel Magni, vel Multi considerantur.*

A. Videtur sane non bene intelligere *Wallisius*, quid sit ipsa quantitas. Neque id mirum est, cum nemo Geometrarum illorum, qui ante ipsum fuerunt, tradiderit quantitatis Definitionem; ipse autem examinatione nulla, sed tantum lectione, suam fecerit Geometriam alienam.

B. Quomodo autem quantitatem definis tu?

A. *Quantitas est per quam querenti de qualibet re quanta sit, apte respondetur; sive (quod idem est) per quam cuiuslibet rei magnitudo determinatur.* Verbi causâ, longitudine propositâ, quæro quanta ea sit. An responderi aptè putas *longitudinem esse*, An potius quod sit tanta, quanta est *Ulna*, vel quanta est aliqua alia mensura vel mensuræ; vel quod sit ad longitudinem expositam in hac vel illa ratione? Similiter si quæstio fiat de superficie, vel solido, non apte respondebitur, nisi per mensuram aliquam vel comparisonem cum aliquo mensurato. Alioqui querentis animus nihil habet (in quo acquiescat) determinatum. Non sunt ergo longitudo, superficies, solidum, *Quantitates ipsæ*, sed *Quanta*, vel potius sine scholarum etiam antiquarum barba iis, *Tanta*.

B. Nihil video propter quod hæc non sint accurate dicta. Sed quid inde inferis?

A. Istuc infero, Tempus, Locum, Motum, Pondus, non minus proprie quantitates dici, quam Linea, Superficies, & Solidum. Cum enim neq; hæc neq; illa quantitates sint, sed *quanta*, æque sunt utraq; quantitates. Cumq; tam illa quam hæc quantitatem habeant, sunt æque utraq; quanta. Quare in Definitione hac *Matheos universalis*, nihil est

est neq; *duplis* neq; *triplis*. Multa habet *Archimedes* in Libris suis per Motum, & Tempus demonstrata, quæ tamen ne *Wallisius* quidem ipse credo negabit esse & bene demonstrata & pure Mathematica.

B. Quid *Wallisius* negaturus sit nescio. Sed Tempus, Locus, &c. mihi quidem videntur Quantitates non minus proprie dictæ, quam Magnitudo, & Numerus; nec quantitas a Magnitudine aliter distingui, nisi quod per quantitatem intelligimus determinate Tantum; Magnitudo autem vox sit indefinita. Video item alteram post adhibitam mensuram, comparisonemq; cum alio actu semper dici; alteram non semper. Sed desidero adhuc Definitionem *Mensura*. Mirandum enim esset, si qui Geometriæ (quam sine mensuratione assequi nemo potest) prima Principia posuit *Mensuram* nusquam definisset.

A. Definitio *Partis* (*subaudi aliquota*) tradita ab *Euclide* initio Elementi quinti paucis mutatis erit Definitio *Mensura*. Est enim *Mensura Magnitudo una alterius, quando ipsa vel ipsius multipla alteri applicata cum ea coincidit.*

B. Definitio hæc fere eadem est cum Axiom. 8. El. 1^a. *Euclidis*. Nam videmus quotidie omne genus rerum per *iquosiv* mensurari. Sed plerumq; repetitam.

A. Definitio ergo hæc, cum sit mensurationis quotidianæ descriptio accurata, ipsa quoq; Definitio accurata est. Quænam autem sunt quantitates illæ quas *discretas* vocat?

B. Numerum & Orationem.

A. Scio. Sed quid significat vox ea *discreta*?

B. Ponitur hoc loco pro *interrupta*, sive *intercisa*. Exempli causa, *Euclidis* in prioribus quidem sex Elementis Diagrammata ex lineis constant perpetuis, sive continue ductis, quibus exponitur lectori quantitas continua; deinde in tribus Elementis sequentibus lineis usus est punctim designatis, sive lineis intercisis, ut exponeret quantitatem *numeri*.

B. Videtur ergo *Euclidi* origo Numeri consistere in divisione Integri continui.

A. Certissimè.

B. Sed *Wallisio*, contra, ex compositione *Unorum*.

A. Quanquam is qui primis numeravit, utrum corpus corpori appositum, an in corpora divisum, nihil referat; posterius tamen verisimilius est, nisi putem illum, hominem unum vocasse, *unum*, deinde unum hominem & unum arborem *duo*, item unum hominem, & unum arborem, & unum monrem, *tres*, & sic deinceps. Numerus enim absolute dictus supponit in Mathematicis unitates ex quibus constituitur inter se æquales, æqualitatem autem unitatum in quantitate oriri, nisi a divisione integri continui in partes æquales, vix potest cogitari. Utut tamen

hoc sit, nisi numerus consideretur ut sic ortus, *Scientia Arithmetica* fere periit. Nam ex additione unum acutum Theoremata Arithmetica valde pauca, ex divisione continui omnia possunt demonstrari. Deinde *Oratio*, cur ponitur (primo) inter quantitates? An quia *Oratio* una quam alia longior esse potest? Quare ergo non potius ponitur inter quantitates Genus ejus, nempe Sonus, Nam & sonorum alius est longior, alius brevior. Cur non tunc etiam litatus, rudi us, mugitus quantitates, & quidem discretæ? Deinde cur est *Oratio discreta quantitas*. An quia dividitur in verba? Si ita sit, quidni sonus tubæ dicetur quantitas continui?

B. Orationem esse *Quantitatem*, & quidem *discretam* dicit *Aristoteles*.

A. Credo. At non nunc quarimus quid sit *Aristotelicum*, sed quid sit τὸ ἀριθμῆς. [*Tempus tractat Astronomia*.] Tractat quidem, sed an ut Tempus? Proprietatemne Temporis ulli demonstrant Astronomi? Ut loquerentur de Tempore necessarium erat propter Motum. Annum, Mensem, Diem, Horas, & Horarum minuta prima, secunda, &c. Desiniunt Astronomi, non ad Temporis Proprietates, sed Partes cognoscendas, quæ motu corporum Cælestium distinguuntur. [*Item Chronologia*.] Chronologia Historiæ quidem, sed non scientiæ pars est. [*Locus autem in Steriometria quantum ad ejus capacitatem*.] Quid quæso interest inter loci capacitatem, & loci magnitudinem?

B. Plurè nescio.

A. Sed verebatur, puto, ne si dixisset Magnitudinem, etiam Locum ad quantitatem proprie dictam, quem ante inde expulerat, videretur reduxisse. [*Orationem tractat Musica*.] An ut Orationem, an ut Sonum? Ut sonum certe (qualis est Musica hodierna,) quanquam hoc fortasse rectius dixit quam sensit. Nam antiquitus tum verba tum Modos componere ejusdem erat Artis Musicæ. [*Motus autem & Ponderus in Mechanicis præsertim considerantur*.] Quid? An Mechanici opus esse putat demonstrare? vel Motus & Ponderis nullas esse proprias passiones quæ demonstrari possint. Quis nescit omnia quæ rectè fieri Mechanicus fieri ex præcepto & secundum regulas Mathematicorum? Mathematici ergo est ut aliam quantificationem, ita etiam Motuum & Ponderum rationes demonstrare. Vides igitur quid crassitudo sit *Wallii* Professoris, & ab *Alexandria* *Chrysostomus* aliena. Sed Doctorem inam Rationum omnem fuerit considerationis esse vel Arithmeticæ, vel Geometricæ; neque nescit credo ipsis Rationibus suas esse certas quantitates; nam una Ratio major alia vel minor esse potest. Est ergo Ratio quantitas proprie dicta, etiam ex Doctrina illius. Respondeat mihi jam, utrum numerus sit Ratio? Negabit puto. Qui sit ergo ut tractetur in Arithmetica, & lo-

lâ quidem, ut ille vult? Rursus utrum Ratio sit Linea, vel superficies vel solidum? nihil horum; vel quantitas continua, vel discreta? neutram dicit. Qui sit ergo ut tractetur in purè Mathematicis?

B. Si Ratio, neq; continua quantitas, neq; discreta sit, non videtur saltem mihi, omnino esse quantitas.

A. Quid ita? Si quis quantitatem omnem *continuum* vel *non continuum* esse diceret, necessarium faceret ut omnis quantitas alterutra earum esset. Sed non idem sequitur ex divisione in *continuum*, & *discretam*. Itaque ut Rationem ad aliquod quantitatum genus referam, quantitas dividenda est in absolutam & Relativam. Absoluta est Longitudinis; Superficieci, Solidi, Temporis, Motus, per se considerata quantitas. Relativa est, qua determinatur quanta sit qualibet dictarum Magnitudinum ut comparata cum alia ejusdem generis. Deinde absoluta quantitas alia est corporum, ut Longitudo corporis. Alia Temporis, ut Longitudo Temporis. Alia Motus, ut Velocitas & Pondus. Item Rationum alia est Geometrica, alia Arithmetica.

B. In quo ergo genere, ponis Rationem Numeri ad Numerum?

A. Rationem tam Geometricam quam Arithmetica dividam in Rationem rei ad rem, & Rationem rerum ad res? Putasne in ullo alio quantitatum genere collocari oportere Rationem duarum ulnarum ad duos palmos, quam in qua collocatur ratio unius ulnæ ad palmum unum? Aut Rationem plurium ad plura aliam esse speciem Rationis quam unius ad unum? Aut aliam quidem esse speciem quantitatis tres ulnas, aliam autem unam ulnam? Aut denique Rationem unius ulnæ ad tres ulnas, non eandem esse quam habet unum ad tria?

B. Sunt quidem hæc ita manifesta, ut mirandum sit *Aristoteli* Quantitatem discretam nominasse. Est enim Ratio numeri ad numerum nihil aliud quam Ratio partium aliquotiarum quantitatis continuæ ad quantitatis continuæ partes aliquotas, (& inter se & illis) æquales. Itaque (ut more meo cum *Aristotelicis* loquar) sicut calor a calido abstrahit, ita numerus abstrahit ab inæqualitate partium, dum considerantur partes non aliter quam quatenus plures.

A. Rectè. Sed discedis jam a libris.

B. Quidni?

A. Procedamus ad alia [*Quamquam autem hæc omnia in disciplinis Mathematicis tractentur, non tamen per se & primario; sed quasi unus vel Mensurantur vel Numerantur.*

B. Ne mihi quidem hoc placet, propterea quod Geometriam ipse definit inferius scientiam esse magnitudinis quatenus est mensurabilis, & Arithmetica scientiam esse Numeri, quatenus numerabilis. Itaque Magnitudo & Numerus non melius jure, ex illius sententia quantitates sunt propriè dictæ, quàm illæ alteræ Locus, Tempus, Motus, &c.

A. Vides ergo necessitatem circa scientias loquendi ubique ἀκριβῶς. Nam qui ita non fecerint, obliiti eorum quæ scipsierant, neque habentes ipsi Ideas rerum cogentur sibi metipsis turpiter contradicere.

B. Da quaeso scientiæ, quam appellant Mathematicam, Definitionem aliquam accuratam.

A. Mox faciam. Legamus interea rationem ipsius nominis *Mathematica* apud Wallisium; & quare videtur illi, impositum esse solis Geometriæ & Arithmeticæ. [Si de Mathematicum sive Matheseos nomine queratur, cur hac appellatione insigniantur illæ Disciplina, ideo fortasse fuit, quoniam Mathematica apud multos quidem sola, apud alios Antiquorum primo ante alias disciplinas loco eâ, cecebantur; atque nâs ἔτι μὴ μαθηματικά dicta, quia μαθηματικά. Quoniam hæc ait fortasse ita esse, nos quoque fortasse aliter esse non minùs probabiliter affirmare possumus. Fortasse ergo fuit quod veritas Theorematum circa Magnitudines tantum et Numeros antiquis docebatur, & propterea a Magistris discipuli eam μαθηματικά, id est didicerunt, intellexerunt, perceperunt, id quod sine summa evidentia facere non potuerunt. De aliis rebus sine Principiis manifestis, & sine accurata ratiocinatione, in porticibus & ambulacris a sedentibus ambulantisve Scholasticis, id est, σοφιστικῶς differebatur, quemadmodum nos nunc differimus per fortasse. Et quidem si propter hoc dicebantur Mathematica, non est difficile universaliter definire quid sit Mathesis. Est enim Mathesis cognitio veritatis per demonstrationem.

B. Scientiæ ergo juxta tuam definitionem sunt omnes Mathematicæ. Cur ergo Græci non omnes scientias sic vocabant?

A. Annon omnes sic vocabant, quæ traditæ erant demonstrativè? Nam quæ Theoremata demonstrata habuerunt Græci veteres præterquam circa quantitatem?

B. Puto nulla.

A. Vides ergo causam cur illæ scientiæ, quarum subjectum est quantitas solæ habitæ sunt ab Antiquis Mathematicæ, & sic appellantur etiam hodiè. Itaque si illo tempore doctrinæ, Moralis & Civilis, fuissent demonstratæ, cur non credam & illas pro Mathematicis haberi potuisse? Non enim subjectum, sed demonstrationes faciunt Mathematicam.

thematicam. Transiit jam ad scientiarum Mathematicarum species. [Sunt autem disciplina Mathematica alia Pura, alia Mixta. Puras dicimus illas quæ Quantitatem absolute consideratam tractant, prout a materia abstrahitur. Mixtas autem illas appellamus in quibus præter considerationem Quantitatis (sive multitudo illa fuerit, sive magnitudo) etiam subiectum cui in se connotatur. Hæcne tibi videntur dicta esse accuratè?

B. Ita.

A. An non qui quantitatem considerat, considerat eam prout abstrahitur a materia? An vox *Quantitas* abstracta non est a concreta voce *Quantum*? Quænam autem est ea scientia quæ non modo quantitatem considerat, sed etiam subiectam ejus? Quasi subiectum non consideraretur tunc, quando considerantur ejus accidentia. Cujus quæso scientiæ subiectum est, sine Accidentibus consideratum corpus?

B. Nullius. Neque dicit ille subiectum cum quantitate sua considerari, sed connotari.

A. Si connotari non sit considerari, qui fit ut solâ quantitate consideratâ scientia appelletur Mixta? Video eum nihil hic videre. Scribit quæ didicit puer. Scientia enim quemadmodum subiectum ejus (nempe mundus) non dividitur (per puram & mixtam) in Species, sed in partes, eo modo qui dicitur infra, postquam legerim hujus Capituli reliqua. [Verbi gratia, ubi in *Arithmetica* traditur bis duo quatuor efficere, numeri hic seorsim considerantur, & abstractim ab omni materia subiecta.] Vide quæso hominis negligentiam doceri dicentis in *Arithmetica* bis duo efficere quatuor. Si doceatur hoc in *Arithmetica*, etiam in *Arithmetica* demonstratur. Quis hoc unquam demonstravit aut demonstrare conatus est, aut ex Principiis *Arithmetico*rum nunc positis demonstrare potest? Ne assumeret quidem ut *Communis* notio, neque ut *Petitio*, sed a pueris domo affertur. [In aliis secus est. verbi gratia, cum docet *Astronomia* *Aequatorem* & *Zodiacum* se mutuo in binis punctis secare,] *Astronomia* illud non docet, neque opus proprium *Astronomi* est illud demonstrare, sed *Geometræ*. Observat *Astronomus* duos solis motus, Diurnum & Annuum, in duobus fieri circulis maximis, deinde, ut *Geometra*, investigat quem faciunt Anulum. Itaque omnia fere Theoremata *Astronomo*rum demonstrata sunt a *Theodosio*, *Menelao*, aliisque *Geometris*, qui scripserunt de sphaera. [Est enim *Arithmetices* subiectum purius quiddam & magis abstractum quam subiectum *Geometriae*.] Neque verum est hoc, neque rationem propter quam verum sit, aut is aut alius quicquam unquam attulit. Deinde *Longimetriam*, *Planimetri-*
am,

am, & Stereometriam numerat inter Mathematicas Mixtas; cum tamen Longitudo, Superficies, & Solidum sint per suam ipsius distributionem Geometriæ puræ subiectum adequatum. [*Neque interim Mechanicæ & Architectonicæ obvisandum est. Quarum utraque (præsertim Mechanica) Geometricas Mensuras ita ad molem corpoream applicat, ut & interim Ponderum & Virium Metricum rationem habeat.*] Rursus Mechanicam annumerat scientiis, quasi Mechanici esset demonstrare. Mirum ni & Calceamentaria Mathematicis Mixtis annumeranda sit, quia metitur pedem.

B. Antequam transeas ad Cap. II^m præsta quod promisisti scientiarum distributionem & singularem Definitionem accuratas.

A. Cum scientiæ nec sine ratiocinatione acquirantur, neque in ratiocinatione locum habeant voces ambigæ, quales sunt Metaphoræ, & totum Toporum genus, antequam accinamur ad ratiocinationis opus, nempe scientias, discamus oportet accurate loqui, id est, præfini-
tò loqui.

B. Quid illud est præfini-
tò loqui?

A. Præfini-
tò loqui, est vocabulis nri prædefinitis, præsertim illis ex quibus constare debent conclusiones demonstrandæ. Sunt enim Definitiones Principia scientiarum sive propositiones in demonstratione omnium prius, quæ nisi accuratæ sint, quæ sequuntur sunt omnes incertæ erunt. Accuratè autem definire, dependet ab intellectu Voci, ab observatione quomodo significationes earum pro diversitate circumstantiarum variantur, & quid sit quod in omni illa significationum varietate est commune; nam id quod per vocabulum aliquod ubique intelligitur, illud est significatio ejus accurata. Quod si necessarium aliquando fuerit, ut vocabulo utamur novo, facile est illud definire, id est, quid nos verbo nostro intelligi volumus explicare. Itaque hoc recte facere ante omnes scientias discendum est. Et hæc quidem sive Peritia, sive Prudentia recte definiendi, quæ acquiritur experientia circa verborum usum, vocatur *Philosophia Prima*.

B. Supponimus autem hominem ratiocinari accurate jam posse. Quæro quot sunt scientiæ, & quomodo per Definitiones proprias aliæ ab aliis distinguuntur?

A. Una est omnium rerum scientia unive-
salis, quæ appellatur Philosophia, quam sic definio. Philosophia est *Accidentium quæ apparent, ex cognitis eorum Generationibus; & rursus ex cognitis Accidentibus, Generationum (quæ esse possunt) per rectam ratiocinationem cognitio acquisita*. Quarunt enim Philosophi omnes circa rem cognitam, vel quid ab ea produci potest, vel unde ipsa produci potuit. Quot sunt ergo rerum species tot sunt Philosophiæ totius partes sive scientiæ particulares.

B. Sed

B. Sed qua Methodo distinguenda sunt ?

A. Eadem qua distinguuntur ipsa Phenomena sive accidentia quae apparent, nimirum, incipiendo a maxime communibus.

B. Quae sunt illa ?

A. *Magnitudo & Motus.* Et quoniam haec in omni corporum actione effectum partim producant, ut *Motus*, partim augent vel minuunt ut *Magnitudo*, prout major est vel minor, scientia in qua determinantur magnitudines, tum Corporum, tum Motuum primo loco ponenda est. Nam primo loco discenda est, quippe quod sine illa cetera acquiri non possunt.

B. Scientia haec quomodo appellatur ?

A. *Geometria.*

B. Defini Geometriam.

A. *Geometria est scientia determinandi Magnitudines.*

B. Breviter quidem satis, sed parum perspicue. Non enim intelligo quid sit *Magnitudinem determinare.*

A. *Magnitudinem determinare idem est quod ostendere quanta sit.*

B. Quomodo autem ostenditur vel cognoscitur *Magnitudo* exposita quanta sit ?

A. Comparando eam cum *Magnitudine* alia mensurata, vel quae habeat ad mensuratam rationem cognitam. Itaque *Geometria* definiri potest sic, *Geometria est scientia per quam cognoscimus Magnitudinum inter se rationes.* Sed quoniam ex cognosci non possunt, nisi exposita sit quantitas aliqua per mensuram cognita, juxta quam cetera possunt aestimari, *Definitio Geometriae* clariore sit sic dicamus, *Geometria est scientia determinandi Magnitudinem, sive Corporis, sive Temporis, sive rei cujuslibet non mensurate, per comparationem ejus cum alia vel aliis Magnitudinibus mensuratis.*

B. Exquisite hoc. Et quoniam *Magnitudo* continua quaelibet data dividi potest in partes quotlibet aliquotas (ratione ejus ad quamlibet aliam non mutata) manifestum est *Arithmeticam* in *Geometria* contineri. Sed cupio etiam definitionem audire *Arithmeticae* seorsim a *Geometria.*

A. *Arithmetica est scientia determinandi multitudinem rerum non numeratarum, per comparationem cum numerata vel numeratis.* Itaque qui de quantitate loquens continua, *Geometria* est, idem de eadem loquens quantitate, ut divisa in partes aliquotas, est *Arithmeticus.*

D

B. Assentior.

B. Assentior. Progredere ad alia.

A. Proximo loco poni oporteret *Physica Universi* (siquidem ab homine acquiri posset) qua determinaretur Magnitudo & Motus universi tanquam corporis unius, & quæcunque inde consequuntur. Tertio loco succedit scientia qua determinantur corporum Cælestium visibilibus (id est stellarum tum fixarum, tum Planetarum, comprehenso etiam Globo Telluris) & Motuum, quibus eorum unumquodque fertur Magnitudines; appellaturque Astronomia. Quarto scientia qua Motus corporum invisibilium determinantur, a quibus Calor, Frigus, Lumen, cæteraque qualitates generantur, & operationes non visæ, gradusque earum sunt. Vocatur autem *Physica*. Deinde ad Astrorum partes venientes (id est ad partes Globi Terrestris (nam Astrorum sublimium partes non satis percipimus) infinitæ statim apparent rerum sublunarium species, quarum Magnitudines, Motus, actionesque considerandæ sunt; harum autem scientiarum nomina vel ab ipsis subjectis, vel ab eminentibus subjectorum qualitatibus derivari solent; ut quæ de Plantis tractat, *Phytologia*; de Corporibus Animalium, *Anatomica*; de visione *Optica*; de Ratiocinatione, *Logica*; de Moribus humanis, *Ethica*, de Civitate, *Politica*, &c.

B. Si tantam speculandi materiam præstet unica species Homo, quando putas otium nobis fore contemplandi cæteras? Transeamus jam, si volueris, ad Cap. 2^m.

A. [*De Geometria, & Arithmetica specialim; Earum Definitiones, Objecta, Principia, & Affectiones; easque verè scientias esse.*]

B. Accuratioꝛ forte erit hic quam in præcedentibus.

A. Non puto. Geometriæ & Arithmeticæ duplices affert Definitiones, alteras ab objecto, alteras a Fine. [*Priori modo definitur Geometria, Scientia Magnitudinis quatenus Mensurabilis.*]

B. Non accurate hoc? In Definitionibus enim Aristotelicis signum esse solet summæ æxerβeias vox illa *quatenus*. Nam accuratam Definitionem juxta *Aristotelem* dictum esse oportet non modo *De omni* & *Per se*, sed etiam *quatenus* ipsum.

A. Recte id quidem *Aristoteles*, non tamen in omni Definitione ea voce utitur. Subjectum *Physica* dicit *Aristoteles* esse *Corpus mobile, quatenus mobile*. Vides *Corpus mobile*, significare subjectum ipsum. In eo autem considerari possunt multa quæ *Physicus* non considerat. Itaque ut opus *Physici* in sola mobilitate determinaret *Aristoteles*, adjecit illud *quatenus mobile*. Sin dixisset, *Physicam*

Physicam scientiam esse in qua demonstrantur affectiones Corporis. entes ex ejus mobilitate, non puto adjecisset quatenus mobile. Sic Wallisius potuit dixisse, Geometria est scientia Magni, quatenus mensurabilis, sed non Magnitudinis quatenus mensurabilis; propterea quod in corpore quidem sive magno sive parvo sunt alia multa, quæ considerari possunt præterquam quod sit mensurabile; in magnitudine autem nihil. Deinde illud, scientia magnitudinis, sive etiam magni, tantum abest ab ἀνεύθετα, ut sit absurdum. Quid quæso est scire magnitudinem, vel scire magnum? Præter alicujus dicti veritatem nihil sciri dicitur, itaq; nisi Magnum, sit Propositio, sciri non potest.

B. Quomodo definit Arithmeticam?

A. [*Arithmeticam vero esse scientiam numeri quatenus numerabilis.*]

B. Eadem sunt & hæc vicia.

A. [*Posteriori vero modo, Geometriam dico scientiam bene mensurandi, Arithmeticam autem scientiam bene numerandi.*] Quid est mensurare?

B. Mensuram definiisti supra, describens id quod faciunt qui aliquid mesurant, nimirum mensuram esse applicationem, &c. Itaque mensurare est applicare mensuram ad magnitudinem mensurandam, quoties fieri potest, ut mensuræ ad mensuratum ratio ad sensum exponatur. Itaq; corpora consistentia quidem per lineas, Liquida autem & quæ fluida sunt per vasa mensurari solent.

A. Nonne ergo bene mensurare, sciunt quæ mensuras mensurandis bene ἀποτάσσουσιν, id est applicare sciunt? Omnes ergo homines, per definitionem hanc Wallisi, sunt (non minus quam ipse) Geometræ; ut etiam omnes, qui multitudinem quam vident numerare possunt sunt (ut ille) Arithmetici.

B. Sed per mensurabilitatem & numerabilitatem intelligere se dicit quicquid ad eorum singulas affectiones & habitudines investigandas & intelligendas attinet.

A. Itaque per mensurare & numerare intelligit demonstrare. Voluit certe idem quod est in definitione mea, quicquid magnitudinem determinat, sive facit cognitam; Sed quia illud non intellexerat, eloqui non potuit. [*Quod illas autem scientias dixerim, non est cur quisquam miretur, &c. Habent enim Subiecta, Principia, & Affectiones, easque de Subiectis, demonstrationibus maxime scientificis demonstratas.*] Vera quidem, nesciente illo, est consequentia; at si vox Principia id significat quod vult ipse, vera non est. Habet certe Geometria Principia sua, nempe Puncti, Lineæ, Superficieï, Solidi, Anguli, Figuræ, &c. definitiones; & præterea Axiomata per se manifesta,

nifesta, & Petitiones quasdam non iniquas. Hæc sunt Principia Geometriae. Per hæc demonstrantur subiecti quanti affectiones. Ille autem hæc non intelligit, neque Principia ipsa, aut quomodo conducant ad demonstrationem. Audi quid dicit de Principiis [*Principia quod attinet, Punctum quidem est Principium magnitudinis, Unitas autem Numeri, ut vulgò perhibetur. Nam ex fluxu Puncti Linea, ex fluxu Lineæ, Superficies, Superficiei verò corpus oriri traditur. Item ex Unitatibus numeros fieri satis liquet. Vide n' quam paucis verbis quantam suam indicavit ignorantiam? Probandum suscepit Geometriam Arithmetica vere scientiam esse. Medium probandi assumit quod subiecta habeant & Principia & Affectiones de subiecto demonstratas. Assumpti partem unam nempe quod habeant Principia sic probat, Punctum quidem magnitudinis, unitas autem numeri Principium vulgò perhibetur. Censen' tu Geometram esse, qui quod probare debuit, ab autoritate probat vulgi?*

B. Peccatum fateor est, nec parvum.

A. Demus autem ei satis hoc demonstratum esse. An Geometram esse dices, qui cum Geometriam & Arithmetica Principia habere ostendere deberet, ex eo probat quod Punctum est Principium Magnitudinis, & Unitas Numeri? Intelligisne quomodo Punctum Principium esse potest Geometriae?

B. Nullo modo.

A. Aut unitas Arithmeticae?

B. Tantundem.

A. Aut eandem rem esse Magnitudinem & Geometriam? Aut Numerum & Arithmetica?

B. Equè.

A. Aut Puncti definitionem & Punctum ipsum esse idem?

B. Quid tu hæc tam absurda a me queris?

A. Quid? nisi ut mihi dicas sicubi Argumenti hujus vim latere sentias.

B. Dicam quod sentio; nempe fraudi illi fuisse, quod cum vox *Punctum* Principium sit libri Elementorum Geometriae *Euclidis*, habuit ipsum pro Principio Geometriae, pariterque, quia vox *Unitas* prima est in Libris ejusdem Arithmeticae, putavit Unitatem Principium esse scientiae Arithmeticae. Miror sane hominem Peripateticum adeo oblitum fuisse *Aristotelis* sui, ut non meminerit Principia alia esse (ut nos loquimur) *essendi*, alia *cognoscendi*.

A. Pronum est oblivisci quæ non intelligas.

B. Est in his illius verbis quod non minùs reprehenderem quam hæc quæ tu (quanquam in Geometriae Professore turpissima) modo reprehendisti.

A. Quid

A. Quid illud est ?

B. [*Oriri Lineam ex fluxu Puncti traditum est non inepte.*]

A. Recte id dicit.

B. An Punctum fluit.

A. Quidni ?

B. Moverur ergo.

A. Verum dicis.

B. *Aristotelis* est, nihil moveri præter corpus.

A. Verum hoc quoque. Non enim Puncti nulla est quantitas, sed nulla computatur. Nec ipsum Punctum Nihil, aut Indivisibile est, sed Indivisum. Itaque qui dicunt Tellurem esse Punctum non improprie loquuntur, quoties de ea agitur (ut in Astronomia) describente Lineam Motus Annui. Neque Lineæ Latitudo nulla est, sed nulla consideratur in demonstratione. Alioqui impossibile esset (quod postulat *Euclides*) Lineam ducere; & per consequens tota periret *Euclidis* Geometria.

B. Recte. Negato enim quod possit duci Linea, neque in illius Elementis, neque in quocunque alio Libro Geometrico quicquam extat Demonstrati. Esto ergo verum quod hic dicit. Certus tamen sum aliter sensitse ipsum, cum *Elenchum* scriberet contra *Hobbiū* eadem dicentem, quæ nunc dicis tu, quem ob idipsum convitiis onerarat.

A. Tanto est nequior. Sed pergamus. [*Non minus recte tamen, me iudice, diceretur, si Magnitudinis Principium diceremus (prout hic loci Principii vox videtur intelligenda) ipsam extensionem, seu partium extra partes positionem.*] Quot rursus sunt hic imperitiæ dicta ! Primo, per vocem illam videtur, nescire se innuit quomodo vox Principium sit hoc loco intelligenda, quam ipse hoc loco posuit; nimirum fatetur se non intelligere quæ ipse scribit. Secundo, cum ex Professio loquatur de Principiis Geometriæ & Arithmeticæ, id est, de Principiis Scientiarum, id est, de Principiis cognoscendi; Principia tamen quærit Magnitudinis & Numeri. Tertiò, Principium Magnitudinis *Extensionem* esse dicit, id est, *Magnitudinis Principium* esse *Magnitudinem*. Quid enim aliud est Extensio (prout is ea voce hic barbarè utitur præter Magnitudinem ? Extensio proprie loquendo, actio est illius qui aliquid ex curvo rectum facit. Ille autem *positionem* esse dicit *partium extra partes*. Quamobrem ? Nimirum ut salva sibi sit opinio sua *Apopaterica*; quod idem Magnitudine corpus, locum modo majorem, modo minorem occupare possit.

B. Fortasse; nam in *Elencho* suo *Hobbiū*, qui aliter sentit strenuè vituperat.

A. Quartò, cum dixisset ante, opinionem eorum qui Magnitudi-

nis Principium dicunt esse Punctum, non ineptam esse, addit *non minus recte diceretur, &c.* quasi utraq; posset esse vera, sed pergamus. [*Numeri Principium duceremus ab ea modificatione qua quid unum multa dicimus.*] Primo, quid est illud quod appellat *rerum modificationem*? Aut quid aliud hic dicit quam quod res ita modificantur, ut res una sit unum, & Multa Multa. Accurate. Deinde prout ab indentitate oritur Unitas, ita & a rerum diversitate oritur Numerus. Dicitur. Scilicet idem est unum, diversa multa. Sed nonne & diversum est unum? Quid ergo id quod recte, cum vulgo ante dixerat. Numeri Principium esse unitatem, nunc mutat? [*Sed & ipsa unitas non incommode Numerorum Catalogo accenseri possit.*] Quomodo non incommode, nisi & verè? Sed quare non incommode? Quia [*numerus de omni illo dicitur quo quaestioni Quot sunt affirmativè respondetur.*] & quia [*Arithmetica eodem modo & unitatem & ceteros numeros tractat.*] Multa habet Theoremata Euclides de Numeris post Unitatem certa ratione procedentibus, de unitate nullum. Neq; quidem Numeris primis accenset Unitatem. [*Et quidem apud Grammaticos Numerus singularis sine solascimo dicitur.*] Quamquam in hac quaestione, Grammaticorum autoritas non multum valere debeat, non tamen ideò dicunt Numerum singularem, quod credant Unitatem esse Numerum, sed quod in Numero quidem singultri Flexionem ponant Nominis quod significat rem unam, in Plurali autem, Nominis quod significat res plures.

B. ἀπὸ τούτων, sequitur Cap. 3^m de Demonstratione.

A. [*Demonstratio est Syllogismus qui affectiones proprias de subiecto per proprias causas demonstrat.*] Intelligisne per Definitionem hanc quid sit Demonstratio?

B. Quidni?

A. Intellexi ergo quid significat vox *demonstrat*. Unde autem, si nesciebas quid esset Demonstratio?

B. Recte dicis. Nam sciebam antè, ex Definitione *Aristotelica*, quam & ipse apposuit, nempe hanc, Ἀποδείξις ἐστὶ συλλογισμὸς ἐπιστημονικὸς ἐξ ἀληθῶν, καὶ πρώτων, καὶ ἀμετάστων, καὶ γενεσιμωτέρων, καὶ προτέρων, καὶ ἀπαιτῶν τῶ συμπεράσματι, quam ille redidit breviorē.

A. An Definitionem *Hominis Aristotelicam* breviorē facere dicendus erit, qui in ejus locum hanc substituerit (Definitum ponens in Definitione) *Homo est Homo*; quemadmodum *Wallisius* ponit Demonstrare in Definitione *Demonstrationis*.

B. Video nunc Definitionem *Wallianam* vitiosam esse. Sed illa *Aristotelica* nonne bona est?

A. Melior quidem, sed non accurata. Nam etsi fieri possit, ut Demonstratio ex unico constet Syllogismo id tamen rarissimum est. Debuit

Debit ergo dicere συλλογισμὸς, ἢ συλλογισμίδι, Deinde illud καὶ τετάρτον, abundat ; nam ante dixerat καὶ πρῶτον, Tertio illud καὶ αὐτὸν. τὰ συμπράττειν & proprium non est Syllogismi demonstrativi, sed omnium Syllogismorum commune, etiam eorum in quibus tam major quam minor propositio est falsa. Exempli causa, Syllogismus legitimus est, *Omnis homo est lapis, Omnis lapis est animal, ergo Omnis Homo est animal.* Vides hinc conclusionem, necessario sequi ex Præmissis, & propterea Præmissas falsas causas esse posse Conclusionis, ut tamen Syllogismi tales non sint Demonstrationes. Postremò Demonstratio omnis procedit ab ipsius affectionis demonstrandæ causa ; ut si ab eo quod Terra interposita sit inter Solem & Lunam (exemplo utor Aristotelico) Eclipsin fieri Lunæ Demonstraretur, Interpositio Terræ non est conclusionis causa, sed Eclipsiæ. Fallit interdum *Vax* pro *Re* se ingerens.

B. Quænam autem est Demonstrationis Definitio accurata ?

A. Demonstratio est Syllogismus, vel Syllogismorum series a Nominum Definitionibus usq; ad Conclusionem ultimam derivata.

B. Quid, Si Syllogismorum aliquis, vel Definitio aliqua vitiosa sit ?

A. Neque Syllogismus est qui vitiosus est, neq; Definitio quæ vitiosa.

B. Quid si Conclusio sequatur (sine Definitione) Axiomata. An non erit Demonstratio ?

A. Est, modo Axiomata illa tum manifesta sint, tum etiam demonstrari (si imperetur) possint ; qualia sunt Axiomata sumpta ab *Euclide*.

B. Sed ipsa Definitio quomodo definitur.

A. Definitio nonne Propositio est ?

B. Est.

A. Nonne etiam est explicativa Nominis Definiti ?

B. Etiam.

A. Quomodo explicatur nomen quodvis, verbi gratia, Nomen *Homo* ?

B. Si ponatur vox *Homo* pro subiecto Propositionis, deinde pro Prædicato, Nomen quod sit aggregatum omnium Nominum quibus *Homo* distinguitur a rebus cæteris omnibus. Exempli causa, distinguitur ab omnibus Accidentibus per nomen *Corpus* ; a cæteris Corporibus per nomen *Sentiens* ; a cæteris Sentientibus (sive Animalibus) per nomen *Rationale*. Itaq; si dicamus *Homo est Corpus sentiens Rationale*, erit illa propositio Definitio Hominis. Nomina enim quæ ad faciendum Prædicatum aggregantur complicata sunt in una appellatione illa *Homo*, ipsumq; Hominem ab omni alia re distinguunt, id est, quid sit definiunt.

A. Recte.

A. Recte dicis, neq; quicquam aliud fecisti præterquam quod resolvisti vocem Homo in partes suas. Fuisset autem satis illi qui prædefinitum haberet *Animal* posuisse, *Homo est Animal Rationale*. Definitio ergo *Definitionis* accurata erit hæc. *Definitio est Propositio cuius Prædicatum est subiecti Resolutivum.*

B. Quid autem fiet si subiectum resolveri non potest, ut plerumq; fit in Generibus summis?

A. Cum finis Definiendi sit ambiguum tollere, si per Nomina id fieri non potest, faciendum est per Exempla. Addamus ergo Definitioni nostræ pauca etiam verba, ut tota hæc sit, *Definitio est Propositio cuius Prædicatum est subiecti resolutivum, ubi fieri potest; ubi fieri non potest, exemplificativum.*

B. Perge legere.

A. [*Quæ tamen Definitio non omni Demonstrationi convenire putanda est, sed illi quæ est τὸ δῖόντι quæ etiam κρύβως Demonstratio dicitur. Ad Demonstrationem τὸ ὄντι sufficit Argumentum ab effectu.*] Vellem definiret quod sit illa Demonstratio τὸ ὄντι. Nam Demonstratio τὸ δῖόντι est, quando quis ostendit propter quam Causam subiectum talem habet affectionem. Itaq; quoniam Demonstratio omnis est scientifica, & scire talem esse in subiecto affectionem, est a cognitione causæ quæ illam necessario producit, nulla potest esse Demonstratio præterquam τὸ δῖόντι. Rectè ergo dicit, illam quæ dicitur τὸ ὄντι non esse κρύβως Demonstrationem, id est, non omnino Demonstrationem. Nam in Sermone Mathematicorum non esse & non proprie esse, idem sunt.

B. Ratiocinatio quæ incipiens a veris Principiis Conclusionem rectè inferit, proprie dicitur Demonstratio. Neq; credo Aristotelem Demonstrationem vocasse, ne quidem τὸ ὄντι ratiocinationem ullam in qua esset Paralogismus. Necessarium ergo est ut intellexerit ratiocinationem quæ incipit, non a Definitionibus, sed a suppositis (qualibus utuntur Physici) plerumq; incertis. Non ergo debuerunt interpretes ejus Demonstrationem τὸ δῖόντι interpretari Potissimam, sed simpliciter Demonstrationem.

A. Videtur id voluisse Aristoteles, neq; dissentiente Walliso, qui eam appellat Argumentum ab effectu. Dicendum ergo est duplici Philosophorum inquisitioni, nimirum effectuum ex causis, & causarum ex effectibus. duplex respondere ratiocinationis genus, nempe Priori Demonstrationem, id est, ratiocinationem ex Definitionibus, quæ est scientifica; posteriori ratiocinationem ex Hypothesibus, possibilibus, quæ etsi scientifica non sit, si tamen nullus appareat effectus, ne in longissimo quidem tempore, quæ Hypothesin redarguat, facit ut animus in ea tanquam acquiescat, non minus quam in scientia. Frustra autem Demonstrationis τὸ ὄντι quærimus definitionem, quæ Demonstratio non est.

Sequitur

Sequitur disputatio ejus contra *Smigleciū*; primò de *Ente Mathematico*. Quid sit Ens Mathematicum non ita bene intelligo, ut ipsum, si opus esset, possem definire, aut satis distinguere ab Ente Metaphysico, Ente Physico, Ente Logico, Ente Rationali, Ente Intentionali, & similibus, quæ nunc passim occurrunt, neque (quod puto brevi introductetur a Symbolicis) ab Ente Symbolico. Deinde defendit *Euclidis* Demonstrationem omnium primam contra *Smigleciū*, non male, nisi quod addendum esse dicat [in nulla quidem scientia expectandum esse ut omnes ibidem Demonstrationes aequali perfectionis gradu procedant.] Nam Demonstrationes vocat, quæ non sunt scientificæ; cum tamen initio hujus Capituli Demonstrationem appellasset συλλογισμὸν ἐπιστημονικόν. Itaq; juxta illum, eorum quæ scimus, alia magis alia minus scimus; quod est absurdum. [Abundè sufficit, quanquam passim immisceantur alia τῷ ὄντι.] Abundè ergo sufficit si in Elementis *Euclidis* non omnia Theoremata demonstrantur Demonstrationibus τῷ διότι, id est, sufficit si alia ejus Theoremata sciamus esse vera, alia an vera sint necne nesciamus. An Geometriæ Professor idoneus est, qui neq; (ut ante ostendimus) scit quæ sint illius scientiæ Principia, neq; (ut apparet hoc loco) quid sit *demonstrare*, id est, quid sit *docere*? Miror quid factum sit, ut Cathedram nactus sit *Savilianam*.

B. Fortasse, quod in Professoribus illis eligendis plurimum potuerint suffragia hominum non Mathematicorum sed Theologorum.

A. Quid? Theologiæ Doctores nonne didicerant Logiam? Nam errores hi non oriuntur a defectu Geometriæ, sed Logicæ. Unde autem commendatus est Theologis?

B. Nosti quo tempore eligebatur, multum in Civitate nostra potuisse, eos qui Ecclesiæ Regimen, in sacris, Presbyterio adjudicabant, ejus Sectæ est *Wallisius*. Præterea Commendatio fortasse erat propter Artem Symbolicam.

A. [Igitur ut rem totam dilucidius expediam, tres præsertim Demonstrationum Mathematicarum sive modos, sive gradus, sive species statuo. Prima quidem est illa Demonstratio quæ per deductionem ad absurdum, seu impossibile procedit.] Scis Demonstrandi genus hoc loco dici Ducere ad absurdum, quia ducit ad contradictoriam propositionis alicujus ante Demonstratæ Offensive; & quidem per demonstrationem τῷ διότι.

B. Scio; & proinde Theorema nullum, quod ex Principiis immediate demonstratur, Demonstratum dici, potest per deductionem ad absurdum.

A. Qui demonstraverit propositionem quamcunque esse veram,
E
nonne

nonne simul demonstratur contrariam tum contradictoriam ejus esse falsam?

B. Absq; dubio,

A. Si igitur propositio ipsa demonstrata sit per Demonstrationem *tū dīōti*, etiam contradictoria ejus, eo ipso quod contradictio detegitur, demonstratur per Demonstrationem *tū dīōti*.

B. Ita censeo.

A. [*Secunda Demonstrandi ratio est Ostensiva tū ōti*; ut si recta AC demonstraretur aequalis esse recta BC, quoniam utraque Demonstrata fuerat aequalis ipsi AB; quæ autem sunt eidem equalia, sunt. & equalia inter se. Estque hæc Demonstratio quidem Ostensiva tū ōti, non autem tū dīōti.] Dic mihi, si AC demonstraretur æqualis esse BC, an ideo esset Demonstratio?

B. Videris mihi querere an Demonstratio sit Demonstratio.

A. Si Demonstratio est, scientifica est.

B. Recte.

A. An AC, BC, sciri possunt æquales esse inter se, nisi sciamus prius utramq; æqualem esse AB?

B. Minime, neq; id dicit Wallisius.

A. Si sciri non potest AC, & BC, esse inter se æquales, antequam sciamus utramque earum æqualem esse AB; neq; potest demonstrari illud sine Demonstratione hujus.

B. Verum est.

A. Est ergo Demonstratio hujus, pars Demonstrationis illius.

B. Video quo tendis, nimirum, ad id quod dixisti paulò ante, in Demonstrationis Definitione, nempe esse eam Syllogismorum seriem cujus Principium est in Definitione, & finis in Conclusionem ultima; quod & verum est, & manifestum facit Demonstrationem totam cujus Conclusio est AC, BC esse inter se æquales, esse Demonstrationem directam *tū dīōti*. Nam utramq; AC, BC æqualem esse AB Demonstratum est per Causam efficientem, nempe per constructionem duorum Circulorum (permutatis centris) super eandem rectam AB. Imò verò eadem illa constructio causa est quod duæ vel quot vis Lineæ rectæ inter se æquales sint. Nam Radius quo Circulus describitur, mensurat per *ipsosque* distantiam a centro ad circumferentiam in locis infinitis eandem. Non ergo est illa demonstrandi ratio ostensiva *tū ōti*.

A. Neq; placet mihi illa ipsa distinctio Demonstrationis in *Ostensivam* & *Deductivam* at *impossibile*. Non enim loquutio est Doctori scientiarum præsertim Mathematicarum satis accurata. Nam Demonstratio *Ostensiva* idem est quod Demonstratio *Demonstrativa*. Est enim altera, ea qua tendit rectā viā ad ipsam Propositionem; altera, ea qua

tenet

tendit ad contradictoriam ejus, vidē (primò) rectā, deinde (per conversionem) ad propositionem ipsam.

B. Quoties audio quemquam dicere *Demonstrationem τὸ δῆλον*, vix me, contineo ne interrogem τὸ δῆλον τί, sed me contineo tamen, ne quod omnes se scire dicant, solus videar ignorare. Dic ergo, cum in omni Demonstratione dicant *Quod* verum est, vel *Quod* falsum, quomodo una Demonstratio est *Quod*, alia *Propter quid*? Nescimus enim *Quod* res ita est, nisi sciamus *Propter quia* ita est, juxta id quod solemus dicere Aristotelici, *scire est per causam scire*.

A. Videtur *Aristoteles*, cum in *Physica* animadvertisset non effectum per causam cognitam, sed contrā causam quæri per cognitos effectus, atq; id non posse accurate fieri, propterea quod similes effectus non semper & necessariò similes habeant causas, ob eam rem potius Demonstrationem eam duxisse, quæ effectus per causam Demonstratur (quæ est τὸ δῆλον) quam ea quæ causam concludit ex effectū, quamq; propterea appellavit τὸ δῆλον. Quæ tamen scientifica non est, & proinde nec vera Demonstratio. Non enim incipit a Definitionibus, sed ab Hypothesibus, quæ falsæ esse possunt; quanquam, si nulla experimenta, etiam post longissima tempora eas redarguant, satis erunt probabiles; sed Theoremata inde deducta non possunt dici demonstrata. Frustrā ergo quærit *Wallisius* Demonstrationem τὸ δῆλον inter Demonstrationes *Euclidis*. Sed pergo. [Si quis denique objiciat, me tres demonstrationis species fecisse, cum vulgo dua tantum statuantur, poterit ille, si placet, duarum priorum utramque Demonstrationem τὸ δῆλον dicere. Non enim libet de verbis contendere, modo de rebus constet.] Benigne sane, qui quid verum sit (quia de re non constat) potestatem nobis concedit eligendi.

B. Eligo igitur hoc; unum esse Demonstrationis genus, nempe τὸ δῆλον, sive Conclusio directe demonstretur, sive per Deductionem ad absurdum.

A. In Capite quarto agit de Unitate, Numero, & Numeri Principio [Unitas est secundum quam unus quodq; Unus dicitur. Numerus autem est ex Unitatibus composita multitudo.] Scilicet ita definit Unitatem & Numerum *Euclides*.

B. An non recte?

A. Numerum quidem accurate, Unitatem autem imperite. Nam propter cognationem vocum *Unum* & *Unitas*, altera in alterius Definitione poni non debuit; non magis quam *Album* in Definitione *Albedinis*, aut *Albedo* in Definitione *Albi*. Nihil enim confert ad intellectionem vocis concreta sua ipsius abstracta, neq; contra, abstracta sua concreta. Cavet autem *Euclides* ne Definitione hac in Demonstrationibus uteretur; atq; ita factum est, ut nullum inde vitium emanaverit ad Theoremata. [Ex his autem Unitatis & Numeri Definitionibus

tionibus plerique arbitrantur Unitatem Numerorum Catalogo non esse accensendam, adeoque numerum minimum Binarium esse; quanquam illud quidem Euclidem uspiam dixisse non memini.]

B. Si meminisset Definitionis Euclidis, quem proxime supra ipse retulit, necesse est ut meminerit sentire Euclidem Numerorum minimum esse Binarium, nisi idem sit $\mu\omicron\upsilon\delta\acute{\iota}\varsigma$ & $\mu\omicron\upsilon\delta\acute{\alpha}\varsigma\omega\upsilon\pi\lambda\acute{\alpha}\theta\omicron\varsigma$. [Opera tamen precium fortassis erit paucis ostendere cur Unitatem putem vere Numerum esse, aliisque Numeris arnumerandam. Nec huic forsitan adversabitur Euclidis aliorumque sententia probe intellecta.] Quid an possibile est ut probe intelligatur $\mu\omicron\upsilon\delta\acute{\alpha}\varsigma$ esse ex $\mu\omicron\upsilon\delta\acute{\alpha}\varsigma\omega\upsilon\pi\lambda\acute{\alpha}\theta\omicron\varsigma$? [Cum enim nonnulli Unitatem, proprie loquendo, non modo Numerum esse negent; sed & Numeri partem, adeoque Numeri Principium imparis esse dicant, ut est Magnitudinis Punctum & Temporis Momentum, intelligendi fortasse sunt de Monade, seu Unitate, non ut Numerum singularem designat, sed ut est communis quasi Numerorum omnium denominator. Sic enim Numerus Quaternarius est qui quatuor Unitates, numerat. Tunc hæc intelligis?

B. Puto.

A. Expone ea quæso.

B. Considera fractionem hanc $\frac{1}{4}$. Quid significat.

A. Quatuor unitates.

B. Quare?

A. Quia quocumque partes integri, Fractionis denominator Unitas denominat, earum partium numerator, numerat 4. Sed Unum denominat ipsum integrum indivisum; sunt ergo $\frac{1}{4}$ quatuor Unitates.

B. Itaque hoc dicit, Illos qui Unitatem numerum esse negant, tunc solummodo id negare, quando Unitas fit Denominator fractionis ut in $\frac{1}{4}$ vel $\frac{1}{2}$.

A. Dicit ergo Wallisius, [dum quatuor tamundem valent ac quatuor Unitates, vox illa Unitates nec Numerus est, nec pars numeri, sed vel numeri denominatio seu denominator, vel ipsum numeratum.]

B. His ergo verbis vides ut ipse, quæ obscura ante erant, clare eloquutus est.

A. Ita clare, ut scias quid illis contingere necesse sit, quibus ante nascuntur opiniones, post quæruntur argumenta quibus possunt defendi; nimirum, quemadmodum iis accidit qui in tenebris oberrant, ut quæcumque moveantur impingant in aliqua offendicula. Nam ut Unitatem sustineat esse Numerum, Unitates, id est plures, numerum esse negat; nec quatuor, aut tres, aut quot vis Unitates Numerum esse patitur.

B. Non negat quatuor Unitates esse Numerum, sed vocem illam Unitates numerum esse negat.

A. Quis

A. Quis nescit vocem illam *Unitates*, aut si vis, vocem illam *numerus* non esse Numerum? Nam numerus est unitatum multitudo, vox autem non est. Queritur hic an in fractione hac $\frac{1}{4}$ significante quatuor Unitates, quatuor sit numerus, ut ille dicit, Unitates numerus non sint. Ino vero Unitates esse Numerum verum fuit etiam ante quam ulla existerent nomina, aut *Numerorum*, aut *Unius*. Quia ino ergo, nisi subauditis Unitatibus, vel *Unis* numeratis, nihil est. Unitates autem nunquam non erant Unitatum numerus. Rursum, [Vox illa *Unitas* est numeri denominatio seu numerator. Vox autem *Una* est numerus seu Unitatum multitudo (multitudinis voce laxius accepta, ut post dicitur);] dicit enim quod vel quatuor multa Unitates adesse dicantur, nimirum *Unicam*. Aliud autem est negare Unitatem, aliud vero negare *Unum* Numerum esse. Eodem enim sensu $\frac{1}{4}$ dicitur Numerus esse negari possit, quamvis *Unus* Numerus esse non negatur.] Primo, obscurum est quod dicit Denominatio seu Numerator, quasi significarent eandem rem, praeterquam cum superius (quinque versibus) dixerat Denominatio seu *Denominator*. An in Fractione $\frac{1}{4}$ Denominatio est 4, Denominator 1? Deinde si vox *una* sit Numerus, erit quoque Numerus (id est multitudo Unitatum) vox; id quod nemo intelligit. Sin *Una* sit Numerus, erit illa Numerus rerum Numeratarum, puta, Unitatum. Itaque *Una Unitas* est Unitates. Tertio non est verum quod dicit, aliud esse negare *Unitatem*, aliud *Unum* esse Numerum. Nam illi quibuscum disputat, cum negant Unitatem esse Numerum, intelligunt per *Unitatem* ipsum (in concreto) *Unum*. Quarto, $\frac{1}{4}$ dicitur a quo negatur esse Numerus? An non $\frac{1}{4}$ dicitur significat propriissime rem quod numerus denarius, sicut *duo*, *tres*, *quatuor*, idem quod numerus binarius, ternarius, quaternarius? Sed de his negari non potest, quin sint numeri. Itaque $\frac{1}{4}$ dicitur non potest negari esse numerus. Postremo, cum probandum illi esset *Unum* esse Numerum, hoc tantum probare conatus est, quoddam qui contra sentiunt, sententiam suam non satis demonstrasse.

B. Quod unum sit Numerus demonstrabit forte inferius.

A. Bene est. Pergamus. [Sed reuera, si accurate loqui velimus, non tam Unitas quam nullitas (si i'a loqui liceat) seu Nullum idem respectu Numerorum obinet, quod Punctum respectu magnitudinis.]

B. Nollem hoc dixisset. Nam cum ab Hobbio culparetur quod Punctum dixerat esse nihil, negavit se ita sensisse. Nunc tamen idem dicit aperissime, cum enim sit ut Nullum ad Numerum, ita Punctum ad Magnitudinem certissimum est Punctum esse nihil.

A. Illud quoque ineptum est quod cum in proxime praecedentibus distinxisset Unitatem ab *Uno*, ut Non Numerum a Numero, nunc

cum *Nulla*, confundat *Nullitatem*. Hoccine est loqui accurate? Præterea cum dixisset, si accurate loqui velimus, cur statim addit si ita (id est, non accurate) loqui liceat? An scribit dormiens. Sed progredior. [At interrogabitur forsan, Num velim ego, a veterum pariter & Recentiorum omnium sententia discedere, qui uno Ore Unitatem vocant Principium Numeri. Respondes nihil absurdi esse majorum inventis addere.] Vide captum hominis Mathematici. Mathematicorum esse putat docere an unum sit vocandus Numerus; quasi non vulgi ei-set impositio nominum, aut quilibet e vulgo non æquè sciret atq; centies mille peritissimi Arithmetici utrum Unum sit Numerus necne, id est, (juxta Definitionem *Euclidis*) utrum homo sit homines necne. Mirarer certe cum non solum ab *Euclide*, sed etiam ab omnibus tum Veteribus tum Recentioribus sciret se dissentire, errorem in seipso esse non sit saltem suspicatus, sed eorum inventis hoc addidisse se existimaverit, nisi scirem cujus esset Sectæ. Qui proxime sequuntur, circiter viginti versus, sunt gravis & acerba reprehensio temeritatis eorum, qui si vel tantillum sciunt, aliorum omnium peritiam vel flocci faciunt vel superciliose contemnunt. Cujus reprehensionis justitia ita manifesta est, ut nihil circa eam examinandum sit, nisi ad quem potissimum collimaverit.

B. Videtur hoc loco eos scriptores omnes perstringere, qui non eadem in Mathematicis sentiunt quæ ipse.

A. Deinde ad institutum rediens sic scribit, [quod ad rem præsentem attinet, assero, & veterum sententiam probe intellectam, & qua nos asserimus satis constare posse. Ipsa enim Principii vox duplici saltem acceptatione occurrit, prout nempe significat Primum quod sic, vel ultimum quod non. Sic si heredis jus in rem Hereditariam ab ipso patris interitu incipere dicatur, erit hoc Principium Ultimum quod non, Si verò dicamus heredis jus inchoari a primo momento successionis, etiam ita vere dicitur, sed hoc Principium est Primum quod sic.]

B. Subtiliter hæc.

A. Ita; ac si dixisset finem Capitis præcedentis esse Principium Capitis hujus.

B. Subtiliter dico, id est Scholastice, vel Metaphysice; Scholastici enim olim subtilissimi habebantur.

A. Subtiliter pro *Barbare*. Quis putabit inchoatum esse Jus, vel aliam rem quamcunq; tunc quando neq; ipsa, neq; ulla ejus pars existit. Sed quare homo Mathematicus de Mathematicis scribens exemplo utitur Juris? An etiam Juris Romani peritus est? An potius per hoc exemplum fieri posse sperabat ut esse crederetur?

B. Nescio

B. Nescio sane, sed illum nunc incipere puto a Principio (ut ille vocat) *Ultimo quod non.*

A. [*Unum igitur numerum esse affirmo — minimum enim est quod affirmative responderet questioni quam multa.*] Si dicam responderi etiam posse per *nullum*, scio quod exiger ut respondeatur affirmative. Dico ergo questioni *Quot sive quam multa*, non omnino responderi aptè & plenè posse sine negatione. Nam qui *Unicum* habens *filium*, querenti quot haberet filios, respondet per *Unum*, non satis plene respondet, quia & qui plures habet *Unum* habet. Respondendum ergo est non per *Unum* sed per *Unicum*, id est *Unum* nec plures, id est non sine negatione. Ita etiam si respondeat plures habens) *Duos*, non plene respondet, propterea quod, qui tres habet *Duos* habet. Respondendum ergo est per *Duos* nec plures, id est, non sine negatione. Illud ergo quod pro causa adfert quare crediderit *Unum esse numerum*, causa esse non potuit. Vin^o causam quare id contra tum veterum tum recentium omnium sententiam verum esse crediderit, dicam ego, qui eum scio meliùs quam ille?

B. Volo.

A. Cum legebat numerorum cifras 1. 2. 3. 4. &c. vel cum audiebat nomina *Unum*, *Duo*, *Tria*, *Quatuor*, &c. Cifras illas & nomina illa pro numeris ipsis nominatis intelligebat; ut & paulò ante cum diceret *Vox Unitas est Numerus*.

B. Credo sane. Sed quomodo *Unitatem* & *Numerum* definis tu?

A. *Unum* quidem (cum *Aristotele*) id quod consideratur ut *indivisum*; *Numerum* autem (cum *Euclide*) ex *Unitis* collecta *plura*. Nam vox $\pi\lambda\acute{\upsilon}\sigma$ non significat *Multitudinem* eo sensu quo opponitur *Paucis*, ut censet *Wallisius*, sed eo quo opponitur *Uni*; adeo ut proprie loquendo $\pi\lambda\acute{\upsilon}\sigma$ Græcum, & Latinum (non *multa* sed) *plura* idem sint. Deinde lego in margine [*numeri fracti non sunt numeri proprie dicti.*] Verene hoc?

B. Anne fractus *Integer* est, aut *Numerus* n'lus est qui non sit *Integer*?

A. Minime. Et tamen id quod per *Numerum Fractum* intelligitur, est *Numerus* proprie dictus.

B. Quà fieri id potest?

A. Quid significatur per *Numerum Fractum* hunc?

B. Si significantur tres partes quarum *Unitas* habet quatuor.

A. Satis quidem intelligo quomodo *Unum*, quodcumq; illud sit, posset dividi in 4 partes, quomodo autem *Unitas* ita divisi possit non intelligo.

B. Cum

B. Cum dico *Unitatem*, intelligo ipsum *Unum* Integrum quod divisibile est in partes quot quis voluerit.

A. *Unus* ergo Integrum sit assis. Dic mihi an tres asses sit numerus assium.

B. Sunt.

A. Et Numerus assium numerus proprie dictus?

B. Est.

A. Et numerus unciarum nonne est Numerus proprie dictus?

B. Equè.

A. Et numerus Quadrantum nonne Numerus proprie dictus?

B. Etiam.

A. Et $\frac{1}{2}$ sive dodrans nonne est Numerus Quadrantum?

B. Est.

A. Idemq; Numerus fractus.

B. Vicisti. Nam qua ratione diceret aliquis Numerum integrorum magis proprie Numerum dici, quam partium, eadem ratione poterit dicere Numerum boum magis proprie dici quam ovium. Hactenus ergo non modo, non *absens*, sed etiam inepta sunt quæ legimus, auctoremq; tantæ subtilitati imparem esse indicant. Capite quinto ubi ostendere pollicetur *procreationem*, quam appellat etiam *originationem* Numerorum, expectaveram aliquid novi, ut quis primus Numeros vel saltem nomina numeralia primus invenit. Sed de hoc ne verbum quidem habet.

A. [Si igitur ubi prius nulla erat, apponatur Unitas, sit numerus singularis; si adhuc addatur Unitas alia, emergit Numerus Binarium; accedat alia, & exurgit ternarium — Estque hac vera Numerorum Originatio seu Procreatio.] Eleganter illud, ubi prius nihil erat, apponatur. Et ex additione Unitatum fieri Numerum, sed nec minus fieri per ablationem partium æqualium, ab Uno dato (id est per divisionem) pueri sciunt; quare autem per additionem potius quam per ablationem, pueri & Wallisius juxta nesciunt. Poterat ergo subtilitas hac sine ulla exultationis suæ, aut eruditionis nostræ jactura prætermitti, quemadmodum & id quod proxime sequitur, nimirum hoc, Est igitur impossibile ut Numerus maximus assignetur. Nam & hoc pueri sciunt.

B. Quomodo sciunt pueri cum i sos Geometras loqui audiant de recta divisa in partes Numero infinitas, & librum legent Wallisii de *Arithmetica infinitorum* a magni nominis Geometris Schoteno & Hugeno (ceteris Epistolis,) approbatum?

A. Nesciant ergo hoc pueri. Deinde ostendit dispositionem Numerorum in Decades, Centurias, &c. in perpetua ratione 1 ad 10.

B. Potuit

B. Potuit quoq; hoc præteriri.

A. Sed exempla assert numerationis Græcæ & Hebraicæ, quæ forsitan præterire se potuisse non putavit, quin eruditio ejus minus multiplex esse videretur.

B. Non modo hic, sed etiam in proxime sequentibus peritiam suam in hoc genere literarum aliquanto magis ambiciose ostentat quam est opus. Quis nescit potuisse numerationem ab initio per quamlibet aliam proportionem fieri, si ita libuisset primis inventoribus? Credibile enim est, si nati fuissent homines dodecadactyli, quod Numerorum progressio fuisset facta per rationes perpetuo duodecuplas. Transi, ergo ad Caput sextum.

A. Caput sextum differramus, si vis, in diem crastinum. Nam sentio me lacescere.


B. Placet.

A. Set Unicum hoc prius legamus. [*Tamen quod mirum dictu est, in eadem proportionem decupla omnes ubique terrarum gentes mire conspiciunt.*] Quid si falsum hoc sit?

B. Minus id mirum erit.

A. Galli nostri & Armorici Galliæ usq; ad decem quidem ab Unitate progrediuntur ut nos; deinde resumpra Unitate (non ad viginti, sed) ad quindecim; & rursus repetita Unitate ad 20; inde ad 25, & a 25 ad 30, &c. tanquam post Decadem per unius tantum manus digitos computarent. Sed more suo nimis temere, nec satis Logice propositionem ex Inductione intulit Universalem. Memineris cras redire, circa eandem horam.

B. Faciam. Vale.





Dialogus Secundus.

A. Ene advenis.



B. Gaudeo.

A. Capita tria proximè sequentia perlegi dum abesses. Sunt autem tota Philologica.

B. Nonne erudite scripta sunt?

A. An quæ nec utilia, nec falsa, nec miranda sunt, placere posse arbitraris? Capite sexto, ubi pollicetur nominum numeralium Latinorum omnium derivationem a nominibus numeralibus Græcis, nihil præstat præterquam quod conjecturam faciat a similitudine literarum. Ut taceam autem quod promissi oblitus deducit *Secundum* a (non Græco) *Sequor*, quid tritius esse potest quam *Duo* a *δύο*, *Tres* a *τρεῖς*. *Sex* ab *ἕξ*, *Septem* ab *ἑπτα*, *Octo* ab *ὀκτο* derivare? Quid ineptius quam *Bellum* a *πόλεμος* deducere, & *Unum* dicere quasi *ὅ ἐν* (mallem quasi *ὅν*) & inde per *Hostium*, *Fohenum*, *Boenum*, venire ad *bonum*, quia Scholares dicunt *Unum* & *Bonum* esse convertibilia? Præterea quinq; à *πέντε* rîcicule deducit, atq; etiam impudenter, mutanda *πέν* in *quin* & *π* in *que*.

B. Fateor curiusculum esse hoc.

A. Nec minus *Centum* ab *ἑκατόν*; & *Mille* a *μύρια* vel potius a *μύρια* & *χίλια*, & *quatuor* a *τέσσαρες*.

B. Memini eum a *τέσσαρες* processisse ad *τέτταρες* Atticum, inde ad Poeticum *πίσυρες*, inde ad *πίτορες* postremò ad Cambricum *ped-war* & Armoricum *pevar*. At a *πίτυρα* vel *πέττορα* vel *πέτορα* facilis est transitus, ad *quatuor*, propter affinitatem literarum *p* & *qu* in *quispiam*, & *quisquam*, *nuspiam* & *nusquam*.

A. Credin ita esse?

B. Scio Massiliam fuisse Phocensium coloniam Æolorum; itaq; nomen *πύρα* (si Æolicum sit) potuisse à Massiliensibus venire ad Gallos; Gallorum colonia erant Cambri, seu Walli. Cur ergo non potuit ex *πύρα* (si vox, inquam, ea sit Æolica) fieri *quar*.

A. Potuit. Sed unde didicit ille *quatuor* Ælice dici *πύρα*, aut omnino vocem illam esse Græcam?

B. Forte qui pro certo habebat vocem *quatuor*, a voce *πύρα* derivatum esse, nec videbat quomodo id aliter fieri potuit, dubitare noluit quin ibi esset vox *πύρα* ubicunq; esset *πύρες*, & debere *πύρα* verti Atticè in *πύρα*, & postea in *πύρα*, ut facilis esset transitus ad *quatuor*.

A. *Julius Scaliger* deducit quoq; *quatuor* & *quinque* a Græca origine, sed aliter. Nimirum, cum antiquissimis temporibus tria tantum numerorum nomina haberent *έν, δύο, τρία*, dicebant digitis numerantes post *τρία, χίτεςον*, & post *quatuor* *χι έν χι* quæ Latini pronuntiabant *quatuor* & *quinque*.

B. Subtilius *Scaliger*, sed uterq; nugatorie.

A. Idem centeo. Transeamus ergo ad Caput septimum,

B. Imò verò ad Decimum; nihil enim continent Septimum, Octavum & Nonum, præter numerorum variam scriptionem, nimirum, in Cap. 7. modum scribendi numeros per literas Alphabeti communem Græcis & Hebræis; in octavo item, modum scribendi per literas Alphabeti communem Græcis & Latinis; in nono de Cyphris maxima ex parte satis cognitis, cætera partim frivola partim aliena; sed a voce *cyphra* ortum habuisse docet voces *cyphrandi* & *decyphrandi* pro scriptura occulta, & ejusdem explicatione. [*Qua scribendi ratione tempore belli civilis, cum omnes fere uterentur, non pauca hujusmodi scripta in itinere suo (nota quod in Anglia itinera faciunt Eristolæ) intercepta ipsi (ut ait) explicanda tradebantur. Et quidem eorum nonnulla tam insuperabili difficultate involuta videbantur, ut fere de illorum explicatione desperaverit, nec nisi post diuturnam inquisitionem incredibili labore superaverit. Quorum non pauca specimina in publica Bibliotheca Bodleyana Oxonia conservanda tradidit.*

A. Ad scientiarum *Wallissianarum* cumulum una defuit gloria bene decyphrandi; merito ergo peritiam istam suam ignorari noluit. Præsertim cum *Thuanus* vitam scribens *Francisci Vietæ* Geometræ & Algebristæ (ante *Wallisium*) maximi ingenium ejus ab eadem facultate laudavisset. Nam *cyphra* Symbola sunt, & earum cognitio est pars Symbolica. Itaq; æquem erat ut ab ea Arte, ipse (ut cui decrat laudator similis *Thuano*) laudaret sese.

B. Incipit

B. Incipit hinc jam opus Arithmeticum, sed antequam ad examinationem ejus veniamus, non abs re fore arbitror si Geometriæ & Arithmeticæ Principia, quantum fieri potest, accuratissime statuamus, præsertim ea quibus utuntur (ab *Euclide*) Mathematici omnes; ut quæ in illis accurata sunt etiam nos utamur, quæ accurata non sunt corrigamus, & quæ desunt suppleamus. Sunt enim vera & accurata Principia legitimarum demonstrationum *αριθμητικῶν* unicum. Definitio ergo puncti accuratene tradita est ab *Euclide*, nempe hæc, *Punctum est cujus nulla est pars?*

A. Accurata est, sed è Geometris plerisq; male intellecta. Nam verba hæc *cujus nulla est pars*, ita intelligunt, quasi scriptum esset *cujus nulla potest esse pars*. Nonne videtur tibi aliud esse *Actum* negare, aliud *negare* Potentiam?

B. Negatur *Actus* tum cum dicitur *esse Indivisum*; negatur potentia cum dicitur *esse divisibile*. *Euclidis* ergo Definitio tollit Puncti divisionem, at quantitatem non tollit. Nihil enim impedit quo minus *Quantum* sit id quod est *Indivisum*. Illi vero, qui dicunt Punctum esse *Indivisibile*, omnino tollunt quantitatem ejus, & faciunt ut sit *Nihil*; quod aliquoties facit *Wallisus* in omnibus ejus libris Mathematicis.

A. Divisio est opus intellectus, intellectu facimus partes; itaque Astronomi non in Cælum ascendunt ut sphaeras dividant, sed quasi divisas considerant. Idem ergo est *partes facere*, quod *partes considerare*: Ego vero *Punctum* eodem sensu, sed ut voce ea uti possimus, aliis verbis ita definiendum accuratius esse censeo. *Punctum est Corpus cujus non consideratur (id est, non intrat in Demonstrationem Geometricam) ulla Quantitas.*

B. Secundum Definitionem hanc, impossibile est (ni fallor) ut longitudo arcus Circuli comparari possit, cum recta linea (quod faciunt Cyclometra) per doctrinam Tangentium & Secantium.

A. Quid ita?

B. Nonne potest Sector Circuli quilibet in partes quotlibet dividi, quæ partes omnes erunt totidem Sectores minores?

A. Potest. Quid tum?

B. Nonne Sector quilibet definit in Punctum?

A. Ita.

B. Si ergo quadrans Circuli (exempli causa) in Millies Mille Sectores minores divisus sit; nonne iidem Sectores compositi sunt Quadrans?

A. Etiam.

B. Et cum arcus illi arcum constituent quadrantis, nonne

& Centra eorum constituent quadrantis Centrum ?

A. Rectè : & quia Centrum quadrantis pro Puncto haberi potest, habebimus Punctum Punctis Millies Millibus æquale. Jam qui Tangentium & Secantium magnitudines calculant, pro puncto sumunt totius Arcus dividendi Centrum ; & proinde Latitudines Linearum majores justo, nempe unam lineam alia latiore faciunt, & pro exilissimis Sectoribus exilissima computant rectangula.

B. Secunda Definitio est, *Linea est longitudo quæ nullam habet latitudinem.* Videturne bona ?

A. Minimè. Nam quid opus est Latitudinem negare de Longitudine, quasi longitudo aliqua posset esse lata ? Quamvis enim solum unum alio, vel semita una alia latior esse potest, tamen Milliare unum latius esse non potest quam aliud Milliare. Est autem, non solum nec semita Via longitudo sed Milliare. *Euclides* ergo in definienda Linea hoc voluit, Lineam esse Corpus in quo longitudo quidem & sola computatur, latitudo vero non computatur, nempe *viam Corporis moti, cujus Corporis, nulla consideratur quantitas* ; Quemadmodum Lineam definivit *Hobbius*.

B. Nihil est in his duabus definitionibus tuis quod non valde com-
prohem, nisi quod non mihi videatur vox *Corpus* satis bene sonare in definitionibus Puncti & Lineæ.

A. Cur in Definitione Lineæ vel descriptione hac, *Linea fit ex fluxu Puncti*, non male sonat auribus tuis vox *fluxus*, cum fluxus non possit esse nisi Corporis ? Præterea qui dicunt Lineam esse longitudinem, non loquuntur accurate, nam longa est potius quam longitudo. Et quoniam longitudo lata intelligi non potest, definitio hæc *Euclidea* idem valet ac si dixisset *Linea est longitudo*, quæ definitio non est.

B. Tertia est *Linea autem termini sunt Puncta.* Quid huic ob-
jicies ?

A. Objicio auctoritatem *Wallisi*, qui terminum Lineæ primum, id est, Principium quod vocatur *Ultimum* quod non, non esse ipsius Lineæ terminum, sed Lineæ antecedentis. Videtur autem statuere terminum etiam alterum, nempe, Finem lineæ, esse in linea sequenti, & vocari debere *Primum* quod sic. Itaq; aut falsus est *Wallisius*, aut *Euclides* falsus erat, qui terminos lineæ in ipsa statuit linea. Sed non videtur hoc loco voluisse *Euclides* quicquam definire ; nec aliud explicare quam hoc ipsum, terminos lineæ non esse considerandos extra ipsam Lineam.

B. Quarta est, *Recta Linea est quæ ex aquo sua interjacet Puncta.* Qualis videtur ?

A. Mala

A. Mala, Nec intelligibilis, nedum accurata. Inter quznam sua ipsius Puncta potest *interjacere* Linea recta, præterquam inter extrema? Et quomodo inter ea *ex aequo* interjacet magis quam curva, nisi forte quod non declinet ab aliqua alia Linea, eadem habente extrema, magis in unam partem quam in aliam? Quod si ita sit, quare non possunt esse inter eadem Puncta extrema plures rectæ lineæ. Præterea intelligi non potest quomodo linea recta *ex aequo* (id est æqualiter) interjacere inter sua extrema dicatur, nisi intelligamus prius quid sit *æquale*.

B. Definitio æqualium ab *Euclide*, nescio qua de causa, prætermittitur est, quanquam circa Æqualitatem & Inæqualitatem omnis versetur Geometria.

A. Axioma octavum ad Elementum primum *Euclidis*, instar definitionis est *æqualium Linearum*, vel etiam *æqualium Superficierum*, nempe hoc *Quæ sibi mutuò congruunt ea inter se sunt æqualia*.

B. Non est ea Æqualium definitio; quinquam vera propositio, & quæ multis Theorematis demonstrandis satis bene inservierit, sed videtur potius descriptio quædam ejus quod faciunt illi qui magnitudines rerum metiuntur. Nam qui mensurant, mensuram congruere faciunt cum mensurato. Defini ergo Æqualia.

A. *Æqualia sunt inter se corpora, quæ eidem loco congruere possunt. Et Æquales magnitudines sunt magnitudines æqualium Corporum.*

B. Hæ quidem definitiones sunt Corporum & Magnitudinum Æqualium, non autem simpliciter æqualium. Nam *tempus*, *motuum*, *ponderum* aliarumq; rerum multarum æqualitati, neutra earum applicari potest.

A. *Tempora, Motus, Pondera æqualia seorsim definienda sunt ea esse quorum mensura (sive Corpora quibus mensurantur) æquales sunt.*

B. Nondum definiisti quid sit *æquis*, linea recta.

A. *Recta Linea ea est quæ per totam viam ab uno termino ad alterum æqualiter distat a quibuscumque Lineis similibus & æqualibus inter se & eisdem habentibus terminos.*

B. Intelligo. Sic Axis Terræ Linea est recta, propterea quod æqualiter distat per totam viam a circumferentiis duarum pluriumve circumferentiarum Meridianorum.

A. Sed neq; definitio hæc intelligi potest, nisi ab iis qui intelligunt quznam Lineæ similes vel dissimiles dicendæ sunt. Itaq; rectissime fecisset *Euclides* si Lineam Curvam prius definisset.

B. Quid est Linea Curva?

A. *Linea Curva est cujus termini, salva quantitate, diduci possunt.*

B. Nam qui aliquid Curvum facit, vel ex Curvo magis Curvum, terminos ejus adducit. Jam Lineam rectam ego met definiam eam esse cuius
termini

termini diduci non possunt. Definitio quinta est, *Superficies est qua longitudo finem latitudinemq; tantum habet.*

A. Bona est. Sexta. *Superficie terminum sunt Linea, similis est tertia, nec definitio, sed propositio, qua significatur Lineas non esse considerandas ut extra superficiem terminatas, sed in ipsa, ut Puneta in Linea quam terminant.*

B. Quid est Superficies plana? Nam definitio qua traditur ab *Euclide* eodem laborat vitio quo quarta. Illud enim ex aquo suas interjacet *Lineas* non est intelligibile. Desini ergo superficiem planam.

A. Faciam. Sed definienda est prius Linea. Est ergo *Linea, via qua fertur motum Punctum.* Et *Superficies plana via Linea ita mota, ut singula ejus puneta singulas describunt Lineas Rectas.* Definitio octava est *Anguli plani hæc, Planus Angulus est duorum in plano se mutuo Tangentium, & non in directum jacentium alterius ad alterum inclinatio.* Hujus Definitionis vitium primum est obscuritatis; nempe in voce *inclinatio.* Nam secundum *Euclidem* inclinatio esse non potest nisi in *Angulis acutis, itaq; Angulus rectus nullus est.* Secundum vitium est falsitatis; Nam *Recta & Curva* ita constitui possunt, ut nec jaceant in directum, nec constituent Angulum, ut in *Angulo Contactus, nisi putaret Angulum Contractus, esse Angulum quod ne, ar post Pelitarium Wallisius.* Ita quæ illis non *Euclidis* falsitas hæc imputanda sit. Et præterea quia duo *Anguli Recti* compositi faciunt Angulum, nimirum recti duplum, & tamen in directum jacent contra hanc Definitionem. Potremo Angulus quem faciunt duæ circumferentiæ vel circumferentia, & recta mutuo sese Tangentes, comparari posset quoad quantitatem cum quolibet Angulo alio Plano, quippe cui convenit Definitio hæc Anguli plani universalis. Sed non Anguli plani omnes comparari possunt. Est ergo vitiosa definitio.

B. Quomodo definis tu Angulum planum accuratius?

A. Sciendum est vocem hanc *Angulus planus* æquivocam esse. Nam cum in omni Angulo intelligantur duæ rectæ sibi mutuo occurrentes, vel saltem ad occursum tendentes, fieri potest ut duplici modo id fiat; quod alter est per Motum Lineæ inter, & Circularem, alter per continuam Lineæ Rectæ flexionem. Quæ duæ Angulorum generationes adeo sunt diverse, ut ipsi Anguli sint heterogene; nec una definitione comprehendi possint. Habet quidem uterq; nomen Anguli, sed alter simpliciter ita vocari solet, alter per Adjunctum *Angulus contactus.* Hæc cum non recte intellecta fuerint controversiam excitarunt de Angulo Contactus inter *Clavius* & *Pellitarium* quæ excitari non poterat, si definitio *Euclidis* satis fuisset perspicua.

B. Audiamus utriusq; generis Anguli definitionem tuam.

A. *Angulus (simpliciter dictus) est duarum Linearum sibi mutuo in plano congruentium, facta per motum Circularem super altero termino, ut Centro*

centro unius ab altera digressio.

B. Anguli quantitas quomodo definitur ?

A. Quantitas Anguli simpliciter dicti est quantitas Arcus Circuli cuiuslibet descripti Centro illo in quo Linea qua Arcum interceptunt se mutuo tangunt ab iisdem lineis interceptus. Angulus autem contactus est duarum linearum in plano se mutuo Tangentium digressio facta per continuam flexionem.

B. Quare duo hæc genera Angulorum non possunt sub uno magis amplo genere contineri ?

A. Quia non mensurantur per unius Mensuræ applicationem ; nam Angulus simpliciter dictus tantus est quantus est Arcus Circuli interceptus, ideoq; per Arcum Circuli mensuratur. At Angulus contactus mensuratur per Lineam rectam ductam a Puncto Contactus ad Circumferentiam. Itaque magnitudines duorum Angulorum Contactus mensurantur à Linea recta quæ ducitur a Puncto contactus per utriusq; circumferentiam.

B. Intelligendum est hoc de Angulo contactus Circuli tantum.

A. Imo vero de Angulis contactus quorumcunq; Curvarum, modo similes sint; sed quando sunt dissimiles, erunt Anguli contactus eorum iterum diversi generis.

B. Definitio nona est, Rectilineus Angulus est quem continent duæ rectæ. Probamne esse putas ?

A. Ita.

B. Si duo Arcus Circuli se mutuo secant, vel arcus & recta, Angulus quem faciunt Rectilineus non est, neq; Angulus contactus, qualis igitur est Angulus ?

A. Est Angulus simpliciter dictus, non enim a natura Linearum dependet natura Anguli. Potest enim a curva Linea in plano jacente Circulus describi, & Arcus interceptus idem erit ac si à recta describeretur, & proinde etiam Anguli quantitas eadem erit. Definitio decima est Anguli recti, & rectæ Perpendicularis, nempe hæc, Cum recta super rectam consistens Angulos, qui sunt deinceps æquales fecerit; Rectus est uterq; æqualium Angulorum. Et recta insistens, Perpendicularis dicitur Linea cui insistit. Sequuntur definitiones undecima & duodecima Angulorum obtusi & Acuti brevissimæ simul & rectissimæ nimirum Recto hunc quidem minorem, illum autem maiorem esse. Verum divisio hæc in Obtusum, Rectum & Acutum Angulo simpliciter dicto soli convenit. Definitio 13, Terminus est, quod alicujus extremum est.

B. Neq; Definitio est hæc, quia vox una per vocem unicam definiri non potest. Neq; omnino necessaria; nisi enim intellexissemus quid sit Terminus frustra esset definitio tertia, ubi dicitur Lineæ Terminos esse Puncta.

A. Definitio 14, hæc est, Figura est qua sub aliquo, vel aliquibus terminis comprehenditur, Quæ quidem vera est. Poterat tamen idem brevius dici, Magnitudo corporis ab omni parte finita.

G

B. Neq;

B. Neq; verò intelligi potest ad quid refertur Relativum *Quæ*, nisi ad Magnitudinem. Absurdum enim esset dicere *figuram esse, figuram quæ sub aliquo, &c.*

A. Decima quinta est, *Circulus est figura plana sub una Linea comprehensa, quæ Peripheria appellatur; ad quam ab uno puncto eorum quæ intra figuram sunt posita, cadentes omnes rectæ Lineæ inter se sunt æquales.* Definitio hæc & si vera sit, & modus describendi Circulum sine Geometrarum ope satis cognitus, pro accurata tamen haberi non debet. Debuisset enim ostendisse prius huiusmodi figuræ constructionem sive generationem quænam esset, ut sciremus aliquam in rerum natura figuram esse, in qua ab unico Puncto ad figuræ extremum omnes undequaq; Lineæ essent inter se æquales. Quod quidem, illis qui nunquam Circulum describi viderant, videri posse incredibile.

B. Quomodo autem definiendus est Circulus per generationem?

A. *Circulus est figura descripta per Lineam in plano existentem, & cujus unus terminus quiescit, circumductionem.* Quæ Methodo definiendi utitur etiam Euclides in Definitione Sphæræ, Coni, & Cylindri. Decima sexta est, *hoc verò Punctum Centrum Circuli appellatur, id est, Punctum quod in generatione Circuli quiescebat.* Decima septima hæc est, *Diameter autem Circuli est recta quadam per Centrum ducta, & ex utraq; parte in Circuli Peripheria terminata, quæ Circulum bifariam secat.* In qua nihil est non accuratum, nisi quod postrema verba, *quæ Circulum bifariam secat,* abundant. Definitio enim Diametri absoluta erat sine illis verbis, quæ inter Axiomata vel potius inter demonstrata Theoremata ponenda erant. Definitiones cæteræ usq; ad tricesimam quintam, (quæ Elementi primi postrema est) ut facillimæ, ita etiam accuratissimæ sunt. Ipsa autem postrema hæc est, *Parallæle sunt Lineæ rectæ, quæ cum in eodem sint plano, & ex utraq; parte in infinitum producantur, in neutram sibi invicem incidunt.*

B. Quid in hac Definitione reprehendis?

A. Definitionem hanc Parallelarum rectarum (quod attinet ad usum) satis bonam esse non nego. Sed quoniam Parallelismus omnis tam rectarum, quam curvarum, tam linearum, quam superficialium, ejusdem est naturæ & una definitione universali comprehensibilis, rectius fortasse fecisset si Parallelas simpliciter definisset. Præterea nisi causa aliqua in definitione Parallelarum rectarum appareat, quare duæ rectæ nunquam concurrant, absurdum non erit si huiusmodi Lineas possibiles esse negaverimus.

B. Defini ergo simpliciter Parallelas.

A. *Dua Lineæ quæcumque (sive rectæ sive curvæ) item duæ Superficies, planæ vel non planæ, Parallæle sunt, in quas incidentes Lineæ rectæ facientesq; cum utraq; Angulos æquales ad easdem partes sunt semper ipsæ inter se æquales.*

B. Video jam quare Parallæle concurrere inter se non possunt; distantur enim ubiq; ab æqualibus rectis iisdemq; æqualiter & ad easdem par-

res inclinatis. Rectè autem apponuntur verba illa *ad easdem partes*; nam alioqui definitio non esset Parallelarum simpliciter, sed solummodo rectorum. Sequuntur postulata tria. De quibus postulatis quæro quo sensu dici possint demonstrationis Principia. Postulatur enim ut aliquid possit fieri; Principiorum autem demonstrationis natura est postulare ut aliquid sit habendum pro vero sine demonstratione, quærimus enim in scientiis non quid facere nos possumus, sed quid verum est.

A. Neq; vero sunt Postulata hæc Principia *Demonstrationis*, sed *Constructionis*. Necessaria tamen sunt, propterea quod ne prima quidem Theoremata demonstrari possunt, sine Figuræ Constructione. Nam ex Constructione, id est, ex generatione sola cognoscuntur Constructi affectiones. Postulat ergo *Euclides* ab initio duci & produci posse lineam rectam; & quovis centro & intervallo describi Circulum.

B. Erravit igitur *Wallisius*, qui Punctum nihil & Lineam sine omni Latitudine esse opinatus est. Ductio enim & Productio & Descriptio Motus sunt, & propterea Motus corporum (aliud enim nihil mobile est) & significant semper aliquid, & semper divisibile, & si quantum significant non semper inter demonstrandum consideratur.

A. Sequuntur Principia alia quæ appellantur *communes notiones*.

B. Quomodo differunt inter se *Postulata* & *communes notiones*? Nam etiam *communes* & *notiones* Axiomata dicuntur. *Axioma* autem est Latine *Postulatum*.

A. Sunt revera utraq; *Postulata*. Differunt autem in eo, quod in alteris Postulatur *posse facere*, in alteris Postulatur concedi *verum esse* aliquid, ut evidens, sine demonstratione. Sed pergamus. Definitiones, secundi & tertii Elementi, quæ sunt nominum tantum impositiones, accuratæ sunt, nisi quod Definitio quarta Elementi Tertii non sit Definitio, sed *Axioma*, sive suppositio qua notum supponitur, nimirum a Puncto ad Lineam rectam brevissimam, esse perpendicularem. Similiter definitiones Elementi quarti sunt nominum ad placitum impositiones, ideoq; reprehendi non possunt. Ad Elementum quintum Definitio prima est, *Pars est, magnitudo magnitudinis, minor majoris, cum minor metitur maiorem*.

B. Sed si minor non metiatur maiorem, num ideo non erit illius pars?

A. Erit. Sed loquitur *Euclides* hoc loco de *parte aliqua*, id est, cum major dividitur in partes æquales, illarum una hæc intelligitur. Sed cum esset in Geometria loquendum sæpe de *Mensura* & *Mensuratione*, deerat tamen hætenus Definitio *Mensuræ*. Definivit partem per Definitionem mensuræ. Nam *Mensura* est *magnitudo magnitudinis, minor majoris, vel non minoris, cum minor ipsi applicata semel vel pluries ipsam æquat*.

B. Omnes quidem omnia per applicationem metiuntur; in Corporibus consistentibus mensurandis Ulna, *Bracchio*, Pede utuntur; in fluidis vasibus. Illo nempe spectant, quod dixisti supra, locum *Mensuræ* in *Mensurari*

furati loco quoties, continetur invenire. Illa enim æqualia sunt quæ salva quantitate, idem capiat locus. Sed & quæ æqualia non sunt idem capiat locus. Sic enim existimant non modo *Wallisus*, sed etiam Metaphysicorum & Scholasticorum fere tota natio,

A. Quo fundamento autem id putant?

B. Corpora dicunt eadem existentia modo rarefieri, modo condensari. Minus autem esse (quamquam idem) condensatum corpus, quam rarefactum. Fieri itaq; potest ut duo Corpora inæqualia quorum unum sit magis, alterum minus condensatum in eodem loco sint successive.

A. Nonne locus locato congruere accuratissime dicitur? Nonne *Euclides* æqualia esse dicit quæcunq; sibi congruunt?

B. Est Axioma 8 Elem. primi.

A. Quoniam igitur corpus utrumq; successive loco eidem congruit, id est, loco eidem est æquale, erunt quoq; duo illa corpora (per Communem notionem primam) inter se æqualia.

B. Ita videtur. Quid autem est quod tot non modo Philosophos sed etiam Mathematicos, ipsosq; Professores potuit in errorem hunc turpissimum inducere?

A. Accidit plerisq; hominibus circa ea quæ ignorant, idem quod pecoribus; ut enim pecora ductorem gregis primum erumpentem quacunq;, ignara periculi, sequi solent, ita & homines in quodlibet absurdum a Principe opinionis ducti facile incidunt.

B. Sed quid fefellit ipsos primos?

A. Fallere primos solet quodcum sustinuerint dogma aliquod verisimile quidem sed tamen falsum, & a dissentientibus, difficultatibus urgentur, quas superare nesciunt, ne errasse videantur, fingunt possibile esse quæ non sunt possibile, vel dicunt, aliquid quod non possit intelligi; recipitur tamen ab iis qui malunt sine molestia habere quod dicant, quam cum molestia quod sentiant.

B. Videntur autem intelligere aliquid per rarefactionem & condensationem, alioqui non insultarent in eos qui sentiunt contrarium.

A. Puto hoc sentiunt, intumescere aliquo corpore, nihil illi admisceri corporis adventitii, ut verbi causa, bulliente aqua nihil admisceri putant aeris, sed ipsam aquam eandem existentem, in majus extendi spatium loci. Sed ipsos qui doctrinam hanc de rarefactione & condensatione docere solent, unico tantum argumento cessuros credo, nimirum si qui stipendium *Walliso*, dispensatores beneficii *Saviliani* soluturi sunt, pro solidis numerarent illi totidem semisolidos, dicerentq; solidos esse (si frigore cui fortuito expositi fuissent) condensatos, non puto crederet *Wallisus* id fieri (quicquid aliàs scribere soleat) potuisse. Secunda definitio est, *Multiplis*, proba, nec difficilis, Tertia est, *Rationis*, satis inepta. *Ratio* (inquit) est duarum magnitudinum ejusdem generis mutua quadam habitudo.

B. Intelligo

B. Intellego eos qui loquuntur de Ratione, sed de habitudine loquentes non intellego. *Habitus* ab *Habendo* dicitur. Quæro igitur quid est quod hoc loco *Habet*; quid quod *Habetur*; & an Ratio dicatur *Habitus* ab eo quod ipsa *Habet* aliquid, vel ab eo quod *Habetur*, & siquidem *habeat*, quid sit quod *habet*; sin *habeatur*, a quo *habetur*. Quæ omnia sunt inepta.

A. Vox illa *habitudinis* a formulis loquendi orta est. Solebant enim Geometra, cum vellent Rationum similitudinem explicare, Græci quidem hac voce uti *ἴσους ἔχει*. Latini vero hac, *ita se habet*; quam loquutionem admisit *Euclides* in Definitionem suam Rationis, quam ideo appellavit *πολλὰ ἴσιν*, & Latini *certam Habitudinem*. Et credibile est, si Græci vulgo pro *ἴσους ἔχει* dixissent *ἴσους ἔσιν*, *Euclidem* definituram fuisse Rationem per *πολλὰ ἴσιν*, & Latini per *certam Essentiam*.

B. Quanam autem est *Rationis* definitio vera & accurata?

A. Ratio est *Relatio Antecedentis ad Consequens secundum magnitudinem*.

B. Quid sit Antecedens & quid Consequens intelligendum est ex Definitione *Relatorum*; sed tamen non cognoscitur ex hac definitione *Rationis* quantitas.

A. Neq; ex Definitione Trianguli ipsius trianguli quantitas.

B. Dic ergo quomodo computandæ sint Rationum quantitates.

A. Primo, Non omnis Ratio est quanta.

B. Mirum hoc dicis, *Rationem* aliam esse *Quantam*, aliam non *quantam*.

A. Ita est; nam Ratio Inæqualis ad Inæquale quantitatem habet. Sed Ratio Æqualis ad Æqualem quantitatem non habet.

B. Quare autem non habet quantitatem?

A. Quia nempe Ratio non est simpliciter magnitudo, sed cum relatione ad aliam magnitudinem, juxta quam relationem, una Inæqualitas, id est, una Ratio Inæqualium, aliâ major, aliâ minor esse potest; una autem æqualitas non potest. At ea quorum alia majora, alia minora esse possunt quanta sunt, cætera non sunt. Absurdum enim esset rogare quanta est æqualitas, contra vero rogare quanta sit Inæqualitas, absurdum non est.

B. Sed *Wallisius* in eodem esse dicit Prædicamento tum Æqualitatem tum Inæqualitatem; & proinde, si altera earum sit quantitas, alteram etiam esse quantitatem.

A. Quidnam est illud *Prædicamentum*? An domus aut Apotheca aliqua unde omnes æqualitates inæqualitatesq; (quando usus erit) depromendæ reconduntur?

B. *Prædicamentum* est vocabulorum series, secundum amplitudinem significationum ab *Aristotele* ordinata.

A. Scio, scio has nugas. Nimirum ex nominum (arbitrio *Aristotelis*) ordinatione naturam rerum æstimare solere eos, qui ingenio sapiunt alieno; cum e contra ex cognitione naturæ disponi debeant ipsa nomina.

B. Sed instat *Wallisius* contra vim argumenti hoc modo, si Ratio æqualitatis

litatis ob eam causam quantitas non sit, quod una aequalitas non est magis aequalitas quam alia, etiam Angulus Rectus quantitas non erit, quia unus Angulus rectus nec magis est Angulus, nec major quam alius Rectus.

A. Poterat etiam arguere sic, quia Numerus 6, nec major nec minor esse potest quam alius Numerus 6, Numerus senarius non erit quantitas. Sed Ratiocinatio utraq; vitiosa est. Nam in genere quantitatis, tam quæ inter se æqualia, quam quæ Inæqualia sunt, quantitatem habent; ut Angulus rectus, quia Angulus in genere, & Numerus senarius, quia Numerus in genere est quantitas. Ratio autem in genere quantitas non est, sed Relatio, siue Comparatio. Potest ergo una ratio quanta esse, ut tamen alia quanta non sit.

B. Verum dicis. Sed Ratio æqualitatis ideo videtur esse quantitas, quia & ipsa major vel minor, quam alia Ratio esse potest. Est enim Ratio 5 ad 5 Ratio æqualitatis; eademq; major quam Ratio 5 ad 6, & minor quam Ratio 5 ad 3.

A. Aliud est *Tantum esse absolute*, & *solitarie* sumptum, aliud *comparative*. Ratio quidem æqualitatis major esse potest quam Ratio quantitatis minoris ad maiorem, ut tamen ipsa quantitas non sit. Exempli causa, etiam si 0 nihil sit, Ratio tamen 0 ad 0 major est quam Ratio 0 ad 0 — 1, id est, quam 0 ad minus quam 0.

B. Hoc quidem verum est in Numeris vel quantitatibus fictis; sed putasne tu Rationes censendas esse eodem modo quo Numeri ficti.

A. Puto.

B. Attamen quomodo fieri potest, ut Ratio minoris ad majus quantitas sit, cum Ratio quæ sit illa major, nempe Ratio æqualitatis quantitas non sit?

A. Cum Ratio sit quantitarum comparatio, expositis duabus quantitatibus inæqualibus dupla 0 itur comparatio, altera minoris ad maiorem, in qua quæritur quantum minor a maiore superatur; altera majoris ad minorem, qua quæritur quantum major minorem superat. Itaq; Ratio Inæqualitatis est duplex, altera *Defectus*, altera *Excessus*. Sicut autem numeri finguntur ab 0 seu nihilo superari iisdem intervallis quibus ipsum 0 seu nihil superatur a numeris non fictis: ita ratio *Defectus* superatur a Ratione *Æqualitatis* iisdem intervallis quibus ipsa superatura Rationibus *Excessus*. Et per consequens ratio æqualitatis superans Rationem *Defectus*, non tam Rationem *Defectus* superat quam *Defectum* Rationis, id est, *Defectum* magnitudinis qua æquari possit cum eo quicum comparatur.

B. Videris hoc velle, in comparatione Rationum promiscue computari *Excessus* & *Defectus*, similiter ac si quis habens sui æris 20 Libras, & alieni totidem, numeraret indistincte summam 40 Librarum, cum deberet numerare nihil.

A. Ita est.

B. Sed illud Rationem *Defectus* esse *Defectum* Rationis, ad Mathematicorum aures accedet inueterum.

A. Credo

A. Credo tibi hoc. Attamen verum esse facile agnosces, si animadvertas, quando duæ Rationes, utraq; minoris ad majorem componuntur, Rationem fieri minorem.

B. Verum est, & propterea necesse, ut *Ratio Defectus sit Defectus Rationis*. Quantitates enim omnes ejusdem generis compositæ quantitatem faciunt majorem. Etiam Defectus, si defectui addatur, fiet Defectus major, & tamen Ratio facta est minor; ex quo manifestum est quod dixisti *Rationem Defectus esse Defectum Rationis*; ut qui æs alienum æri addit alieno, tanto fit pauperior quanto plus habet æris alieni.

A. Rectè capis. Sciendum præterea est magnitudines Rationum tam *Defectus* quam *Excessus* determinari per magnitudinem *Differentia*, idq; dupliciter. Potest enim *Differentia* considerari vel *absolute*, ut cum dicimus comparando 6 & 3, majorem esse 6 quam 3 tribus unitatibus, quæ *Differentia* est numerus absolutus. Vel *comparative*, ut cum dicimus majorem esse 6 quam 3 sui ipsius dimidio. Unde etiam dividi solet in *Geometricam* (quæ a Geometris simpliciter Ratio appellatur) & *Arithmeticam*. Itaq; 6 ad 3, & 7 ad 4, sunt eadem Ratio *Arithmetica* propter *differentiam* eandem 3 *absolute* sumptam. Sed in *Ratione Geometrica* 6 ad 3 & 8 ad 4 eadem est Ratio, propterea quod utrobq; *differentia* est *Antecedentis* dimidium. Cæterum Ratio *Arithmetica* non est habita ab omnibus pro *Specie Rationis*; fortasse quia ad illam (quæ est in definitione *Rationis* apud *Euclidem*) *habitudinem quandam*, non potuit accommodari. *Pappus* autem *Rationis* tredecem facit *Species*, quarum Ratio *Arithmetica* est una.

B. Perge legere.

A. *Definitio Quarta. Proportio* (Græcis ἀναλογία) est *Rationum similitudo*.

B. Quænam est *Differentia* inter *Rationem similem, æqualem, & eandem*?

A. Nulla omnino. Nam *Rationes* 2 ad 4 & 3 ad 6 eadem sunt, & *Similes, & Æquales*.

B. Quomodo differunt inter se *Proportio* & *Ratio*, sive ἀναλογία & λόγος?

A. λόγος quidem sive Ratio est comparatio quantitarum, *Proportio* vero sive ἀναλογία est comparatio *Rationum*, sive potius repetitio *Rationis* ejusdem in aliis quantitatibus: Exempli causa, 4 ad 3 est Ratio, & 8 ad 6 eadem Ratio in aliis quantitatibus. Sed ambæ *Rationes* 4 ad 3, & 8 ad 6 sunt ἀναλογία. *Quinta. Rationem habere inter se Magnitudines dicuntur quæ possunt multiplicata se mutuo superare*. Proba est si recte intelligatur. Quæ enim multiplicata se mutuo possunt superare, *Homogenea* sunt, eodemq; genere mensuræ mensurabilia; ut longitudo longitudinibus, Superficies superficiebus. Solida solidis. Quæ vero *Heterogenea* sunt diverso genere *Mensuræ* mensurantur. Sin *Lineæ* pro minutissimis *Parallelogramm*is considerentur, ut ab iis considerantur, qui *Methodo demonstrandi* utuntur

ea, qua *Bonaventura Cavalerius* in Doctrina *Indivisibilium* usus est, habent inter se Rationem etiam *Linea recta & Superficies plana*; poterunt enim tales *Lineæ* multiplicatæ quamlibet finitam superficiem planam, superare.

B. Mihi tamen Definitio hæc *Rationem inter se habentium*, ne sic quidem videtur accurata; habent enim Rationem inter se *Mensuræ Longitudinis. Temporis & Motus*; & possunt multiplicatæ se mutuo superare. Attamen inter *Lineam & Tempus*, vel inter *Lineam & Motum* Rationem esse dici non potest.

A. Potest quidem non minus dici quam *Lineam esse Tempus*. Sed *Archimedes* aliq; *Geometræ* non pauci cum *Tempus* exponere volunt, *Est* (inquiunt) *AB Tempus*, quos ego culpæ, cum omnes loquutionem illam bene intelligant, non auderem.

B. *Wallisius* auderet.

A. Definitio sexta est *Ejusdem Rationis* quæ sic se habet.

B. Siste gradum paulisper. Nonne *Analogiam* modo definivit *Euclides* esse similitudinem *Rationum*? *Similitudo* autem *Rationum* & eadem *Ratio* eadem est res. Videtur ergo mihi *Analogiam* sive *Proportionem* hoc loco iterum definire.

A. Minime. Nihil hic peccatur. Quid enim, si quis *hominem* definiret esse *animal Rationale*, apud nescios quid *animal Rationale* esset? Itaq; in definitione hac sexta illud agit ut *Proportionem*, sive eandem *Rationem* per generationem ejus definiat. Quod ni fecisset nihil inde (ut a Principio) demonstrasset.

B. Quid ita? Definitio circuli apud *Euclidem*, non est descriptio generationis circuli, sed generati, at nihilo minus constructio trianguli æquilateri inde ab *Euclide* Demonstratur.

A. Demonstratio illa dependet quidem ab ea definitione, sed ipsa definitio dependet a Postulato tertio, nempe, quo gratis sumitur posse circulum quovis describi intervallo. Jabet ergo, ad constructionem trianguli æquilateri, describi circulum; quod quo modo faciendum sit, definitio *Euclidæ* non docet. Quomodo enim inveniri medium illud punctum potest, nisi prius descriptus sit ipse circulus? Vidit ergo *Euclides* definitionem *Analogia*, nisi ostenderet quomodo eadem *Rationes* fierent, inutilem fore ad sequentia. Itaq; definitionem per generationem addidit hanc, *In eadem Ratione magnitudines dicuntur esse, prima ad secundam, & tertia ad quartam: cum prima & tertia aequè multiplicia, a secunda & quarta aequè multiplicibus, qualiscunque sit hac multiplicatio, utrumque ab utroque, vel una deficiunt, vel una aequalia sunt, vel una excedunt, si ea sumantur quæ inter se respondent.* Sed invenire, per hanc definitionem, hujusmodi quatuor quantitates impossibile est, quia multiplicatio per omnes numeros, cum infiniti sint, est impossibilis. Non est ergo definitio hæc, sed Hypothesis.

B. Rectè

B. Recte quidem dicis ; est autem Hypothesis illa vera. Vera inquam est, sed non Principium, quia demonstrabilis est, & ab *Hobbio* Capite 13°. Libri de Corpore, Art. 12°. demonstrata, sed a definitione *Ejusdem* *Rationis* per generationem diversa est hæc *Euclidis*. Manifestum enim est duas quolibet *velocitates* duorum corporum motorum, habere inter se certam aliquam *Rationem*, & quidem (dum *velocitates* illæ eadem sunt) eandem : *Velocitatem* autem definit *Hobbins* *potentiam esse mobilis in tempore determinato determinatam Longitudinem permeandi*. Ex his manifestis generationem colligit *Ejusdem* *Rationis*. Dicit enim, si duo mobilia, utrumq; *velocitate* invariata, percurrant duas *Longitudines* tempore eodem, eas *Longitudines* *Rationem* habere inter se eandem quam habent *velocitates* ipsæ ; & rursus, si duo mobilia utrumq; eadem invariata *velocitate* percurrant duas *Longitudines*, habere eas eandem inter se *Rationem*, quam habent inter se tempora quibus percurruntur. Quibus positis, sint duo mobilia ad punctum A, moveanturq; æquali *velocitate* per AB, AC. Et *velocitatem* quidem unius repræsentet AB, *velocitatem* autem alterius repræsentet AC. Venient ergo alterum ad B, alterum ad C, in eodem tempore AC, propterea quod *velocitates* amborum determinantur per spacia quæ eodem tempore percurrunt. Similiter si in parte temporis AC (iisdem servatis *velocitatibus*) alterum veniat ad D, alterum ad E, tursus erunt spatia percurra AD & AE ut *velocitates* eadem, id est, ut AB ad AC. Eodem modo, si mobile idem veniat ad B in tempore AC, veniet ad D in parte illius temporis, puta in AE, quæ sit spatio AD homologa. Nec tantum verum hoc est in motu, sed etiam in omni genere causationis, ubi causa æqualibus temporibus æqualia semper efficit. Itaq; *Eandem* *Rationem* (Capite 13°. Libri de Corpore, Art. 6°.) sic Definivit, *Ratio Geometrica* *Rationi Geometrica eadem est*, quando causa aliqua eadem æqualibus temporibus æqualia faciens, *Rationem* utramq; determinat.

A. Definitio sane hæc accuratissima est, generationemq; proportionis quasi ante oculos ponit. Sed *Euclides* per suam Hypothesin *Rationum* Doctrinam in Elemento quinto solidissime demonstravit. Anne tantundem fecit *Hobbins* per definitionem suam ?

B. Demonstravit non modo easdem propositiones quas *Euclides*, sed etiam nonnullas alias non minus difficiles, ne quidem *Wallis* ipso contradicente. Nam hoc solum de illis pronunciat, non videri ipsis esse.

A. Id est simul & laudat & invidet. Quid scribis in pugillaribus ?

B. Noto quod in Græco pro Multiplicibus ab *Euclide* dicitur πολλαπλασία, & pro Multiplicatione πολλαπλασιασμός. Nam (αναλῶν) διπλασιασμός deberet verti duplicatio, & διπλασιός sicut & διπλασίον & διπλασιόδης duplus vel duplicatus.

A. Quid ergo ?

B. Magnam facit *Wallis* differentiam inter *Rationem*, duplam & duplicatam

plicatam, triplam & triplicatam, &c. tum in Elencho contra *Hobbiūm*, tum in Tractatu Elenchico contra *Meγβωτιūm*.

A. Tanto est indoctior. Sed ego tibi negotium illud facile expedibo: *Euclides* enim vocibus illis διπλασις & διπλασιών pro eadem re promiscue utitur, sicut Latini vulgò duplum & duplicatum. Voce διπλασιών, etiam in Proportionibus utitur *Euclides* pro dupla. Lege Prop. ult. Elem. 9^a. Textum Græcum.

B. Ἐν ἀπὸ μονάδος ὅποσούν ἀριθμοὶ ἐξῆς ἐκπῶσιν ἐν τῇ διπλασίονι ἀναλογία εἰς ὃ ὁ σύμπερ πρῶτος γίνηται, καὶ ὁ σύμπερ δὲ τὸν ἕχατον πολλὰ πλάσιαδὲς ποιῇ τίνα, ὁ γενόμενος τέλειος ἔσται.

A. Quid significat hoc loco ἐν ἀναλογίᾳ διπλασίονι? Nonne significat proportionem sive similitudinem Rationum quæ cernitur in numeris ab *Euclide* expositis, nimirum his, 1. 2. 4. 8. 16, &c. in quibus numerus posterior prioris semper est duplus? Nam si de Ratione ipsa duplicata intelligeretur, numeri 1. 2. 4. 8. 16, &c. non magis dicendi essent esse ἐν ἀναλογίᾳ διπλασίονι quam 1. 3. 9. 27. 81, &c. Itaq; propositio hæc *Euclidis* de numero Perfecto, in omni Progressione Geometrica non minus vera esset quam in Progressione hac per duplicationem. Necesse ergo est ut voce hac διπλασιών usus sit *Euclides* pro duplicato numero, id est, pro duplo, non pro duplicata Ratione. Igitur Ratio 1 ad 2 non est subdupla Ratio, sed Ratio Simpli ad duplum sive semissis ad Integrum; neq; inversè, Ratio 2. ad 1 est Ratio dupla: sed Ratio dupli ad simplum, sive Integri ad Semissem.

B. Accurate hæc. διπλασιών ergo idem est quod duplus. Voces autem subduplus, subtriplus, &c. barbaræ sunt, & ab iis inventæ, qui cum in tenebris versarentur cupiebant quoquo possent modo sese promovere. Ostendisti jam διπλασιών apud *Euclidem* significare in numeris duplum. Ostende etiam quod significat apud eundem, in Rationibus, Duplicatum.

A. Ecce in definitione Elementi quinti decima, sic dicit *Euclides* "Ὅταν δὲ τρία μεγέθη ἀνάλογον ᾖ, τὸ πρῶτον πρὸς τὸ τρίτον διπλασίονα λόγον ἔχειν λέγεται, ἢ περ πρὸς τὸ δεύτερον, ubi Rationem Rationi sibi æquali additam, id est, Rationem multiplicatam per 2, id est, Rationem duplicatam vocari vides διπλασίονα.

B. Video vocem illam utrumq; significare apud *Euclidem*, tum duplum tum duplicatum, quemadmodum apud authores Græcos ceteros omnes. Video etiam vocabula Latina duplum & duplicatum idem significare, ut & Græca, διπλῆς, διπλασίως, διπλασιών, διπλασιαδὲς. Sed cur noluit *Euclides* uti voce διπλασίως cum potuit, & ad evitandum ambiguitatem videtur debuisse, nondum perspicio.

A. Quanam esse potest ambiguitas in vocibus quæ idem significant ubiq;. Sunt qui διπλῶν distinguunt à διπλασίω, hoc numerum, illud quantitatem continuam respicere dicentes. Sed inter διπλασίον & διπλασίονα.

είων differentiam nullam observant, neq; Grammatici neq; Mathematici Græci. Credo equidem διπλασίον Nomen Rectum factum esse à nomine Plurali Genitivo διπλασίων, cuius Rectus singularis est διπλασιος. Itaq; in propositione ultima Elementi noni ἐν ἀναλογίᾳ διπλασίονι idem esse quod ἐν ἀναλογίᾳ διπλασίων, & in hac definitione 10^a, λόγον διπλασίονα idem esse quod λόγος διπλασίου. Nihil ergo est difficultatis in eloquutione Mathematicorum veterum. At recentiores difficultatem sibi ipse creaverunt ex vocibus barbaris (*subduplum*, *subtriplum*, &c. quippe qui non meminerant ex duplicatione vel etiam multiplicatione aliquid fieri posse aliquando minus. Nam quantitates fictæ quales sunt 0-1, 3-5 & aliæ, id est, minores quam nihil; quanto plus multiplicantur a numero vero, tanto minores fiunt. Definitio 7^a est Proportionalium accurata, sed & facillima. Est enim (definita jam *Eadem Ratione*) tantummodo nominatio eorum quæ Rationem inter se habent. Octava sicut 6^a demonstrabilis est.

B. Quomodo Rationem maiorem definis tu?

A. Rationem quidem maiorem, Rationem esse dico majoris Antecedentis ad idem Consequens, vel ejusdem Antecedentis ad Consequens minus. Rationem autem minorem esse Rationem minoris Antecedentis ad idem Consequens, vel ejusdem Antecedentis ad Consequens majus.

B. Accuratè.

A. Nona, Definitio non est, sed Propositio gratis assumpta, nempe, Proportionem in tribus terminis paucissimis consistere, cum tamen accurate loquendo, consistat in quatuor paucissimis. Omnis enim Ratio consistit in duobus terminis paucissimis, & omnis Proportio in duabus paucissimis Rationibus. Quando vero duæ quantitates mediæ æquales inter se sunt, id non numerum minuit terminorum. Elementi hujus quinti definitiones decem reliquæ accuratæ sunt.

B. Transeamus ergo ad definitiones Elementi sexti.

A. Sunt illæ, excepta quinta, quæ & ultima est, omnes accuratæ. Nam illa quinta, cum & demonstrari possit & demonstratione indigear, neque pro definitione, neque pro Principio demonstrationis haberi debet. Est autem hæc, Ratio ex Rationibus componi dicitur, cum Rationum quantitates inter se aliquam effecerint Rationem.

B. Demonstra (quoniam demonstrabile esse dixisti) ex multiplicatione inter se Antecedentium duarum Rationum, & ex multiplicatione inter se Consequentium, existere ipsarum Rationum unius ad alteram Additionem.

A. Rationes addendas propone quas vis.

B. Rationi 2 ad 3 adde Rationem 4 ad 5 per multiplicationem.

A. Multiplico Antecedentes 2 & 4 in se, qui faciunt 8; deinde

H 2

multiplico

multiplico in se consequentes 3 & 5; producitur 15. Probandum est Rationem 8 ad 15 æqualem esse ambabus Rationibus 2 ad 3 & 4 ad 5. Nam 4 multiplicans 2 & 3 facit 8 & 12. Est ergo Ratio 8 ad 12 eadem quæ 2 ad 3. Rursus 3 multiplicans 4 & 5 facit 12 & 15. Est ergo 12 ad 15 eadem Ratio quæ 4 ad 5. Sed in his numeris 8. 12. 15. Ratio primæ ad ultimam æqualis est ambabus Rationibus simul 8 ad 12, & 12 ad 15, hoc est, ambabus Rationibus 2 ad 3 & 4 ad 5. Itaq; demonstravi Rationem Rationi (per multiplicationem in se Antecedentium amborum & amborum Consequentium) additam esse, ut imperasti.

B. Quomodo autem Rationes altera alteri aliter addi possunt?

A. Si, nempe, ut Antecedens est ad Consequentem unius Rationis, ita fiat Consequens alterius Rationis ad quartam. Nam si Rationi 2 ad 3 addenda sit Ratio 4 ad 5, fiat ut 4 ad 5, ita 3 ad aliam. Prodebit $3\frac{1}{4}$. Ponantur ordine 2.3. $3\frac{1}{4}$. Ratio ergo 2 ad $3\frac{1}{4}$ est summa Rationem 2 ad 3 & 3 ad $3\frac{1}{4}$. Est enim Ratio 3 ad $3\frac{1}{4}$ eadem quæ Ratio 4 ad 5. Et siquidem tres quantitates 2.3. $3\frac{1}{4}$. multiplicentur omnes per 4, prodibunt 8. 12. 15. iidem numeri qui facti erant per multiplicationem.

B. Recte demonstratum est. Sed nonne sicut Ratio Rationi additur per multiplicationem, ita subductio unius Rationis ex alia fieri potest per divisionem?

A. Etiam. Nam (exempli gratia) à Ratione 8 ad 15 sit subducenda Ratio 4 ad 5. Divido ambos numeros 8 & 15 per 4, unde fiunt Quotientes 2 & $3\frac{3}{4}$ qui sunt in Ratione 8 ad 15. Rursus divido 15 per ambos numeros 4 & 5, & fiunt Quotientes $3\frac{3}{4}$ & 3, qui sunt in Ratione 12 ad 15. Positis ergo ordine numeris 8. 12. 15. si à Ratione 8 ad 15. subtrahatur Ratio 12 ad 15, id est, Ratio 4 ad 5, relinquetur Ratio 8 ad 12, sive Ratio 2 ad 3.

B. An non Ratio à Ratione subduci potest etiam sine his divisionibus?

A. Potest. Nam si fiat ut Consequens Rationis subducendæ ad Antecedens suum, ita Consequens Rationis integræ ad quartam, Ratio quæ post subductionem relinquitur erit Ratio Antecedentis ad illam quartam. Verbi gratia, si à Ratione 8 ad 15 auferenda sit Ratio 4 ad 5, fiat ut 5 ad 4 ita 15 ad quartam quæ erit 12. Positis ergo ordine 8. 12. 15 si à Ratione 8 ad 15 auferatur Ratio 12 ad 15, id est, Ratio 4 ad 5 relinquetur Ratio 8 ad 12, id est, Ratio 2 ad 3.

B. Clarissime.

A. Animadverte quam sit ab improprietate verborum, pronum hominibus prolabi in errores circa ipsas res. Sicut enim in proposita Ratione sumpsisti Rationem quantitatum compositarum, ita *Wallis*, aliique plurimi Rationem duplorum sumunt pro Ratione dupla

dupla, decepti ab improprietate eloquutionis.

B. Miror autem quod tam clamorè contendat in Elencho *Wallisii* Compositionem Rationem non Additionem sed Multiplicationem dicendam esse.

A. Tam diu autem mirari non defines quam diu ab homine qui eascripsit quæ hæstenus legimus, quicquam expectabis accuratum.

B. Ex hac Rationum compositione manifestum est, expositis quocunque quantitatibus, Rationem primæ ad ultimam æqualem esse Rationibus omnibus primæ ad secundam, secundæ ad tertiam, & sic deinceps usque ad ultimam, simul sumptis.

A. Est ita ut dicis; & ejus rei causam ostendit ipsa operatio. In quantitatibus enim tribus quibuscunque A.B.C. dubitari non potest quin exposita A ad expositam B, Rationem habeat A ad B, & similiter exposita B ad expositam C Rationem habet B ad C, quare Ratio A ad C composita est ex duabus partibus nimirum, ex Ratione A ad B & Ratione B ad C; & siquidem essent quatuor quantitates A. B. C. D. Ratio B ad D (propter eandem causam) componeretur ex Rationibus A ad B & B ad C, & C ad D.

B. Video ita esse. Sed hoc melius aliquanto videtur mihi demonstrasse *Hobbius* in Libro de Corpore Cap. 13. Art. 13. definitionem deducens a doctrina de motu?

A. Sed Doctrina de motu paucissimis cognita est; cum tamen Natura omnia, non modo quæ Physicæ, sed etiam quæ Mathematicæ contemplationis sunt per Motum transigit. Primus qui scripsit de Motu quod cernum lectu erat fuit *Galilaus*. Progrediamur jam ad Elementum septimum; ubi primò definitur *Unitas*, sed (ut modo vidisti) male; deinde *Numerus* (contra sententiam *Wallisii*) optimè. Tertia Definitio est *Partis* (subaudi aliquoræ) quod sit *majoris quantitatis mensura*; & rectè, si per *Partem aliquoræ* intelligatur *Pars aliquota Numeri*. Alioqui *Pars* in Definitione *Mensura*, non *Mensura* in Definitione *Partis* ponenda est. Quinta hæc est *πολλαπλάσιος ἐστὶν ὁ μῦθος τῷ ἐλάττωτος ὅταν καταμετρεῖται ὑπὸ τῷ ἐλάττωτος*. Latini qui sic vertunt *Multiplex est major minoris, cum majorem metitur minor*, anne distinguunt inter *Multiplex* (quod est *Multiplicatum*) & *Multiplum*?

B. Non certe hoc loco; neque Græci inter *διπλάσιον* & *διπλασίονα*. Nam si fecissent, non *πολλαπλάσιον* dixisset *Euclides*, sed *πολλαπλασίονα*.

A. Cætera bene se habent.

B. Transeamus ergo ad Definitiones Elementi decimi.

A. Sunt & illæ accuratæ omnes.

B. Antequam progrediare, velim dicas mihi quo fine, sive cui beno *Euclides* Theoremata illa Elementi decimi difficilissima nobis Demonstravit.

vit. Cæteras enim Geometriæ partes omnes usui esse video in communi vita, aut ad ædificandum, aut ad navigandum, aut ad machinas, aut ad Calculum Temporis, aut ad Picturam, aut ad Philosophiam naturalem, aut deniq; ad aliquid, cui vero rei Linearum hæc irrationalium cognitio inserviat nondum cerno. Scio quæ pulchra sunt difficilia esse, sed ut vicissim quæ difficilia sunt etiam pulchra sint, necesse non est.

A. Quo fine hæc demonstravit certè nescio, sed quin in omni re ingenii splendor ipse per se pulcherrimus sit dubitandum non est. Atamen si ab ipso opere de consilio opificis conjicere liceat, voluisse puto *Euclidem*, quantum potuit Linearum omnium in Figuris certa & cognita lege descriptarum rationes convertere in rationes numerorum. Quod si Natura fieri passa esset computatio quælibet facillima facta esset, nimirum in tabulas digestis omnium rerum rationibus. Restant Definitiones Elementi undecimi, illæ quoq; ad scientiarum severitatem exactissimæ.

B. Quid? Tunc Sphæram, Conum, & Cylindrum bene Definiri existimas per Motum Semicirculi, Parallelogrammi, & Trianguli super quiescentes Axes?

A. Quidni?

B. An Stellarum fixarum vel cujuslibet Planetæ Sphæram descriptam fuisse putas a conversione Semicirculi? Similiter Axes (horum corporum) qui definiuntur ab *Euclide* per rectam Lineam quiescentem; nonne Axes sunt, etiamsi non quiescerent, sed quocunq; ferrentur corpora ipsa (quorum Axes sunt) ferrentur una?

A. Tu firmum hoc Argumentum esse credis!

B. Ita. Et eodem usus est *Wallisius*.

A. Professorne *Saviliannus* reprehendere *Euclidem* ausus est?

B. Non *Euclidem* reprehendit sed *Hobbius*.

A. Etiam *Euclidem* si modo eodem Argumento contra utrumq; uti potuit.

B. Esto. Sed cum Lineam definisset *Hobbius* esse corporis (cujus nulla consideratur quantitas) Moti via. Quid opus est (inquit *Wallisius*) notione Motus ut quid sit Linea intelligatur? Annon Linea corpori quiescenti insunt, &c.? Pariter ego dico tibi, quid opus est nominare Motum ut intelligatur quid sit sphæra? Annon potest concipi quiescens Semicirculus in sphæra?

A. Si ille *Hobbius*, etiam tu *Euclidem* recte reprehendisti. Sed erratis ambo nescientes naturam Definitionis. Nonne sunt definitiones scientiarum Principia?

B. Sunt.

A. Et omnis scientia a cognitione causarum derivanda?

B. Verum.

B. Verum.

A. Ergo Principium scientiæ est cognitio causæ.

B. Etiam.

A. Sequitur ergo cognitionem causæ contineri debere in Definitione.

B. Fateor.

A. Itaq; optime definiunt illi qui generationem rei in Definitione explicant.

B. Etiam hoc concedo, & in *Euclidis* Sphæræ, Cohi, & Cylindri Definitionibus generationes illorum corporum video, quanquam non similiter definierat Circulum.


A. At Circulum describi posse (qui describi nisi per motum non potest) inter Postulata ut rem notam, gratis sumsit.


B. Saltem dicere debuit *Euclides* Sphæram esse Solidum quale sit potius quam quod sit ex circumductione Semicirculi. Nulla enim est sphaera quæ per Circumductionem facta est a natura.

A. Qui Figuras definiunt, Ideas, quæ in animo sunt, non ipsa corpora respiciunt; & ex iis quæ imaginantur fieri deducunt proprietates factorum similium, a quocunq; & quomodocunq; facta sunt. Vidimus jam Principia Geometriæ tradita ab *Euclide*, quorum aliqua quidem, sed paucius minus accurata mutavimus, reliqua ut irreprehensibilia partim præterivimus, partim confirmavimus.

B. Revertamur ergo ad *Wallisium*, & unde digressi sumus, nempe ad Caput decimum. Nam si bene memini eramus ad Philologicorum & Capituli noni finem, tunc cum digredi incepimus.

A. Sed differamus hæc in triduum, quo tempore lætis Arithmeticæ ejus quæ restant, ea tantum quæ materiam colloquia nostro subministrare possunt, discutienda deligam, ne ea quæ utilitatem nullam, molestiam nimiam nobis allatura sunt sæpius reperamus.





Dialogus Tertius.

B. **E**gistin' reliqua Arithmetica Wallissiana?

A. Ita.

B. Plenane videntur tibi, sicut antecedentia, erroribus?

A. Minime. Sunt enim pleraque ex iis Arithmeticae libris desumpta, qui pueris ediscendi scripti sunt; cetera aut *Oughtredi* sunt, aut maxima ex parte falsa.

B. Sed quæ ab aliis habuit, ipse solus demonstravit.

A. Neque hoc quidem. Verum hæc inter legendum considerabimus accuratius. In Capite decimo, Numerationem in Notis Numeralibus vulgaribus explicat, & cujusque Notæ, tum proprium, tum Loci valorem, tam in Fractionibus Decimalibus, quam in Integris exponit; Ostenditque, sicut a loco *Unitatum* ad loca præcedentia proceditur per decuplationem, ita a loco eodem ad Loca sequentia proceditur per subdecuplationem. Quarum quidem rerum demonstratio non est, sed Constitutio fuit arbitraria. Explicatio autem & brevis & perspicua & accurata a Magistro expectanda erat. Et primò quod ad Numerationem periodos adhibeat, periodumque per loca tria potius quam per quatuor aut alium numerum finiat, non videtur ad Artem Arithmeticam pertinere.

B. Sumamus numerum quemlibet; eundem (verbi gratia) quem ille sumpsit 2,468,013,579. Quomodo numerus hic verbis proferendus est.

(A. Recte proferendus, non ut Wallisius loqui solet *afferendus*.)

B. Quomodo (inquam) proferendus est sine periodis?

A. Periodos utiles esse non negavi, sed quæro cum locis ternis defini-
antur

B. Si

B. Si Notarum valorem verbis enuntiaveris, videbis ipse.

A. Significant Notæ illæ *duo millia millium n. millium, quadringenta sexaginta octo millia millium, tredecem millia & quingenta septuaginta sex.*

B. Nonne vides verba tua distinguere te, quemadmodum ipsæ Notæ per loca terna distinguuntur.

A. Ita, sed Latine Distingue jam tu easdem notas per nomina numeralia (si potes) Græcè.

B. Possum, *ἑκατὶ τέσσαρες μυριάδες μυριάδων, ἑξακισχίλια ὀκτακόσιαι, καὶ μία μυριάς, τρισχίλια, πεντακόσιαι, ἑβδμήκοντά ἑννα;*

A. Sed hæ voces distinguunt Notas numerales non per loca terna, sed per quaterna, hoc modo, 24, 6801, 3579. Nihil igitur ad scientiam Arithmeticam, quæ universaliter omnibus gentibus eadem est, sed ad diversas gentium Dialectos pertinet. Deinde cum dixisset, *cyphra* que locis supremis ponuntur nulli prorsus sunt usui, nullius saltem necessitatis, sed redundant potius; tantundem enim significant 0001, 001.01, &c. subjungit ridiculè, [Fieri quidem nonnunquam potest ut: Elegantiæ gratia, vel quo numerorum supputandorum collatio commodior fiat (ut in apposito exemplo) ejusmodi redundantes cyphra scribantur]

Lib æ	Solidi	Denarij
13	12	10
24	08	06
05	04	01

Næ ille Elegantiæ æstimator imperitus est qui inutiles istas ciphras ad supplendas lacunas præfigere Elegantiæ esse judicat. Deinde paginas duas insumit ad declarandam naturam Fractionum decimalium; quod etiam imperitiæ est. Cum enim locorum valores in Integris procedant a loco *Unitatum* semper, per 10 multiplicando, & Fractiones decimales procedant a loco eodem *Unitatum*, semper per 10 dividendo, supervacaneum erat distinguere loca dextra & sinistra. Nam posita Fractione hac decimali $\frac{1}{1000}$ erunt facti (dividendo per 10) $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{1}$ sicut integri 10. 100. 1000. facti (multiplicando per 10,) proportionales. Itaq; tota fractio valebit $\frac{1}{1000} + \frac{1}{100} + \frac{1}{10} + \frac{1}{1}$. Similiter Fractio hæc $\frac{554}{1000}$ valebit $\frac{5}{100} + \frac{54}{1000}$. Miror ergo quomodo verba hæc repe.ire potuit quibus fere duas paginas impleveret.

B. Scis eum non modo Professore Geometriæ, sed etiam Concionatore esse, & propterea in quarendis verbis necessario & multum exerceri.

A. Sed cur numeros integros, & partes decimales conjungendas esse censuit, sicut in hoc numero fecit, quem exempli causa proponit ipse, 3579753? Cur etiam partes de legit 753 quæ inversæ sunt integrorum

357? Nam lectorem imperitum a veritate abducent, tamquam regula illa divisionis per 10, non esset aliter vera.

B. Cur ita fecit nescio; nisi quia *Oughtredus* Fractiones decimales post *Unitatis* locum posuit, ut quæ sunt a numeris post divisionem per 10. 100. 1000, &c. residuis, & separatrice Linea qua Quotiens a numero Dividendo separatur, distinxit; eo fine ut Additionem, Subtractionem, Multiplicationem, & Divisionem tam integrorum quam Fractionis iisdem operationibus complecteretur, ideo *Wallisus* qui forte quid ab *Oughtredo* fieret, non cur fieret animadvertisset, numeros ambos (integrum & fractionem) conjunxit etiam ubi non esset opus per imitationem.

A. Verisimile est. Cur autem tot verbis ad rem tam facilem explicatu usus est manifesta causa est, quod ea quæ scripturiebantur cruda adhuc & indigesta illi erant. Quæ autem nondum perfecte didiceris nunquam breviter & perspicue explicare poteris. Sequitur Caput undecimum de Notatione Algebraica.

B. Est in eo Capite quod non intelligo.

A. Ostende locum.

B. En. Si vero, &c.

A. [Si vero eadem unitatum multitudo (nempe 27) in continua proportionem quadrupla disponatur, emerget quaternionum quaternio unus, & duo insuper simplices quaterniones, cum tribus residuis Unitatibus.]

B. Hoc, inquam, non intelligo. Nam si jubeam disponere 27 in proportionem quadrupla, continua, id est, in proportionem numerorum 1. 4. 16, pro primo numero ponerem A, pro secundo 4A, pro tertio 16A; quorum summa est 21A. Diviso ergo 27 per 21 prodibit $\frac{27}{21}$ sive $1\frac{2}{7}$, pro A. Et 4A erunt $5\frac{1}{7}$ & 16A $20\frac{4}{7}$, qui numeri faciunt aggregatum 27: Quod verum esse scio, sed non intelligo quomodo consistit cum uno quaternario quaternariorum, duobus quaternariis & tribus unitatibus.

A. Nec mirum. Nam non id voluit *Wallisus*, sed ut numerus 27 disponeretur secundum loca ab Unitate valoris continue quadrupli. Quod est verissimum. Nam si ultimus locus sit Unitatum, penultimus erit quaternariorum & tertius sedenariorum. Est autem 27 uno sedenario duobus quaternariis & tribus Unitatibus æqualis.

B. Video eum ita intelligendum esse; sed debuit sic dixisse.

A. Male quidem se explicuit. Ostendere enim voluit hoc loco quomodo scribendus esset numerus, si locorum valores non in Ratione continua decupla (ut vulgo fit) augerentur, sed in proportionem qualibet alia ut quadrupla vel tripla; vel quod idem est si numerus Notarum esset minor quam (ut nunc sunt) novem, quomodo scriberetur 27. Et verum est numerum 27 qui in proportionem decupla scribitur sic, 27, in proportionem quadrupla debere scribi sic 123, & in proportionem tripla sic 1000.

B. Sed nullam habet ejus rei demonstrationem. Ostende igitur quare ita esse necessarium est. Et sit data proportio tripla.

A. Quoniam sicut in proportionibus decupla novem tantum sunt notæ quibus utimur, & decima cyphra, ita in proportionibus tripla, duo tantum erunt Numeri digiti & tertia cyphra. Erit autem 1 in loco ultimo Unitas; Et in loco tertio ubi recurrendum est ad 1 & cyphram significabit 10 ternarium. Et in loco nono, 100 significabit 9 (ut enim 3 in 3 facit 9, ita 10 in 10 facit 100) Et in loco viceffimo septimo 1000 valebit 27 propterea quod sicut 3 ad 27 sunt in proportionibus 3 ad 9 duplicata, ita numerus valens 27 debet esse in proportionibus 10 ad 100 duplicata. Scribendus est ergo 27 per has notas ut 1 ante tres cyphras significet id quod sit ex ternario in se ter multiplicato, id est, 27.

B. Si esset tantum una nota numeralis præter cyphram, quomodo scriberetur idem numerus 27?

A. Si ita esset, valor locorum procederet per Rationem duplam, & recurrendum esset alternis locis ad 1 & cyphram vel cyphras. Nam 1 in ultimo loco significaret Unitatem, in secundo ab Unitate, 10 significaret 2, & 11 in tertio loco 3, & 100 in loco quarto 4, & 10000 in loco decimo sexto 16. (Nam ut 4 in 4 facit 16 ita 100 in 100 facit 10000) deinde 11000 in loco 24^o valebit 20. & consequenter 11001 valebit 25. 11010 valebit 26, & denique 11011 valebit 27, id est, 1 Unitas, 1 binarius, 1 octonarius. & 1 sedenarius, qui simul faciunt 27.

B. Verum est. Sed nonne potest ubi valores locorum sunt in ratione dupla Numerus scribi 27 per alias notas quam 11011?

A. Potest, sed assumenda est nota binarii. Nam sub his notis proportionis duplex 8, 4, 2, 1, subscribe 2, 2, 1, 1, hoc modo $\begin{smallmatrix} 8 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{smallmatrix}$ valebit 2211 duos octonarios, duos quaternarios, & præterea binarium, & Unitatem; qui Numeri faciunt simul additi 27.

B. Sed quando opus erit ut paucioribus notis utamur quàm novem quibus utimur; Perge legere.

A. His ita explicatis monendum duco, Universam Artem Algebrae sive Analytica ex hoc uno quasi fundamento dependere. Nam revera quod nobis gradus (sive ascendens, sive descendens) primus, secundus, tertius, &c. illud est Algebraistis, Latus, Quadratum, Cubus, &c. Concedo Latus, Quadratum, Cubum, fundamentum esse (cui insisterem dicam, an contra cum Wallisio) ex quo dependet regula Algebrae. Sed non inde dependet Ars Analytica. At ille illam quam modo tractavit numerationem, (nempe per locorum valores in proportionibus decuplis, quadruplis, triplis, &c.) Algebrae fundamentum esse statuit; id quod difficile est credere, cum ante illum multi fuerint Algebraistæ, sed qui Nume-

Numerationes has novas edidit ipse primus est.

B. Nusquam tamen quod memini, Numerationibus istis in sequentibus utitur. Sed per fundamentum intelligit non illud, sed proportionum ab Unitate incipientium varietatem omnem. Itaq; verum est quod dicit.

A. Esto. Cur autem paulò post de veteribus loquitur Algebristis acsi id aut ignorassent aut dissimulassent, & causam ignorantiae eorum eam esse dicit *Quod Arithmeticorum Unum (non vero, ut oportuit, Nullum) cum Puncto Geometrico compararent.*

B. Certe in Elencho suo contra *Hobbiū*, multis in locis affirmat *Punctum* esse *Nihil*. Postea verò in alio libello defendens librum suum de *Angulo Contactus* & de *Arithmetica Infinitorum*, contra eundem *Hobbiū*, negat se ita dixisse. Nunc autem illum saltem sic sentire satis intelligo.

A. Video Phantasiā ejus, aliis Ideis omnibus deletis, solis occupatam esse Symbolis. Quī enim aliter fieri potuit ut Symbola Radicum Numerorum etiam non quadratorum numeros appellaret, sanus & Mathematicus? Quī fieri potuit ut Geometriam ab Arithmetica dependere diceret qui sciret Radices numerorum quadratorum rite extractas esse demonstrari non posse, nisi per quartam propositionem Elementi 2ⁱ *Euclidis* pure Geometricam? Deniq; quī potuit, Veterum Geometrarum omnium capitibus ita insultare, ut diceret eos Algebram ignorasse, idque quia nesciebant *Punctum* Geometris idem esse quod *Nihil* Arithmeticis qui sciret si *Punctum* nihil sit, neq; *Lineam*, neq; *Superficiem*, neq; *Solidum* quicquam esse? Præterea, considera proxima ejus verba hæc, *Non quia Linea bipedalis addita facit quadrupedalem*, ideo duo & duo faciunt quatuor, sed potius quia hoc, ergo illud. Subintelligitur ergo *Geometria ab Arithmetica dependere non hac ab illa*. Belle admodum. Dic mihi propositio illa *duo & duo faciunt quatuor* estne Definitio?

B. Non.

A. At Axioma?

B. Ita.

A. Est ergo lumine naturali cognitum non a Magistro Arithmetica repertum; sed cum ipsa verborum intellectione a pueris receptum. Non ergo habet ab Arithmetico Geometra *Lineam bipedalem Linea bipedali additam facere Lineam quadrupedalem*.

B. Non sit ergo Axioma, sed ab Arithmetico demonstrandum.

A. Quis autem illud Arithmeticus aut demonstravit aut demonstrare se debuisset judicavit? Satis enim a nutricibus dum nomina numerorum pueros docent demonstratur. Quid, quod infinitæ sunt quantitates

tes continuæ quarum unius ad aliam ratio numeris explicari non potest? Quomodo ergo contemplationis sunt Arithmetica quæ versatur tantum in rationibus numero um? Contra vero inter numeros ratio nulli est quæ non exponi possit Lineis. Quid quod radices numerorum, quæ Algebram fere totam sustentant, pleræq; (ut ante monuimus) numeri non sunt? Quare & calculus earum non Arithmeticus sed Geometricus est. Quid, denique quod cum ad Equationem ventum est, problema plerumque demonstrari non potest sine aliqua Effectione Geometrica? Hæc cum ita sint, quid censēs, Geometriam Arithmeticæ, an hanc illi subordinatam esse?

B. Ego verò nunquam dubitavi quin Arithmetica Geometrix pars, nec ea magna, esset. Nam ex *Euclidis* libris pure Geometricis, educi facile potest Arithmetica; cum Libri Arithmetici ne omnes quidem simul, qui unquam scripti sunt, aut quos scripturus est *Wallisius*, sufficiant ad producendam centesimam partem Theorematum Geometricorum quæ nunc habemus.

A. Adde & hoc, quod sicut Regula Alligationis, & Regula Falsi, ita Regulam Algebræ unam esse ex Regulis Arithmeticæ.

B. Sed multo illis ampliorem.

A. Assentior. Sequitur usus Symbolorum, nempe *Necessitas*, *Brevitas*, *Perpicuitas*. [*Primo (inquit) Necessitatis causa; cum pro numero adhuc ignoto substituitur Symbolum, seu Character, eo usque dum ipse innotescit.*] Quasi problema quod substituto Symbolo seu Characterē investigatur, investigari non posset sine Symbolo?

B. An potest?

A. Quid? An vox hæc *Ignotum* vel *Quæsitum* minus denotat numerum quem quærimus quam litera A, vel R. vel Character *p*? Aut minus recte dicemus *quæsitum quadratum*, quam AA, vel Aq, vel A₂?

B. Sed brevior est scriptio per Literam unam quam per integrum vocabulum.

A. Hoc quidem concedo tibi de brevitate scriptionis, non autem de brevitate cogitatorum; quia non Characteres soli, nec sola verba, sed res ipsæ cogitandæ sunt, quæ abbreviari non possunt.

B. Nescio quid respondeam.

A. Deinde si *Necessitas* illa absoluta non sit, sed ex supposita brevitate, quid dices de secundo usu Symbolorum, nempe, de brevitate, quare primus usus non sit supervacaneus?

B. Nescio hoc quoque.

A. Deinde quod addit [*Brevitatis & Facilitatis causa, cum illud non raro citius peragatur per Symbola seu Species, quam per ipsos numeros*] nisi intelligatur de scriptione, falsum est. Nam & res, & verba & Sym-
bola

bola cogitanda erunt, quorum ultimum erit inutile. Jam verb quod ad Peripicuitatem attinet, ego sane in legendis demonstrationibus per Symbola scriptis, quam per verba, majorem semper reperi Difficultatem. Tu qui Conica ejus Symbolicè scripta legisti, magis ea perspicua esse existimas, quam Conica Apollonii vel Midorgii?

B. Ego in legendis Conicis Wallisii cum inciderem in propositionem aliquam longiusculam, partim laboris impatientia, partim quod eam jam ante altunde veram esse scirem, nec de Methodo ejus dubitarem, demonstrationis viam nimium leviter examinaui.

A. [In demonstrationibus per Symbola, operationum supersunt (inquit) vestigia.] Nonne videntur tibi operationum vestigia expressiora esse, verba & ciphras scriptas, sine quibus operatio fieri non potest, quam Symbola quibus carere potest, & semper caruit operatio Arithmetica? Nisi forte putes $A+B$ dicendam esse Additionem, aut AB vel $A \times B$ Multiplicationem, & $\frac{A}{B}$ Divisionem esse A per B. Sed Res (inquit) tota exemplo melius patebit. Itaque Problema adducit quod & per Algebram & sine Algebra solvi potest; & utroq; modo recte solvit; ita tamen ut solutionibus illis nihil possit esse magis appositum ad ostendendum quod Algebra non est Analytica. Problema autem sic se habet carmine redditum.

Accessit virgo tres supplex ordine Divos,
Et tulit accedens asses, quot nescio, secum.
Oratus ductos geminavit Juppiter asses;
Protinus illa Jovi tres asses grata pependit.
Quotq; super fuerant duplavit Phœbus Apollo;
Grata itidem Phœbo tres virgo reddidit asses.
Pallas tunc reliquos geminavit virginis asses;
Assibus & tandem tribus est donata Minerva.
Unicus & si perest quem secum retulit assis.
Dic mihi quot fuerant quos primò virgo ferebat.

Solvit autem per Algebram sic.

Pro ignoto numero Assium allatorum ponit	— 1	✓
Qui duplatus a Jove fit	— 2	✓
Inde Jovi solutis 3 assibus restant	— 2	✓ -- 3 Asses
Qui duplati ab Apollone fiunt	— 4	✓ -- 6 Asses
Inde Apollini solutis 3 assibus restant	— 4	✓ -- 9 Asses.
Quid duplata Pallade fiunt	— 8	✓ -- 18 Asses
Inde Palladi solutis 3 assibus restant	— 8	✓ -- 21 Asses
Sed restabat unus tantum assis		
Est ergo 1 Assis	— 8	✓ -- 21 Asses.
Et additis utrobique 21 Assibus: erit n. 22 Asses	— 8	✓.

Et

Et 2. Asses = 1 ✓ id est, numero Assium allatorum.

B. Rectè sane, & breviter.

A. Fateor: sed in hac operatione quid vides propter quod dicenda sit *Analytica*? Sive (quod idem est) quodnam est hinc compositum quod resolvitur? Dicesne duplicationem illam esse resolutionem?

B. Minimè.

A. Quid ergo? An ternorum illorum assium subductio resolutio est?

B. Non videtur.

A. Neque est; nam Methodus tota est *Syntheticæ*.

B. Quid autem est Resolvere.

A. Resolvere, est id quod compositum est detexere, ordine qui sit ordini compositionis contrarius.

B. Declara hoc aliquo Exemplo.

A. Accipe Exemplum *Wallisii* Problema solventis (ut dicit) sine Algebra, hoc modo.

Relictus est Assis 1. itaq; si Pallas reddat virgini quas acceperat 3, fiunt quatuor. Si illa reddat Palladi quod ab ea acceperat dimidium, fiunt 2. Deinde si *Apollo* reddat quos acceperat 3, fiunt 5; & illa *Apollini* quod acceperat dimidium, fiunt 2½; & *Jupiter* quos acceperat 3 Asses, fiunt 5½. Et illa quod a *Jove* acceperat dimidium fiunt 2¾. itaq; omnia redeunt ad statum primum.

B. Rectè, breviter, & Analytice. Nam quod factum in Problemate describitur ab initio ad finem, id per mutuam redditionem fit infectum a fine ad initium.

A. Verius ipsius *Wallisii* sunt (neque enim hoc tacere potuit, etsi absque eo satis id manifestum erat) nam *ductos* geminavit *Jupiter* Asses, nemo dixisset alius.

B. Problema ergo vetus est.

A. Fortasse; at certe ingeniosum est, factumque, ut arbitror, data opera ad notandos Ethnicorum Sacerdotes, quod qui ad deos accedebant illis medianibus, fiebant, etiam exauditi (ut virgo hæc) pauperiores.

B. Propone jam exemplum *Analyticæ* veræ, qua Problema datum resolvitur in sua Principia, nempe Definitiones & Axiomata.

A. Sic propositum, Exempli causa, super Lineam rectam ad unum & idem ejus Punctum constituere tres Angulos tribus Angulis Trianguli dati, unum quemlibet, uni cuiuslibet æqualem.

B. Datum sit Triangulum ABC.

A. Per verticem B, duco rectum DE quam suppono Angulum facere DBA Angulo BAC æqualem, & Angulum EBC æqualem Angulo BCA. Cum ergo Angulus ABC sit communis, erunt tres Anguli ad A, B, C æquales tribus Angulis ad B, unus quilibet uni. Sumatur in BE (si opus est producta) BF, æqualis AC; & jungatur CF. Quoniam ergo duo latera BF, BC, Trianguli

Trianguli BCF æqualia sunt lateribus AC , BE . Trianguli ABC , utrumque utrique, & Angulus BCA æqualis (per Hypothesin) Angulo BCA , superposita BF ipsi CA cum ipsa congruet, & BC cum ipsa CB , & Angulus BCA cum Angulo BCA , & proinde etiam CF latus cum latere AB , sunt ergo æquales inter se AB , CF , (per Axioma 8. Elem. primi Euclidis) & Angulus BEA æqualis Angulo BAC . per 4. *Eucl. 1.* Qui autem ad punctum B in recta linea DF constituuntur Anguli omnes simul æquales sunt omnibus simul Angulis constitutis ad punctum C in recta AC producta ad G . Nam partes simul omnes æquales sunt toti utrobique. Cum ergo Angulus BCF æqualis sit Angulo ABC , & BCA æqualis BCA , erit reliquus FCG æqualis reliquo DBA , sive BAC . Sunt igitur rectæ AB , CF , (quæ ostensæ sunt æquales) inclinatz ad easdem partes secundum angulos æquales. Parallele autem sive Equidistantes lineæ definiuntur esse illæ quæ ab æqualibus rectis, æqualiter ad easdem partes inclinatis distinentur. Parallele ergo sunt BF , AC . Atque hæcenus ratiocinationem qua tres Anguli Trianguli rectilinei duobus rectis æquales esse demonstrantur, in partes ex quibus erat composita resolvimus quæ *Analysis* est.

B. Quomodo autem ex illis erat composita.

A. Sic. Ex eo quod AC , DF sunt parallele concluduntur angulum DBA æqualem esse angulo alterno BAC , & angulum BCA , alterno BCA , & angulum ABC , communem, & proinde tres DBA , ABC , BCA æquales esse tribus BAC , ABC , ACB unum quemlibet uni. Sciendum autem est quod si *Analysis* plenissime perageretur, non minus prolixa esset quam ipsa esset demonstratio, sumpta ab ipsis principiis usque ad illatam conclusionem.

B. Quin natura *Analyses* talis sit qualis hic explicatur, dubitari non potest. At tamen ne imaginari quidem possum quo facto idem fieri possit per *Algebram*.

A. Neque hercle ego. Nam extra comparationem Rectangulorum (& Triangulorum, quæ sunt ipsorum dimidia) in Geometria; & extra potestates numerorum in Arithmetica, *Algebræ* locus nullus est, neque in illis *Analysis* magis est quam *Synthesis*.

B. Exemplum ostende *Algebræ* per potestates, ita dividens 8 ut quadratum unius partis sit ad Rectangulum sub tota & reliqua parte ut 2 ad 1.

A. Radix Quadrata quæ sit A . Reliquus ergo numerus est 8 — A Quadratum ipsum AA . Rectangulum quæ situm 8 in 8 — A . Vis ergo $AA - 8$ in 8 — $A :: 2$. 1 esse proportionales.

B. Volo.

A. Sunt ergo $AA \parallel 16$ in 8 — $16A$; & additis utrinque $16A$, con-

runt $AA + 16 A = 16$ in $8 = 128$. Quare $16 + A A = \sqrt{128}$. A sunt continue proportionales. Datur ergo A , & proinde etiam $A A$; & rectangulum 8 in $8 - A$.

B. Sed datum esse A , nondum satis perspicio.

A. Datur media proportionalis inter extrema $16 + A$ & A , nempe $\sqrt{128}$. Quare descripto circulo cujus diameter est 16 , a quovis puncto ejus ducatur tangens æqualis $\sqrt{128}$; ab extremitate ejus ducatur per centrum recta ad adversam circumferentiam, eritque pars ejus intercepta inter tangentem & circumferentiam æqualis quæsita A ; ut manifestum est per *Eucl. Elem. 3. Prop. 36*.

B. Ac *Vieta* in hujusmodi rationibus exponendis alia utitur operatione. Nam ex medio puncto differentię cognitę describit circulum cujus radius potest radicem numeri 128 , & semissem differentię.

A. Eodem recidit utraque operatio.

B. Objicio etiam nondum inventam esse illam radicem. Numeri enim 128 . radix quadrata nulla est.

A. Imo radicem habet sed nullo æqualem numero. Nam numeri 16 & 8 qui faciunt 128 in linea recta similiter divisa in partes aliquotas distingui possunt, & inter illas rectas inveniri potest media proportionalis cujus quadratum erit ipse numerus 128 .

B. Etiam hinc intelligi potest problemata quanquam *Arithmetica* quę sine ope *Geometrię* inveniri possunt per *Algebram* nulla esse.

A. Ne crede igitur nimium post hæc vaniloquio Professorum. Sed quid quæso in ratiocinatione hæc observas propter quod dicenda sit *Analysis*? an cum ventum esset ad Analogisimum hunc $16 + A = \sqrt{128}$. A : aberamus longius a Principiis, quam cum accessissemus ad *prop. 36. El. 3. Euclidis*.

B. Agnosco hic quidem cursum quendam & recursum inter æqualitatem Rectangulorum & æqualitatem Rationum, sed utra harum viarum magis tendat ad Principia, statuere nondum possum. Sed progrediamur ad *Cap. 12*.

A. Capita reliqua minus molesta erunt. Nam quę in illis recta sunt (ut sunt plurima) trita sunt & edita in omnibus ferè libris arithmetice, præter *Algebra* quę ex *Oughtredi Clave Mathematica*, ubi multo brevius & apertius traduntur, desumpta sunt. Ea vero quę *Wallisii* propria sunt, falsa sunt. Id quod habet sub initium hujus capituli, nempe hæc verba, sunt autem Fractiones seu numeri fracti non tam numeri quam unitatis fragmenta suum est, idemque falsum & absurdum. Nam eo ipso quod fragmenta sunt, fragmentorum numerus sunt. Neque enim ratio ulla adduci potest quare uncie, sextantes, trientes, besces, dodrantes, ceteraque fragmenta assis, minus proprii numeri appellantur unciarum, sextantium &c. quam animalia, numerus

animalium

animalium. Capite decimo tertio traditur fractionum scribendarum ratio ead. in quam vulgo sciunt, præter notationem Fractionum Algebricarum, quas nemo intelligit nisi aliunde doctus. Quis enim intelligit quod $2 \text{ Qu.} + 3 \text{ R.}$ idem valeat quod $\frac{1 \text{ R} + \frac{1}{2}}{2 \text{ R.}}$ nisi qui ante id didicisset

B. Sed quæ regula est divisionis (per symbola) accurata?

A. Differatur hoc ad examinationem capitis vicesimi, id est, ad locum proprium. Examinetur jam Cap. 13. ubi primo loco modum docet demonstrandi additionem numerorum (ut vocantur) digitorum; verbi (inquit) gratia $2 + 3 = 5$ sic demonstratur. Ponantur primum duo puncta, & deinde tria, quæ omnia, si numerentur reperientur quinque. Libet hic quærere (cum dicat quod reperientur quinque) a quo reperientur. Utrum ab eo qui scit, vel ab eo qui nescit $2 + 3$ esse 5? si ab eo qui scit, id ei demonstratum erat tunc cum nesciret. Sed qui potuit id fieri numerando, ab eo qui sciret tantum quid essent duo & tria, nesciens quid essent quinque? Vides ergo ut nugatur.

B. Sed perge.

A. Vel sic quoniam notum est ex ipsa numerorum procreatione (quam Cap. V. tradidimus) quod sit $1 + 1 = 2$ & $2 + 1 = 3$ & $4 + 1 = 5$ &c. erunt etiam $2 + 3 = 1 + 1 + 3$ & $3 + 1 = 4$ & $4 + 1 = 5$. Quomodo autem notum est per Cap. 5. quod sit $4 + 1 = 5$? Num id illic demonstratur? Vel si demonstretur, ex quibus principiis?

B. Caput illud quintum definitionum est, vel ut ipse dicit quæ ibi traduntur sunt instar definitionum.

A. Principium ergo est $4 + 1 = 5$ cur non & $2 + 3 = 5$ & quæ principium est, & proinde indemonstrabile quod erat demonstrandum? Non intellexit Wallisus, saltem oblitus est $1 + 1$ binarii, $2 + 1$, vel $1 + 1 + 1$ Ternarii, & sic deinceps esse definitiones, neque accedere ad Magistros Arithmeticæ nisi qui jam sciunt quot sunt in quolibet numero Digits unitates.

B. At in numeris quos articulos & compositos vocant methodus addendi quænam sit satis demonstravit. Num & hoc negas?

A. Non nego. Sed ita demonstravit quemadmodum omnes; nam qui id quod ipsi faciunt inter operandum clarè eloquuntur, ut qui dicit 8 & 7 sunt 15 subscribo unitatum loco 5, reservo 1 ad locum decadum, deinde, quod reservabatur cum 9 & 6 & 8 sunt 24 decades, id est dux centuriæ & 4 decades, subscribo decadam loco 4 & centuriarum loco 2, ut numerus totus fiat 245, non modo tres numeros 80, 68, 97, simul addidit, sed etiam recte additos esse demonstravit. Quid habet ille amplius in demonstratione tripaginali præter abundantiam verborum & obscuritatem symbolorum?

B. Nihil. Sed non animadverterat voces illas puerorum dum nume-

rosita addunt additionis esse demonstrationem.

A. Similiter demonstrationes Subtractionis, Multiplicationis & Divisionis sunt ipsæ voces operandium, subtrahentium (inquam) multiplicantium & dividendum. Capite 140 de subtractione tractat, quam eodem modo demonstrat quo demonstravit additionem.

B. Transeamus ergo ad 15 de Additione & Subductione Speciosa.

A. Quod habetur hoc capite totum desumptum est ex Cap. 2 & 3 Oughtredi clavis Mathematicæ, cujus sunt brevissimæ veruntamen plenissimæ regulæ; altera Additionis, nempe ut *conjugantur magnitudines servatis signis*; altera de Subductione, nempe ut *conjuncta utraque magnitudine mutantur omnia signa magnitudinis subducenda*. Additionis exemplum apud Oughtredum est,

$$\begin{array}{r} \text{ad } 5 A \\ \text{adde } -3 A \\ \hline \text{fiunt } 5 A - 3 A \\ \text{five } 2 A \end{array}$$

Ubi Wallisius videns differentiam magnitudinum nempe $2 A$ poni ab Oughtredo pro $5 A - 3 A$, duas facit regulas ex una; alteram ubi signa similia sunt, alteram ubi dissimilia, regulam Magistri sui elegantissimam non necessario corrumpens, Idemque facit circa regulam Subductionis.

B. Videtur mihi in hoc capite docere debuisse Wallisius quo pacto numeri dati radix alterius numeri dati radici commodissime addenda vel subducenda sit.

A. Additio radicum commodissima non fit sine multiplicatione; multiplicatio autem infra traditur Cap. 18.

B. Istuc ergo eamus.

A. Duo igitur capita integra prætermitemus?

B. Sed percurramus leviter.

A. Titulus Capitis 16 est de Additionis & Subductionis probatione. Per probationem intelligitur Demonstrationem?

B. Minime; nam neque additi subductione n, additionis; neque residui additionem subductionis; neque Probationem noventariam, demonstrationem esse ipse dicit.

A. Quomodo autem Probatio est si Demonstratio non est? Immerito ergo reprehendit Ramum quod examinationes illas negaverit esse probationes, affirmaveritque veritatem operationis satis ex ipsa apparere operatione; id quod ego paulo ante dixi, nempe, operationem ipsam suæ veritatis esse demonstrationem. Caput 17 additionis & subductionis exercitium est; ubi computat, primos annos a mundo condito ad annum præsentem, nempe ab initio ad diluvium; a diluvio ad Arphaxad; ab illo ad Tharam; a Thara ad Abrahamum, & promissionem,

B.

B. Siste paulum. Cujus rei promissionem ? salutisne gentium in semine *Abrahami*, an promissionem terræ *Canaan* ?

A. Non distinguit, habens fortasse utramque pro eadem. Deinde a promissione ad *Exodum*; ad Templum; ad Christum; ad *Æram* vulgarem; ad annum Christi 1655. Deinde de annis moræ & servitutis *Israelitarum* in *Ægypto* disputat, & eorum computat mirabile incrementum.

B. Scio. Nempe ut obiter Chronologiam sacram emendaret.

A. Nec tamen emendationes suas satis probat; nec si probasset, pars ulla hujus capituli ad Arithmeticam pertineret. Vides ergo hominis ostentationem miseram quicquid aut in scientiis, aut in linguis, aut in Historia scire se sibi videbatur in publicum importune proferentis, certa juxta & incerta, etiam in libro Mathematico. Accedo jam ad Cap. 18. de *Multiplicatione*. Audi ergo, primo, quomodo definit *Multiplicationem*. *Multiplicare* (inquit) est numerum invenire qui datam habeat rationem ad numerum datum. Utrum propositio hæc (nam definitio non est) vera an falsa sit unico exemplo intelligi potest. Sit datus numerus quilibet 6 & data ratio 4 ad 5, potestne tu aut ille numerum quæsitum invenire per solam multiplicationem ? datus 6 multiplicandus est, sed per quem numerum ? quis (inquam) est multiplicans ? an multiplicantem invenias per multiplicationem ? Productus erit $7\frac{1}{2}$. Nam 4. 5:: 6. $7\frac{1}{2}$ sunt proportionales. Numerum ergo quæsitum non invenies nisi dividendo $7\frac{1}{2}$ per 6. Emerget autem quotus $1\frac{1}{3} = \frac{14}{6} = \frac{7}{3}$. Quatnam autem Multiplicatione reperies istum $\frac{7}{3}$?

B. Intelligit ille datum oportere esse multiplicantem, eumque unitatis multipulum.

A. Alii quidem ita intelligunt. Interea vero definitio quam ipse affert vitiosa est ; quam tamen ad alias etiam quantitates applicat, paulò inferius dicens, *multiplicare esse Datæ alicui quantitati aliam in data Ratione exhibere*.

B. Erravit.

A. Tanto decuit illum minus definitionem reprehendere allatum ab *Euclide* nempe quod Numerus numerum multiplicare dicitur quando quot sunt in ipso unitates, toties componitur is qui multiplicatur, & factus est aliquis.

B. Quid est quod hic reprehendit ?

A. Quod vox hæc is qui multiplicatur posita sit in definitione *Multiplicationis*.

B. Nonne merito ?

A. Ita. Sed cum tantillo opere emendari potuit, rectius fecisset, arbitrator, si emendata potius usus esset, quam si falsam in locum ejus substituisset.

B. Sed

P. Sed quomodo corrigenda est?

A. Sic. Numerus numerum multiplicare dicitur quando quot sunt in illo unitates, toties componitur hic, & aliquis fit.

B. Recte & tam parva mutatione emendata est, ut sine ullo Geometriae damno (& si peccatum sit contra Logicam) potuisset retineri.

A. Etiam retinebitur. Reliqua capitis hujus eadem sunt quae vulgo traduntur, sed verbosius, adeoque obscurius ab *Wallisio*. Quod autem ad operationis demonstrationem attinere videatur, nihil avertit; neque vero opus erat ut afferret, cum, ut jam saepius dixi, ipsa operatio perfecta, sit perfecti operis Demonstratio.

B. Sequitur Caput 19 de Divisione.

A. Nihil hic video novi praeter tritarum jam omnium manibus regularum declarationem longam & frigidam & (siquidem id tibi aliquid videbitur) operationis formam aliquoties variatam.

B. Operationis alicujus formam variare non equidem difficile esse arbitror iis qui formam ejus unam aliquam jam intelligunt, si tamen alio & alio loco scribere residuam, vel alio atque alio modo divisorem multiplicare & subducere formam operationis novam constituere dicendum sit. Additionem & Subductionem radicum quadraticarum praetermissam ab *Wallisio* in hunc locum rejecisti. Ostende ergo nunc qua methodo operationes illae perficiantur commodissime, id est ubi fieri potest, accuratissime; ubi fieri non potest, cum minimo errore.

A. Sed ostendendum primo est quomodo radix quadratica multiplicanda sit per numerum. Radicem autem per numerum multiplicandi regula haec est. Quadretur tum numerus tum radix, & quadrata inter se multiplicentur, eritque facti radix factum quaesitum. Exemplum. Sit R q 4, multiplicanda per 6. Quadratum R q 4 est 4. Quadratum a 6 est 36. 4 in 36 producit 144, radix 144, nempe 12 est id quod fit ex ductu 6 in R q 4, id est, in 2. Quod sic demonstro. Sint duo quadrata A A = 36, B B = 4 erunt ergo A A, A B, B B, continue proportionales, nimirum in ratione A ad B. Est autem A B id quod fit ex radice A sive 6 in radicem B sive 2.

B. Recte hoc. Sed cur non melius est dati quadrati radicem primo invenire, & deinde inventum multiplicare per datum numerum.

A. Quia (nisi numeri dati sint quadrati) inventa radix accurata non erit, sed error aliquis certe inerit qui post major fiet per multiplicationem, quae multiplicatio per hanc regulam evitatur.

B. Video, hoc exemplo, quod datis duobus quadratis circa diametrum, completi super totam diametrum quadrati utrumvis complementorum, medium est proportionale inter quadrata data.

A. Ita est.

B.

B. Adde jam radici quadraticæ radicem quadraticam.

A. Regula hæc est. Quadrati inter se multiplicentur; producti radix inveniatur, dupliceturque; duplicata addantur numeri quadrati dati; Radix summæ est summa radicum propositarum. Exempli gratia. Radix quadratica numeri 9 fit addenda radici quadraticæ numeri 25. Quadrati inter se multiplicati faciunt 225, Cujus numeri radix quadratica est 15, qui duplicati sunt 30, cui numero si summa quadratorum addatur nempe 34, sunt 64; cuius radix 8 æqualis est radici numeri 9 una cum radice numeri 25. Demonstratur autem sic. Multiplicata inter se radices faciunt unum ex complementis; & duplicatus facit duo complementa ad duos quadratos 9 & 25 super eandem Diagonalem dispositos; additis ergo ipsis quadratis, fit quadratum a recta æquali lateribus ambobus. Illius ergo radix æqualis est summæ radicum propositarum.

B. Rectè. Multiplica jam numerum Radicum in numerum Radicum.

A. Regula est hæc. Ducatur quadratorum unus in alterum; radix producti multiplicetur per factum ex numeris, Exempli causa sint Rq. numeri 9 multiplicandæ in 3 Rq. numeri 4. Quadrati 4 & 9 inter se faciunt 36, factus ex numeris 3 & 8 est 24; qui multiplicatus in Rq. $36=6$ facit 144. Tantundem faciunt 8 Rq 9 id est 24 in 3 Rq 4 id est in 6. Demonstratur autem sic. Radix 9 in radicem 4, est radix ejus qui fit ex 9 in 4, per regulam primam supra traditam. Quare 8 Rq 9 in 3 Rq 4, est id quod fit ex 24 Rq ejus numeri qui fit ex 9 in 4; id est quod fit ex 24 in 6, id est numeri 144.

E. In numeris quidem quadratis operabimur per hanc regulam accuratissimè; etiam in numeris non quadratis minor multo erit error quam si radices extractas non veras post multiplicaremus. Nam multiplicaremus unà errorem; sed eadem ne est methodus multiplicandi radices cubicas quæ fuit multiplicandi radices quadraticas?

A. Eadem. Nam illic ostensum est productum ex radicibus inter se radicem esse producti ex quadratis inter se. Idem autem hic ostendam de radicibus cubicis, quadrato quadraticis, & cæteris potestatibus. Sit enim datus cubus $A A A$, cujus proinde radix est A . Sitque datus numerus B , & per consequens datus est cubus ejus $B B B$. Dico factum ex A in B esse radicem cubicam numeri facti ex $A A A$, multiplicati per $B B B$. Factum enim a cubis est $A B A B A B$ cujus Rq. est $A B$.

B. Ostende operationem in numeris, multiplicans Radicem cubicam numeri 64 in numerum 5.

A. Hoc est in radicem cubicam numeri 125. Multiplico 64 in 125, & factus est 8000; cuius radix cubica est 20 factus (ex 5 multiplicatis in radicem cubicam numeri 64, id est) ex 5 in 4. Similiter si duo nu-

mer

meri multiplicentur inter se, facti radix quadrato quadratica æqualis erit factio ex ipsorum radicibus quadrato-quadraticis. Exempli causa sint multiplicati inter se 16 & 81, factus erit 1296 cujus radix quadrato-quadratica est 6 factus ex 2 radice quadrato-quadratica numeri 16 & ex 3 radice quadrato-quadratica numeri 81.

B. Manifesta hæc sunt, sed si plures radices quadraticæ, puta 6 radices numeri 4 ducendæ sint in plures radices, puta in 4 radices numeri 9, quid faciendum est?

A. Regula est hæc, Multiplicentur inter se ipsi numeri quadrati, & producti radix ducatur in factum ex numeris (qui radices indicant) inter se multiplicatis. Productus erit factus ex numeris radicum inter se multiplicatis. Itaque si 9 ducantur in 4 fit 36 cujus radix in 24 facit 144. Tantundem faciunt 6 radices numeri 4 in 4 radices numeri 9.

B. Unde id contingit?

A. Si quadrati numeri ponantur esse A A, B B, multiplicati inter se erunt, A A B B. Et $6 A = 6 \sqrt{4}$ & $4 B = 4 \sqrt{9}$, & 6 A in 4 B erunt 24 A B id est, $24 \sqrt{A A B B}$, id est $24 \sqrt{36}$, id est 144, factus ex 6 A (= 12) in 4 B = 12.

B. Verum quid si numeri dati non sint quadrati?

A. Habemus tamen quæsitum veritati quantum possibile est proximum. Nam $24 \sqrt{36}$, inveniri possunt per regulam primam supra exhibitam sine radicis non accuratæ multiplicatione, nempe multiplicando 24 in se, & productum in 36. Orietur enim 20736, cujus radix est 144, idem numerus qui prius. Itaque etsi numerus 20736, quadratus non esset nulla tamen esset erroris (qui radicibus numerorum non quadratorum necessario adhæret) multiplicatio. Sed & in radicibus cubicis eadem est regula. Nam si 3 Rc numeri 8 ducendæ sint in 4 Rc numeri 27, multiplico inter se cubos, faciunt 216, cujus radix cubica est 6, qui multiplicans 12, factum ex numeris radicum facit 72, tantundem autem faciunt 3 radices cubicæ numeri 8 (nempe 6) ductæ in 4 radices cubicas numeri 27 (nempe in 12.) Similis quoque est methodus in radicibus quadrato-quadraticis, & radicibus cæterarum potestatum. Nam numeri radicum multiplicati erunt totidem A B, id est totidem radices quadrato-quadrati A A A A, in quadrato-quadratum B B B B.

B. Divide nunc numerum radicum quadraticarum per numerum alium radicum quadraticarum. Verbi gratia, divide 6 Rq numeri 36 per 2 Rq numeri 9.

A. Regula est hæc. Multiplicetur numerus radicum utrobique in ipsam radicem, & productus per productum dividatur. Radix quotientis est quotiens quæsitus. Itaque cum 6 Rq numeri 36 sit radix numeri 216, & 2 Rq numeri 9 radix numeri 36, multiplicatis 216 per 6, nempe per 2 Rq 9, fit 1296, diviso 1296, per 36 quotiens erit 36, cujus
radix

radix est 6 = $6 \frac{Rq\ 36}{2\ R\ 9}$. Ostenditur autem sic. Sit $AA=36$. Ergo 6

$Rq\ AA=6\ A$. Sit $9 = B\ B$. Ergo $2\ Rq\ B\ B = 2\ B$. Et $\frac{6\ A}{2\ B} = 6$.

B. Etiam hoc ostende, quomodo dati numeri radix quadratica dividatur per numeri dati radicem quadraticam.

A. Sit $Rq\ 49$ dividenda per $Rq\ 16$. Regula est, Dividatur numerus major per minorem; radix quadratica quotientis est quotiens quæsitus. Itaque diviso quadrato 49 per quadratum 16, fit $\frac{49}{16}$, cujus radix est $\frac{7}{4}$ nempe quotiens divisi 49 per 16. Demonstratur autem sic. Sit numerus major $A\ A$, minor $B\ B$. Radix ergo illius A , hujus B . Et diviso $A\ A$, per $B\ B$, fit quotiens $\frac{A\ A}{B\ B}$; Dantur numeri $A\ A, B\ B$; datur ergo quo-

tiens divisi $A\ A$ per $B\ B$, nempe; $\frac{A\ A}{B\ B}$; quare datur etiam $\frac{A}{B}$. Sic datis 49 & 16 datur quotiens $\frac{49}{16}$ & radix ejus $\frac{7}{4}$.

B. Quomodo autem radix quadratica numeri non quadrati a radice quadratica numeri etiam non quadrati subtrahitur?

A. Si radices illæ sint commensurabiles, per hanc regulam. Dividatur uterque numerus per maximam amborum mensuram communem. Radix autem majoris dividatur in rationem radice quotientis ad radicem Quotientis. Exempli causa, sit $Rq\ 20$ subducenda ex $Rq\ 45$, divisi 45 & 20 per communem eorum mensuram maximam 5, Quotientes sunt 9 & 4 & eorum radices 3 & 2. Divide ergo $Rq\ 45$ in rationem 3 ad 2; eritque segmentum minus $Rq\ 20$; ex quo cognoscitur residuum ad $Rq\ 45$.

B. Sed $Rq\ 45$ cum numerus non sit, dividi in rationem 3 ad 2 accuratè non potest. Velim ergo scire cujus numeri radix sit illud residuum.

A. Aliam igitur methodum radices commensurabiles tum subducendi tum addendi, nec quadraticas modo sed etiam Cubicas habebis ex Clave Mathematica *Oughtredi*; Additionis quidem hanc. Dividatur uterque numerus per maximam amborum mensuram communem; radices utriusque Quotientis simul addantur; totius quadratum per eandem communem mensuram multiplicetur; producti radix est radicum numerorum propositorum summa. Exemplum operationis asserit hoc. Sit $Rq\ 147$ addenda $Rq\ 12$. Divisi ambobus numeris per maximam communem mensuram 3; sunt quotientes 49 & 4; quorum radices sunt 7 & 2. Quadratus a 7 + 2 est 81 qui ductus in eandem communem mensuram 3 facit 243, cujus radix quadratica æqualis est radicibus quadraticis utriusque numeri 147 & 12. Subtractionis autem exemplum hoc est. Quadretur (non ut antè summa, sed) differentia radicum 7 & 2, quæ est 5, cujus quadratus est 25,

qui multiplicatus per eandem maximam communem mensuram 3 facit 75, cujus radix est æqualis numero qui relinquitur deducta Rq 12 ex Rq 147.

B. Num demonstrat hoc *Oughtredus*?

A. Minime. Propositum enim illi (puto erat Algebram) non omnibus scribere, sed Geometris qui quomodo demonstrandum esset ex ipsa operatione intelligere possunt.

B. Demonstra hoc tu.

A. Quod datum est sumo, radices numerorum 147 & 12 esse communurabiles. Sunt ergo eadem radices numerorum quadratorum. Ut ergo 147 ad 12, ita est quadratus numerus ad quadratum numerum. Dividantur ambo per eorum communem mensuram maximam 3, eruntque quotientes 49 & 4. Est ergo ut 147 ad 12 ita quadratus numerus 49 ad quadratum numerum 4, & ut Rq 147, ad Rq 12 ita 7 ad 2. Additis simul 7 & 2 fit 9, cujus quadratus est 81, qui numerus multiplicatus per communem mensuram maximam 3 faciunt 243, ut ergo 147 ad 49, ita est 243 ad 81; & ut 12 ad 4, ita est rursus 243 ad 81, Quare ut 147 + 12 ad 49 + 4, ita est 243 ad 81. Et proinde ut Rq 147 + Rq 12, ad Rq 49 + Rq 4, id est ad 7 + 2, ita est Rq 243 ad Rq 81, id est ad 7 + 2. Quare Rq 243 æqualis est Rq 147 + Rq 12. Quod erat demonstrandum. Similis est demonstratio subductionis. Est enim ut Rq 147 ad Rq 12 ita 7 ad 2. Quare si subducatur 2 ex 7, erit ut Rq 147 — Rq 12, ad Rq 12, ita 7 — 2, (id est 5) ad 2. Est autem quadratus a 5 = 25, qui multiplicatus per eandem maximam mensuram communem 3 facit 75; est ergo ut Rq 147 — Rq 12, ad 7 — 2 ita Rq 75 ad 7 — 2, sive ad 5, est ergo Rq 147 — Rq 12 = Rq 75. Eadem est Methodus etiam in subducendis addendisque radicibus cubicis, & radicibus cæterarum potestatum, nisi quod in additione & subductione radicum quadraticarum quadratorum qui ex divisione numerorum per maximam eorum communem mensuram oriuntur, summa vel differentia ducitur in communem mensuram; in cæteris verò potestatum radicibus, summa & differentia potestatum propriarum addendæ, & subtrahendæ & per numerorum propositorum maximam communem mensuram multiplicandæ sunt.

B. Sunt hæc quidem liquidò & breviter demonstrata, sed fortasse etiam demonstrata sunt in capite sequente, ubi multiplicare & dividere docet *Wallisius* algebricè.

A. Operationum harum neque in eo capite, neque in toto hoc opere (etsi ab illo appellatur *Opus Arithmeticum integrum*) ne mentio quidem ulla est. Nihil enim aliud istic docet, quam multiplicare, & dividere symbola (ut cuilibet manifestum esse potest qui caput illud legerit,) & hæc quoque ex *Oughtredo* & *Diggesio*. Itaque caput illud nempe

Cap.

Cap. 20. transiliamus. Etiam Cap. 21. (in quo agit de multiplicationis, & divisionis probationibus) possumus (cum nihil contineat neque boni, neque mali) ut innocuum quidem sed inutile, sine damno præterire. Caput 22 continet multiplicationis & divisionis exercitium in mensurandis & comparandis reſtāngulis; in quo nihil quidem reperio quod, ut falsum, redarguendum sit; omnia verà puerilia, & non necessaria, facilia tamen, eademq; verbosissimè ut pueris, symbolicè, ut *Wallisii* scripta sunt: sequitur Caput 23 cui titulus, *Euclidis elementum secundum Arithmetice demonstratum*, id est, ut mox subjungit, totum fere *Elementum secundum*. Nam demonstrat Theoremata prima tantum decem. Sed quomodo demonstrat? Theorema primum per symbola scribit; & pro omni argumento, patet (inquit) ex calculo.

B. An pleniorē exigit demonstrationem quam est calculus?

A. Minimè. Sed cum eadem propositiones per calculum demonstratæ extent apud *Claviū*, quorsum attinuit aliorum laborem *operis peritæ*?

B. Fortasse ille brevius eas demonstravit.

A. Tantum abest ut demonstrationes *Wallisii* breviores sint illis *Clavii*, (quanquam symbolicè scriptæ) ut plusquam triplo sint longiores: Et præterea citius intelliget lector quilibet etiam symbolicis decem illas demonstrationes *Clavii*, quam quamlibet unam ex demonstrationibus *Wallisii*. Denique propositiones illæ a quolibet, qui earum intelligit demonstrationes Geometricas, non minus ad numeros applicari possunt quàm a *Clavio* applicatæ sunt.

B. Pergamus ergo ad Cap. 24. de *Geodesia*. Sed primo, dic mihi quid differt *Geodesia* a *Geometria*?

A. Nihil, nisi quod quibusdam hominibus mirum in modum placet vocum Græcarum efformatio aliqua vel compositio nova, ad ostentationem peritiæ linguæ Græcæ. Sed diu nunc est quod ea vox (significans terræ divisionem) pro parte artis Agrimensorum usurpata est. Nosti quam exigua & trita pars ea sit Geometriæ quâ utuntur Agrimensores. Docetur autem hoc Capite novi nihil, sed quomodo triangulorum (& proinde Polygonorum rectilincorum) areæ ad numerorum Calculum reduci solent.

B. Nonne etiam Circuli & Sectorum mensurationem, & quadraturam Circuli hic docet?

A. Scribitur quidem in margine libri, *Mensuratio circuli & portionum ejus*; & paulo inferius de *Circuli quadraturâ*; & ratio perimetri circularis ad diametrum. In textu autem negat se hæc docere, sed de illis fufius dictum esse dicit in sua *Arithmetica Infinitorum*. Dicit præterea *Josephum Scaligerum*, *Severinum Longomontanum*, & nuperime *Thomam Hobbs*, immortales sibi inde singulis laudis debere somniantes, mire hallucinatos esse.

B. Socios adjungit *Hobbio* non ignobiles.

A. Sed quid habet ipse *Wallisius*, de *quadratura Circuli* in sua *Arithmetica infinitorum*.

B. Tu, si voles, videbis; nam afferam tibi etiam illum librum (postquam, hunc excusserimus,) excutiendum.

A. Caput 25 est de *quantitatum invicem comparatione quoad Differentiam, & quoad Rationem*, id est, ut vulgo loquimur de rationibus *Arithmetica & Geometrica*. Dicit autem sciendum esse quantitates non nisi *Homogeneas comparandas esse*; & hoc quidem rectè. Deinde subjungit si quis autem contrarium fecerit, puta, data linea ad datam superficiem, vel Temporis ad Lineam Rationem inquirens, idem erit ac si quaesiverit quantum temporis æquetur Lineæ.

B. Videtur hic repetere illud quod *Hobbio* ante objecerat, quod quantitatem Temporis cum quantitate Lineæ comparaverit.

A. Prætereo loquutionem illam barbaram, idem erit, &c. Sed a te quæro utrum idem sit quærere quam rationem habet quantitas temporis ad quantitatem Lineæ, & quærere quantum temporis æquatur Lineæ.

B. Puto.

A. Quantitas temporis quid est?

B. Nonne ipsum tempus determinatum?

A. Et quantitas Lapidis quid est?

B. Non est respondendum nunc ut prius, nempe esse ipsum Lapidem determinatum.

A. Refugis scilicet absurditatem dicti, *Lapis est quantitas*. Attamen non minus absurde dicitur tempus esse quantitatem.

B. Quid ita? Cum in prædicamento Quantitatis Tempus sit, Lapis non sit.

A. Quamdiu est, quod tempus sit in illo Prædicamento, & a quo ibi collocatum?

B. Positum ibi est ab *Aristotele*.

A. Si non posuisset non ibi esset, Nihil ergo agis nisi ostendas quare sic collocatum esse oportuit. Tantum quidem dicitur esse tam Corpus naturale quam Tempus; neutrum autem dici potest abstracte Quantitas. Omnis enim Quantitas (si accurate loquendum est) aut Longitudo est, aut Superficies, aut Solidum, sive ut quidam loqui solent corpus Mathematicum. Tempus autem & Motus, & Vis cæteræque res de quibus quæri potest quantæ sunt, quantitates habent, quibus quantæ sunt determinatur, aliquas vel aliquam ex illis tribus, nimirum illas ipsas quibus mensurantur. Temporis jam mensura quænam est?

B. Motus.

A. Scio. Sed ipsius motus quænam est mensura.

B.

B. Linea. Nam per Lineas metimur Motus, saltem metiri possumus, & per Motum Tempus.

A. Rectè. Et quod mensuram metitur, metitur etiam Mensuratum. Est ergo Linea mensura Temporis, potest autem Temporis mensura comparari cum Linea, hoc est Linea cum Linea.

B. Imo necesse est ut comparetur, quia alioqui non esset mensura. Video jam quanquam absurdum sit Lineam dicere Tempori æqualem esse, non tamen absurde dici quantitatem Lineæ æqualem esse Temporis quantitati. Assentior ergo tibi, quæri posse Rationem quantitatis Temporis ad quantitatem Lineæ, etsi non ad ipsum Tempus, ut neque ullius quantitatis ad Corpus naturale. Pudet ergo mei, tum etiam *Wallisii*, cui in hac re & nonnullis aliis nimium temere crediderim. Sed non satis intelligo cur potius quantitatem Lineæ dicis quam simpliciter Lineam.

A. Quia accuratè loquentes Lineam dicemus esse *Longam*, potius quam *Longitudinem*. Est enim Linea id quo longitudes mensuramus, nempe corpus aliquod, ut funis, virga, brachium, pes, vel aliquid simile; & quia dum eo utimur in rebus mensurandis, unam ejus dimensionem nempe longitudinem solam consideramus, ob eam rem obtinuit habere & dici longitudinem.

B. Fuimus sanè ego & *Wallisius* tardiores quam ut hæc ita esse (nisi ab aliis moniti) intelligeremus; cæterum ego aliquanto magis cavi quam ille, ne deridere viderer ea quæ non satis intelligerem, ne postea vera esse apparent. Non ergo comprobo ea quæ subjungit, nimirum, Quærere quam Rationem habeat quantitas Lineæ, ad quantitatem Temporis non minus absurdum esse, quam si quærat quod colores constituunt sonum, & quod soni constituunt gravitatem.

A. Sed ille se a scommatis abstinere ideo non potuit, quia ex eorum numero est, qui de iis quæ semel conceperint, dubitare non possunt.

B. Quos dicis?

A. Eos dico qui in civitate degentes, civitatisque commodorum participes, & a civili potestate accipientes quod vivunt, summo tamen imperanti civitatis imperare, saltem non obedire, possulant.

B. Mitte ista. Perge legere.

A. Ita faciam. Vides interim quantitates Temporis & Lineæ esse Homogeneas; Homogeneæ enim quantitates sunt (ut in superioribus Colloquiis agnovisti) quarum mensuræ *ἰσάμενοι*. Accedens inde ad distinctionem Rationis Arithmetice a Ratione Geometrica, Illam esse dicit quæ comparantur magnitudines secundum differentiam, & id quidem rectè; hanc, secundum quam una est alterius quatuor vel quantupla.

B. Quid est illud quantuplum? Latinum certe non est.

A. *Ἀπορία αὐτῶν βῆς*; Proverbium Græcorum quod Latine sonat, *cui hæret oratio tussit*, verum est; sed & verum est eos qui dicendo progredi aliàs nesciunt, necesse aliquando habere nova verba eudere quæ nihil significant non plus quam tussis. Nam cum deberet dicere rationem Geometricam esse tunc cum una quantitas tanta est respectu alterius, quemadmodum superius dictum est, & ignorans naturam rei dixit esse tunc cum una quantitas est quantupla alterius.

B. Imo vero non ignorans, sed nolens videre edoctus ab *Hobbio* (nam is illum hoc docuerat) voluit saltem aliter loqui, ut videretur dissentire. Infalaciter.

A. Paulo post, eadem exemplo illustrans, *Secundo* (inquit) quæsito satisfit ubi ostenditur quotuplum sit *hoc ad illud* (voluit dicere *hoc illius*) omissa voce *quantupla*. Ex quo intelligitur Rationem *diametri* ad *Latus*, Geometricam non esse, cum altera alterius totupla esse non possit. Itaque melius aliquando fecisset, si retinuisset *quantuplum*.

B. Quomodo vertitur Anglicè *quantuplum* vel *tantuplum*.


A. Viderint lectores Angli. Sed lego. [*In posteriori de Ratione sue proportionis queritur, differentia interim minime considerata.*] Quid? in comparatione Geometrica 4 ad 2 vel 2 ad 1 nullane habita est ratio differentiarum?

B. Æque ac in Ratione Arithmetica. Nam differentia inter 4 & 2 est dimidium Antecedentis, & differentia inter 2 & 1, est item dimidium differentiarum inter antecedens & consequens, Quarum differentiarum si nulla haberetur consideratio, nulla consideraretur omnino ratio.

A. [*Divisionis* (inquit) *quotiens ostendit Rationem dividui ad diviso-rem.*] Verum est. Sed in sequentibus, quoties proposito suo expedit, quotientem semper dicit esse dividui ad diviso-rem Rationem ipsam; quippe qui absque eo Regulam Auream demonstrare non potuisset, Si *Pondus* (inquit) *A sit ad Pondus B ut Linea α ad Lineam β, non tamen dici potest (vixissim) ut pondus A ad Lineam α ita pondus B esse ad Lineam β.*

B. Siquidem per pondus intelligat ponderis quantitatem, non video cur non possit ita dici. Nam quantitates ponderis & Lineæ exhiberi possunt in duabus Lineis.

A. Consentanea hæc sunt iis quæ ubique habet loquens de Natura Quantitatis; confundit enim *Abstractum* cum *Concreto*, quantitatem eum *quanto*, tanquam significarent idem. Sed vide quam imperite loquitur in sequentibus. Nosti Geometras, quando datur area rectanguli cum uno coefficientium, latus alterum solere invenire per Applicationem areæ ad latus datum; Arithmeticos autem dato numero & uno numerorum per quorum multiplicationem factus est, alterum invenire per divisionem. Itaque propter similitudinem methodi, Divi-



page 79

sio Arithmeticoꝝ & Applicatio Geometrarum pro eadem re haberi consuevit. Exempli causa, si rectangulum dicatur esse 12 intelligitur continere 12 Rectangula æqualia & toti si-ilia; quod si dividatur per 6, intelligitur per 6, sex ex istis rectangulis. Ita ut si quæzatur quoties 6 rectangula contineantur in 12 rectangulis ejusdem cum illis magnitudinis, respondebitur (secundum quotientem) 2. Itaque applicatio Geometrarum vere & proprie dicitur Arithmeticoꝝ divisio. Quod autem latus, id est linea per applicationem prodeat, cum per divisionem prodeat numerus rectangulorum, id contigit quia similitudo & æqualitas rectangulorum facit, ut alterum quidem indicet numerum rectangulorum similium & æqualium, alterum vero numerum multiplican-tem. Neque in rectangulis tantum sed etiam in quibuscumque Parallelogrammis idem accidit. Quod cum ille non videret mirè se torquet, cruda & indigesta cogitata sua explicare cupiens. Itaque divisionem esse negat (nisi *καταχρηστικῶς*) quotientemque non proprie dici id quod prodit, neo respondere quæstioni *quot* aut *quoties*; cum tamen manifestum sit, id quod prodit esse latus cujus segmenta sunt numerus segmentorum indicans quoties numerus minorum Parallelogrammorum contineatur in Parallelogrammo toto. Exempli gratia, in Parallelogrammo *ABCD*, diviso *AB* in 6 partes æquales, & *AC* in 2 partes æquales *AE*, *EC*, Latus *AC* (nempe quotiens) est 2, indicans sex parallelogramma contenta in *A F*, contineri bis in toto parallelogrammo *BC*. Deinde paulo post, ubi magnitudo (inquit) aliqua numero dividitur, non tam divisio est quam multiplicatio. Quod falsum est; imo vero absurdum, magnitudinem per numerum dividi, ut nulla tamen fiat divisio. Nam si quæzatur quoties 2 *A* reperiantur in 1 *A* responderetur accurate $\frac{1}{2}$ semel, æque ac si quærenti quoties 12 continentur in 6 responderetur $\frac{1}{2}$. At queritur (inquit *Wallisius*) quoties numerus quadratorum in Area *A B*, contineat numerum Longitudinum in latere *A*, ut proveniat numerus Longitudinum in latere *B*. Itaque in numero quadratorum, id est, in parallelogrammo continetur numerus longitudinum, id est, longitudines aliquot faciunt superficiem. Quod & absurdum est, & contra ea quæ proxime ante dixerat, nimirum, *hic non queri quoties A continetur in plano A B*. Sin per numeros quadratorum & longitudinum intelligi vult numeros simpliciter, ut sensus sit, numerum aliquem simpliciter (id est) nullarum rerum numerum contineri in Area parallelogrammi *A B*, loquitur aliquanto etiam absurdus.

B. Veritatem circa differentiam inter Applicationem plani ad lineam, & divisionem numeri per numerum pauci sunt qui non intelligunt, sed videntibus quasi per nubem, utrum accuratissime conveniant inter se nec ne, non satis constat.

A, Imo vero potius id quod constat nescientes eloqui, coguntur a sua

sua ipsorum ἀκυρολογία veritati quam enuntiare nesciunt contradicere. Quod proxime sequitur *Rationes omnes* (subaudi Geometricas) quorumcunque ad invicem quantitatum esse inter se Homogeneas peracutum est, adeo ut non intelligatur. Ubi definiuit *Homogeneum*?

B. Nusquam. Sed definiisti tu Homogeneas quantitates eas esse quarum mensura congruere possunt.

A. Sed quænam mensura est qua computantur inter se duæ rationes? Per Lineam minorem metimur majorem; & per superficiem minorem, majorem superficiem; nimirum, unam alteri superponendo. Sed an & rationem majorem superponendo metimur, vel ratio rationi superponi potest?

B. Minime. Sed possunt quantitates ipsæ quarum ratio quæritur una supra aliam poni, & Rationes ipsæ sic comparari; ut fecit *Hobbius*, *Cap. 13. Art. 6. Libri de Corpore*, in quo Capite Theoremata *El. 5* Euclidis omnia, & nonnulla alia non minus pulchra, breviter & perspicue Demonstravit.

A. Si ab illis quæ ibi dicta sunt suam hanc rationum Homogeneitatem derivavit recte fecit; id nescivit tamen. Præterea quod dicit Lineam & Pondus Heterogenea esse, verum est, potest tamen esse ut eorum quantitates sint Homogeneæ; nam ut Lineæ ad Lineam ratio in duabus lineis; exhibetur sic etiam eorum ponderum ratio in duabus lineis exhiberi potest. Ut enim cubus ad cubum ejusdem materię duplum, ita est pondus, ad pondus duplum; & ut utrumvis ad suum duplum, ita linea ad lineam duplam, Erit ergo ut quantitas ponderis ad longitudinem lineæ quæ ipsum representat, ita quantitas ponderis dupli ad longitudinem lineæ duplæ ipsum representantis. Sed pergo. [Si compareretur (inquit) quoad rationem quadripodium & bipodium, Ratio est dupla; si Linea quadrupedalis ad pedalem, Ratio est quadrupla; quæ rationes ad invicem comparari possunt, nempe, hæc illius dupla est.] Bene se habet. Sed quid si pro quadripodio & bipodio posuisset sex pondo & tripondium; & pro Lineis quadrupedali & pedali lineam 12 pedum & 3 pedum, quomodo argumentum ejus quadrasset? Quomodo (inquam) rationem posterioriorem prioris quanta pars esset ostendisset?

B. Sic. Si comparatur quoad rationem sex pondo & tripondium ratio est dupla; si lineam 12 pedum comparatur cum lineam 2 pedum oritur ratio sextupla. Quæ rationes comparari possunt, nempe hæc illius erit tripla.

A. Quid ita? rationem 12 ad 2 triplam esse censes rationis 6 ad 3?

B. Video. Nam ratio 16 ad 2 est tripla rationis 6 ad 3; sed fraudi illi & mihi fuit, quod in exemplo *Wallisiano* tum quantitates, tum rationes altera alterius dupla est; id quod contingit in progressionem per dupla-

duplationem sola, aliàs non item. Sed miror cur hic dicit rationem 4 ad 1 duplam esse rationis 2 ad 1, cum ipse in Elencho multis & malis verbis conteudat rationem illam dicendam esse non duplam, sed duplicatam.

A. Deinde causam reddens discriminis inter comparationem duarum quantitatum quoad differentiam & comparationem earundem quoad rationem, imperitiam suam ostendit etiam amplius. Nam cum ostendere deberet differentias quantitatum excessuum vel residuorum esse Homogeneas, ostendit tantum ipsa quanta, nempe excessus & residua, esse Homogenea. Nescit enim distinguere inter quantum & quantitatem. Secundo, cum dicat *Ubi autem comparatio fit quoad rationem, quæ emerget ratio comparatorum genus non raro deserit, & transit in genus numerosum*, manifestè prodit harum rerum ignorantiam invincibilem.

B. Invincibilem?

A. Talem, inquam, quæ a nullius hominis alterius ignorantia superari potest. *Comparatio* (inquit) non raro relinquit comparatorum genus. Concedit ergo quod relinquit comparatorum genus aliquando. Sunt ergo comparatio & comparatum aliquando Homogenea. Præclare pro gradu doctorali & officio Professoris Geometrix.

B. Vide quæso (omissis quæ ille erravit) an ego sensum tuum de hac re satis capiam. Videris enim tu sentire Rationem Rationi, Geometricam Geometricæ, & Rationem Rationi, Arithmeticam Arithmeticæ homogeneam esse.

A. Ita.

B. Et Rationem Geometricam Arithmeticæ Heterogeneam.

A. Etiam.

B. Et in quantis, lineam lineæ, superficiem superficiæ, & solidum solido Homogenea; sed altera alteris Heterogenea.

A. Nimirum, sic sentiunt omnes?

B. Sed quantitatem (in abstracto) cujuscunque rei quantitati (in abstracto) cujuscunque alterius rei, Homogeneam esse; ideoque linearum, Superficierum, Solidorum, Temporis, Motus, Vis, Ponderis, Roboris, Resistentiæ quantitates esse Homogeneas, etsi ipsæ res sint Heterogenæ.

Item, loquendo de iisdem rebus pluraliter, quantitates plurium linearum, superficierum, solidorum, temporum motuum, virium ponderum, resistentiarum esse Homogeneas, tum inter se, tum etiam Numero; Numerum autem non esse quantitatem, sed quantitates vel quanta, vel plura quæcunque. Nonne ita est?

A. Ita profecto arbitror.

B. Et ego; nam clarè & accuratissime quod res est, eloquutus es.

A. Quid autem volunt ista postrema verba *Et transit in genus Numerosum*?

M

B.

B. Valent illa forte in homine Mathematico, idem quod tussis in Oratore.

A. Sed vide id quod sequitur; primo an sit verum; secundo, an consentaneum illis quæ aliàs dicere solitus est. Verba hæc sunt, *Et quidem cum duplum & dimidium, triplum & triens perinde pro Rationum nominibus habenda sint, dimidii autem & trientis nota $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{3}$ numeris (fractionis) accenseantur, quidui & dupli, tripli nota $\frac{2}{1}$ & $\frac{3}{1}$ vel 2.3? Atque hac potissimum de causa ego totam doctrinam rationum Arithmetica potius quam Geometricæ speculationis esse autumo.*

B. Neque vera sunt neque dissentanea iis quæ sensit scripsitque pluribus in locis; nec tamen iis quæ in nonnullis aliis locis scripsit monitus consentanea. Plerumque enim, ut nunc, numerum fractum (sive Quotientem) eandem rem esse dicit cum ratione. Sed cum monitus ab *Hobbio* esset, numeros fractos, quotientesque omnes esse quantitates absolutas; rationem autem omnem quantitatem comparativam esse, negavit se dixisse, quotientem esse rationem ipsam, sed rationem esse penes quotientem. Tractatus ejus de *Arithmetica Infinitorum* totus eo fundamento nititur, quod quotiens sit ipsa divisoris ad dividendum ratio, ut quod $\frac{1}{2}$ sit ratio 1 ad 2.

A. Si ita est, neque totus iste tractatus ullius est pretii, neque is qui illum scripsit. Scripserat *Oughtredus* Cap. 6. *Clavis Mathematicæ* sub initium, quod quotiens divisoris ad dividendum rationem indicat, Verrum in Editione Anglicana invenio eo loco, quotientem esse rationem illam ipsam. Forte ergo Liber ille Anglicus ex versione est ipsius *Wallisii*.

B. Nescio, sed parum refert; non enim creditur *Oughtredum* sic ve ti voluisse.

A. Pergens, *Comparisonem* quæ est quoad differentiam, ad quantitatem; at quæ quoad rationem, ad qualitatem referendam esse ait. Nempe illam ad prædicamentum quantitatis, hanc ad prædicamentum Qualitatis. Sed quare? Quia ab *Euclide* definitur ποσὸς ὁρισμένης. En hic κατὰ ποσὸν ὁρισμένης Professorum Academicorum. Quid autem significat ποσὸς ὁρισμένης?

B. *Habitudinem qualitativam* ut ille nunc vertit. Sed fateor me non intelligere neque quid sit *Habitus*, neque quid sit *Qualitativa*. Dices fortasse tu hoc loco tussisse etiam *Euclidem*.

A. Sequuntur deinceps duæ Paginæ in quibus interpretatur quid sint *Progressio Geometrica* & *Progressio Arithmetica*, continua & interrupta, Ubi non tam deest veritas quam abundant verba. Cap. 26 Continet solutiones quarundum questionum faciliump per *Progressionem Arithmeticam*, sine demonstrationibus, ut apud vulgus *Arithmetico-rum Practico*: um. Cap. 27. eadem & nonnulla alia ejusdem generis per

per symbola demonstrat, minus perspicue, nec brevius quam possint demonstrari oratione plena. Denique capite 28 eadem brevius scribit sed obscurissimè. Caput 29 continet Criticismos super vocibus *Ratio*, *Rationalis*, ῥῆτον, ἀλογον, ἀῖον, ποιά ῥῆσι; *Quantuplum* &c, quorum Criticismorum aliquos superiùs absurdos esse ostendimus. Ita, que Caput hoc dimissem jam, nisi quod præterire non placet, quod dicit, *Euclidem quidem in Elemento decimo rationales appellare Lineas quæ potentia tantum sunt commensurabiles. Verum alibi non raro, obtinet rationalia tantum ea dici quæ ὁσόμετρα sunt; ut proinde sit ἀλογον sive ἀῖον, atque ἀσόμετρον.* Non enim puto aut *Euclidem* usquam, aut *Geometram* alium quemcunque ἀῖον & ἀσόμετρον pro eodem usurpassè. Non ergo illi credendum esse nisi Authorem & locum indicaverit. Quis enim qui *El. 10.* legerit nescit infinitas numero esse quantitates, inter se commensurabiles, quæ tamen sint irrationales; propterea quod ὁσόμετρα arbitrarie sumptæ commensurabiles non sunt. Pars hujus Capituli reliqua continet partem eorum quæ habet *Clavius* ad finem Elementi quinti de distributione rationum in suas species, nimirum *multiplicem, submultiplicem, superparticularem, superpartientem* &c. Præterire autem non possum verba ejus hæc, *Et quidem ipse fractiones nihil aliud sunt quam rationes. Nolo diutius neget se quotientem dicere divisoris esse ad Dividendum Rationem. Neque hæc, fractionis itaque Numerator & Denominator perinde sunt atque rationis antecedens ad consequens. Quæ (etsi vera sunt) verbis illius prioribus contradicunt. Neque hæc, Sunt enim rationes non minus quam numeri vere quantitates. Nam si quantitates rationum effari cogeretur, necessarium esse videret, pro ratione æqualitatis ciphram ponere, id est confiteri quod ratio æqualitatis media est inter rationem quam habet quantitas ad quantitatem, & rationem quam habet privatio quantitatis ad privationem Quantitatis; & proinde quantitatem rationis quam habet æquale ad æquale esse nihil. Sequitur Cap. 30. de rationum compositione.*

B. Differatur si vis, in diem crastinum.

DIALOGUS QUARTUS.

A. Etiam hodiernus nobis sermo totus fere erit de *rationibus*. Capite præfente de rationum agit compositione, prout definitur ab *Euclide* (El. 6. Def. ult.) *Ratio ex rationibus componi dicitur quando rationum quantitates inter se multiplicata efficiunt aliquam rationem.* In *Græco* τὴν αβ γδ. Sic enim inventio in libro cuiusdam Anonymi edita centesimo ab hunc anno in quosunt definitiones & propositiones *Euclidis* omnes *Græce* scriptæ. *Wallisii* liber ut videtur loco hujus definitionis hanc habet quando rationum quantitates inter se multiplicare aliquas effecerint. Quæ duæ lectiones sensu nihil differunt. Nam si duo termini unius rationis multiplicentur in duos terminos alterius rationis (id est, Antecedens in Antecedentem, & Consequens in Consequentem) oriatur ratio ex duabus illis rationibus composita; vel quod idem est, oriuntur duæ quantitates quarum ratio æquatur duabus illis rationibus simul sumptis. Itaq; compositio rationum est rationum (unius ad alteram) Additio, ut supra offensum est. Quare compositio rationum de qua hic loquitur *Euclides*, est ipsissima rationum unius ad alteram Additio.

B. Manifestissime. Additio tamen hæc per multiplicationem perficitur.

A. Verum. At non per multiplicationem rationum, sed per multiplicationem terminorum, termini autem non sunt *Rationes* id est *Relationes* sed *Correlata*, quas *Euclides* hic appellat *Rationum quantitates*.

B. Ita est.

A. At *Wallisius* hæc non intelligit, ut per proxima ejus verba manifeste apparebit; sunt autem hæc, [Quid per rationum quantitates intelligit *Euclides* non inter interpretes convenit: num scilicet ipsos terminos; num quod ex eorum comparatione provenit.] Quæ proveniunt inde, nempe, a multiplicatione terminorum in terminos, habent quidem rationem, ex propositis rationibus compositam, termini autem rationum componendarum esse non possunt.

B. Profecto *Euclidem* hoc loco Professor noster non intellexit. Neq;

(credo)

(credo) Authorem ullum vidit qui quantitates rationum eo modo interpretatus sit.

A. Alias quoque animadverti eum quæ scripsit dubitans an essent vera necne, quibusdam, id est Authoribus Anonymis, in dividuis vagis attribueret. Sed quid tibi videtur oratio hæc, [Utrumvis autem dicatur perinde est. Puta, si rationis A ad B termini in terminos rationis α ad β respective, ducantur; nempe A in α , B in β , ut proveniat ratio A in α ad B in β ; sive etiam ratio $\frac{A}{B}$ ducatur in rationem $\frac{\alpha}{\beta}$ ut proveniat $\frac{A}{B}$ in $\frac{\alpha}{\beta}$ perinde est] Oratio quidem valde symbolica est, sed quam non

intelligo. Nunquam enim multiplicari aliquid audivi, neque imaginari possum, nisi ut fieret vel multiplo major (nempe quando multiplicatio fit per numerum integrum) vel multiplo minor, (quando multiplicans est numerus fractus.) Non itaque intelligo quomodo aliquid multiplicari possit nisi per numerum integrum vel fractum. Veniam ergo mihi dabit Wallisus si non intelligam quomodo ratio A ad B duci possit in rationem α ad β . Rationem per numerum multiplicari posse scio, ut quando ratio multiplicata per 2 duplicatur, & per 3 triplicatur, & per $\frac{1}{2}$ fit ratio sesquialtera.

A. In omni multiplicatione fit ut multiplicans ad unitatem, ita productus ad multiplicatum. Itaque quot continet unitates ratio A ad B, toties $\frac{A}{B}$ in $\frac{\alpha}{\beta}$ continet rationem α ad β sanine sunt qui sic loquuntur? aut Professore talem ferre æquum est Academicos, si ad illum expiendum satis haberent virium? Paulo post cum dixisset rationem duplam componi ex sesquialtera & sesquitercia (quod verum est si per rationem duplam intelligit rationem duplæ ad simplum; alioqui falsum. Nam dupla ratio exponi per pauciores quam tres terminos non potest; ut nec ratio simpla per pauciores quam duos.

Subjungit [hoc est, ut loquuntur musici, ex Diapente & Diatessaron componitur Didapson.] Verumne hoc?

B. Equidem Artis Musicæ Imperitus sum: Scio tamen ex diapente, & diatessaron componi diapason.

A. Sed a tono imo ad quintum quot numerantur toni?

B. Si extremi assumantur, quatuor cum semitonio.

A. A quinto ad octavum quot?

B. Si iidem extremi numerentur, tres cum semitonio. Intercedunt autem inter imum & quintum toni duo & semitonium; inter quintum & octavum, tonus & semitonium, & summus tonus duplo acutior est quam imus.

A. Quomodo autem conveniunt hæc cum compositione rationis sesquialteræ & sesquiterciæ ad faciendam rationem duplam?

B.

B. Nescio nisi rationum apud Musicos & Geometras diversa sit computatio.

A. Videri vult scriptor hic omnium artium peritus esse cum sit omnium quidem artium imperitus, duarum autem, quas proficitur, Theologia & Geometria imperitissimus. Quod habet deinde de rationis a ratione Ablatione (quam hic vocat *avv. nescit*, rationis imminutionem) per Divisionem, respondit e contrario iis quæ habentur de rationum (quæ sit per terminorum multiplicationem) compositione, nec poterat id non videre.

Sed & aliter ratio a ratione detrahi potest, sine divisione. Nam si ratio 2 ad 3 detrahenda sit, ex ratione 4 ad 5, & fiat ut 2 ad 3 ita 4 ad aliam 6, erit ratio residua ratio 6 ad 5; ut explicitis numeris 4, 6, 5, videre est. Nam subducta ratione 4 ad 6 (id est 2 ad 3) ex ratione 4 ad 5 relinquitur ratio 6 ad 5.

A. Lego. [Vtrum hec Rationum compositio, additio iudicanda sit, an multiplicatio, haud satis videtur apud Arithmeticos (vel etiam Geometricos) constare.] Videtur his verbis respicere ad Clavius qui ad Prop. 23. El. 6. Contendit compositionem hanc & detractionem non esse propriè Additionem & Subtractionem; quia alias (inquit idem Clavius) esset totum æquale parti, & minus; & major proportio posset detrahi ex minore. Quæ (ut videntur illi) absurda, pluribus exemplis ex opinione contraria deducit, ad finem El. 9.

B. Nescientibus rationis majoris ad minus, id est quantitatis ad quantitatem naturam diversam esse a ratione minoris ad majus, id est, privationis quantitatis ad privationem quantitatis, & mediam inter utramque esse rationem æqualium, satis absurde sonat, majorem rationem a minore detrahi posse, & totam rationem ejusdem parte esse minorem. Sed si considerare vellent quod qui addit privationi privationem, quantitatem facit minorem; & qui privationem a privatione detrahit, quantitatem facit majorem, facile dici ferrent rationem majorem a minore, & totam a parte posse subtrahi.

B. Erravit, scio Wallisius sed cum doctissimo Clavio.

A. Doctissimo quidem Jesuitarum, & Scriptore omnium seculorum diligenti limo. Wallisius autem non ut ille quælibundus erravit, sed errorem illius amplecti satis habuit, quomodo querendum ulterius esset ignorans. Attamen obtinuit (etiam contra sententiam Clavii,) ut vocetur Compositio rationis (propter vim, credo, etiam intus latentis veritatis) Additio potius quam Multiplicatio. Sed id ægrè fert Wallisius, quia certum est (inquit) quantitates invicem multiplicari non addi. Quali diceret, quia compositio rationum fit per multiplicationem terminorum, ergo compositio Rationum est Multiplicatio Ratio-

num. Itaque paulo post, *designandum autem malim* (inquit) *per nota-*
tam x Multiplicationis quam per + Additionis. Adeoque quæ ex $\frac{A}{a}$ &

$\frac{B}{b}$ componitur ratio, scribenda est $\frac{A}{a} \times \frac{B}{b}$ non autem $\frac{A}{a} + \frac{B}{b}$.

B. Certe non male scribi credo A ad a & B ad b pro compositione
 rationum A ad a & B ad b ; quanquam pro multiplicatione fractionum
 malescriberetur $\frac{A}{a} + \frac{B}{b}$ & recte $\frac{A}{a} \times \frac{B}{b}$.

A. Ita sane, si modo per symbola scribere omnino necessarium esset.
 Quod addit, [*Adeoque tota illa de fractionum multiplicatione & divisione*
tradenda doctrina, de rationum continuatione & imminutione pariter
intelligendum erit; sunt enim ipsissima eadem res,] Promissio est Capitis
 45 de fractionum & rationum rationibus ab initio usque ad finem ab-
 surdissimi. Deinde, non idem (inquit) sonat ratio duplicata, triplicata
 &c., quod ratio tripla, dupla, &c. Est in sono (fateor) aliquod discrimen,
 ut inter dissyllaba & quadrisyllaba, sed tamen idem signifi-
 cant. Nam quicquid duplicatur fit non minus duplum quam dupli-
 catum; & quod subduplicatur (ignosce loquenti non latine) fit non
 minus dimidium quam subduplicatum. Et ut ratio 1 ad 4 est, dupli-
 cata rationis 1 ad 2, ita etiam dupla est, nempe ratio defectus duplicata
 sive dupla.

B. Memini hæc eadem eodem modo explicata esse in Colloquiis su-
 perioribus, & vera esse satis sentio.

A. Quod autem ratio iterata non dupla dicenda sit, sed duplicata,
 confirmatum putat ab *Euclide*, qui perpetuo utitur hoc sensu vocibus
 $\delta\iota\pi\lambda\alpha\sigma\iota\varsigma$, $\tau\epsilon\tau\pi\lambda\alpha\sigma\iota\varsigma$, &c. non $\delta\iota\pi\lambda\alpha\varsigma$, $\tau\epsilon\tau\pi\lambda\alpha\varsigma$, neque $\delta\iota\pi\lambda\alpha\sigma\iota\omega$, $\tau\epsilon\tau\pi\lambda\alpha\sigma\iota\omega$;
 sed vim nullam habet; nam utitur $\delta\iota\pi\lambda\alpha\sigma\iota\omega$ in Prop. ult. El. 9. ad
 significandum rationem simpli ad duplum. Non itaque verum est quod
 ea utitur perpetuo in sensu altero. Præterea fieri potest ut *Euclides* non
 satis ipse perspexerit rationis naturam; imo vero fieri aliter non po-
 test, cum definiat rationem per $\sigma\iota\omega\iota\varsigma$ & $\rho\acute{o\tau\iota\varsigma$.

Capite 31, ubi tractat Progressionem Geometricam, Regulam affert
 generalem, qua terminorum omnium invenitur summa, nimirum hanc,
 [sterminus ultimus per communem rationem multiplicetur (sive quod tan-
 tundem est. Progressio per unum adhuc gradum continuetur) atque inde
 auferatur terminus primus, & quod restat per numerum unitate minorem
 quam est communis ratio dividatur, prodibit progressionis summa.] Quam
 regulam deinceps demonstraturum se esse dicit. Id autem quod deinceps
 legitur demonstratio non est, sed indicatio quod ita contingit esse in pro-
 gressionem numerorum ipsius arbitrio sumptorum. Neq; si in progressionem
 omni numerorum tuo meove arbitrio sumptorum idem contingeret,
 non

non tamen demonstratio esset; tum quia causa accidentis non apparet, tum etiam quia inductio particularium, nisi numero infinitorum regulam non facit universalem.

B. Verba ejus hæc, *Regula demonstrationem deinceps exponemus*, non spectant ad id quod sequitur, nimirum *si in progressionem adjuncta*, &c., sed ad id quod habetur Capite 33 ad Numerum 68 qui incipit, *si terminus maximus* &c.

A. Ergo vocem illam *deinceps* toties ubique, præsertim in libris Mathematicis, occurrentem Criticus Mathematicus doctor ille non intellexit.

B. Fortasse regulam tamen quam hic exposuit, illic demonstrabit.

A. Certone?

B. Puto. Verum si regulæ demonstrationem aliquam ejus ipse habes profer quæso.

A. Sciendum prius est, in omni multiplicatione esse ut Numerus productus ad numerum multiplicandum, ita multiplicantem ad unitatem.

B. Scio. Nam opus Multiplicationis aliud non est quam numerum invenire qui toties contineat multiplicandum quoties multiplicans continet unitatem.

A. Tenes. Sic ergo numerorum quotlibet continue proportionalium series A. B. C. D. in qua A sit minimus. Fit ergo B ex multiplicatione A per aliquem numerum integrum vel fractum, sit multiplicans primo integer quem tu vis.

B. Sit multiplicans 3.

A. Est ergo $3A=B$, & $3B=C$, & $3C=D$; & ut A ad B, ita 1 ad 3, ut tu modo ipse demonstrasti.

B. Concedo.

A. Sed in proportionalibus ut primum antecedens ad primum consequens, ita summa antecedentium omnium ad summam consequentium omnium.

B. Rectè.

A. Et in serie proposita A. B. C. D. omnes antecedentes sunt A. B. C., & omnes consequentes B. C. D. Quare ut 1 ad $A+B+C$, ita 3 ad $B+C+D$. Et proinde $3A+B+C=D$. Et subductis utrinque $B+C$, restabit hinc quidem D, illinc autem $3A+2B+2C$. Habemus ergo æquationem unam $D=3A+2B+2C$; & sublato utrinque A, æquationem alteram $D-A=2A+2B+2C$. Quare diviso numero dato $D-A$ per 2, quotiens erit $A+B+C$; cui adjunctus datus D dat summam quæsitam.

B. Nihil clariùs. Sed sit jam multiplicans numerus fractus, puta $\frac{1}{2}$.

N

A.

A. Erit igitur $B = \frac{1}{2} A$; & $C = \frac{1}{3} B$; & $D = \frac{1}{4} C$; & proinde ut A ad B, ita 1 ad $\frac{1}{2}$. Item ut $A \uparrow B \uparrow C$ ad $B \uparrow C \uparrow D$, ita 1 ad $\frac{1}{4}$. Quare $B \uparrow C \uparrow D = \frac{1}{4} A \uparrow \frac{1}{2} B \uparrow \frac{1}{3} C$. Et sublatis utrinque $B \uparrow C$, fit æquatio hæc $D = \frac{1}{4} A \uparrow \frac{1}{2} B \uparrow \frac{1}{3} C$; & rursus, sublato utrinque A, fit hæc, $D - A = \frac{1}{4} A \uparrow \frac{1}{2} B \uparrow \frac{1}{3} C$. Quare diviso $D - A$ per $\frac{1}{4}$, erit quotiens $A \uparrow B \uparrow C$. Datur autem D. Cognita ergo est summa simul omnium.

B. Multo magis perspicua & amœna demonstratio hæc est quam illa Professoris nostri Algebraica.

A. Quidni? An comparanda est Algebra cum Methodo Analytica sed de demonstratione *Vallifiana* videbimus inferius.

B. In numeris proportionalibus, terminorum ulteriorum investigatio apud nostrum ærumnosa est. Sed lege quæ sequuntur.

A. [*Progressionis cujuscvis inchoata terminum ultimum a primo satis remotum invenire.*]

B. Operatio, inquam, quam docet per notationem exponentium, & iterationem, quam requirit, operis, ita ut nisi palpando progredi non liceat, & ignorantia finis, odiosa res est. Ostende igitur illius rei Methodum certam.

A. Sint continue proportionales A. B. C. D. E, Communis autem multiplicans sit M. Sunt igitur ipsis A. B. C. D. E. æquales A. M A. M M A. M M M A. M M M M A, (Si modo sumantur eodem ordine) singuli singulis. Vides ergo progressionem generari x multiplicatione termini minimi A, primo per multiplicantem communem M; & deinceps, per ipsius multiplicantis potestates ordine ascendentes, nempe, per M M quadratum, M M M, Cubum, M M M M quadrato-quadratum, &c.

B. Video.

A. Et esse quot termini tot potestates ascendentes, demptis duabus; nam M non est potestas sed Radix. Multiplicationes autem tot sunt quot sunt (dempto uno) ipsi termini. Jam datis duobus tantum terminis primis datur M, nimirum dividendo B per A. Quæritur autem, verbi gratia, terminus post A quartus. Scribe M quater, ut M M M M. Quia ergo datur M, datur quoque M M M M. Datur autem & A. Datur ergo M M M M A terminus quæsitus, nempe quartus incipiendo a B. Multiplicationes enim una pauciores sunt quam termini.

B. Teneo. Et siquidem terminus postularetur centesimus, deberet M multiplicari in se nonagesies novies, & productus in A, ut haberetur terminus centesimus.

A. Ita est; Sed labor aliquanto minor erit, ubi multi sunt progressionis termini, si multiplicatio fiat per potestates altiores. Nam si multiplicans sit 3, non est necesse ascendenti ad Cubicubum, Multiplicationem incipere a 3; possumus enim incipere a Cubo ejus 27, vel ab alia altiore potestate cognita.

B.

B. Sed cur tu pro multiplicante ponis M, cum Wallisius ponat ubique R.

A. In causa certè non est quod libeat ab illo dissentiri, sed ne alios, (ut ille) inducam in errorem. Ego enim pono M literam Multiplicantis initialem, ille R literam initialem Rationis. Nam in progressionem (exempli causa) 2. 6. 18. concedimus ambo communem multiplicantem esse 3 sive R, sive M appellatur. Ille autem hoc amplius rationem 2 ad 6 esse 3. Et propterea quem numerum ego communem multiplicantem voco, appellat ille communem rationem; unde fit ut nonnulli illius securi Auctoritatem, rationem putent esse numerum, nimirum quotientem; quod est erroneum.

B. Imò verò absurdum.

A. Video hic symbola ab illis quæ hætenus usus est diversissima,

B. Non sunt illa Symbola Algebraica, sed literæ Arabica.

A. Legitne ille Arabica, ut Clericus?

B. Nescio. Sed a viro doctissimo & illius linguæ peritissimo accepta libro suo visum est illi Arabica hæc inserere. Nam Progressionis Geometricæ exemplum inquit elegans est & vetustum & forte omnium primum. Ostenditur autem hoc exemplo in quam inmensam summam per paucas duplicationes excrescit unitas.

A. Ostenditur præterea legisse illum Edwardi primi Statutum de mensuris Anglicanis, ut eo transcripto videretur etiam peritus juris. Nam absque his, quæ ad scientiam Arithmeticæ nihil pertinent, Caput hoc 31 vix contineret duas Paginas.

B. Datis terminis primo & ultimo, quomodo invenitur quem quis postularet terminus intermedius?

A. Dato quidem numero terminorum facillimè. Divido enim ultimum per primum, & quotiens erit potestas aliqua ex ascendentibus; nempe si ultimus fiat a multiplicatione quadrati in terminum primum, erit terminus ultimus tertius; si fiat ex cubo in primum, erit ultimus quartus, & sic deinceps; dato ergo terminorum numero cognosco quanta sit in ascendentibus potestas illa ex cujus multiplicatione in terminum primum fit ultimus. Diviso ergo termino ultimo per primum, innotescit potestas illa cujus Radix propria est communis multiplicans. Exempli causa, si sit progressio data 3. 6. 12. 24. 48. 96. & communis multiplicans M. Progressio hæc 3. 3 M. 3 M M. 3 M M M. 3 M M M M. Eadem erit quæ est data. Datur autem numerus terminorum 6. Fit ergo 96 ex potestate quarta in 3, id est, ex Multiplicantis surdo-solido in 3. Diviso ergo 96 per 3 habetur multiplicantis surdo-solidum 32, cujus radix propria nempe 2 est communis multiplicans. Quo multiplicante cognito, quilibet terminus intermedius statim invenitur, ut qui fit ex 3 in 2, vel in 4, vel in 8, vel in 16, &c.

B. Methodus ut quæ procedit ab ipsa terminorum generatione recta est.

A. Capite 32 loquitur de origine & usu Logarithmorum (ut ex primis ejus verbis manifestum est) imperitè. Verba hæc sunt [*est autem ea quam superiore capite tradidimus regula (de terminis remotioribus intermediis quasi persaltum inveniendis) maximi quidem momenti Regula; non tamen ob eum quem jam ostendimus illius usum, quam ob insigniora quæ inde defluerunt commoda.* Ex hoc enim fundamento dependet Mirificum illud Logarithmorum Inventum. Næ ille Nepperi inventoris & Briggsii Logarithmorum inventorum excultoris, clarissimis ingeniis non multum tribuit, qui principium tam facile inventionis assignat quam est ex datis primis terminis progressionis inventio ulteriorum. Præterea, quod per eam Regulam inveniri putet Logarithmos terminorum intermediorum falsum est. Nam e contrario qui hæc utuntur regulam non Logarithmos per terminos progressionis, sed terminos progressionis inquirunt per Logarithmos datos, nimirum, per potestatum ascendentium indices Arithmetice Proportionales?

B. Unde ergo illi in mentem venire potuit tam insigne inventum.

A. Observaverat ille inter duas quantitates extremas (cum mediæ interponi possint tum Geometricæ tum Arithmeticæ numero infinitæ) quanto plures interponuntur, tanto minus Geometricas & Arithmeticas inter se differre. Inde (nec aliunde) venit ei in mentem, quod valde multis mediis interpolitis in Ratione Geometrica, totidemque in Ratione Arithmetica, alteræ ab alteris non differunt nisi in notis numericis a prima adeo remotis, ut postremæ (retentis prioribus) sine damno calculi possint negligi, & per consequens, ea quæ per Multiplicationem & Divisionem solebant supputari, per Additionem & Subtractionem satis accurate expediri. Quæ deinceps scribit Wallius de Logarithmorum usu pauca sunt & transcripta ex initio libri de Logarithmis editi a Eriggio.

B. Videamus jam ea quæ continentur in Capite 33 de Progressione Geometrica per symbola.

A. Toto hoc Capite difficultas præter eam quam faciunt ipsa symbola fere nulla est. Itaque unius tantum Theorematis demonstrationem examinabimus, in qua regulam demonstrare conatur qua vulgò utuntur qui quærent summam Progressionis Geometricæ datæ. Ait ergo ad Art. 68, *Si terminus maximus in communem rationem ducatur; & ex productio auferatur terminus minimus, residuumque per rationem communem unitate minutam dividatur, quotiens exhibet totius progressionis summam; hoc est*
$$\frac{UR-A}{R-1} = S.$$

B. Ita. Nam U, est terminus Ultimus. R communis multiplicans A terminus minimus.

A.

A. Pergamus. [Quis (inquit) hanc primus invenerit regulam plane ignoro, & quidem utut ea plerique utantur, non memini tamen me illam ipsam demonstratam vidisse; cum tamen vel maxime demonstratione indigeat. Nobis ergo hanc libuit demonstrationem comminisci.]

B. Lege demonstrationem ipsam.

A. [Ponamus (inquit) numerum terminorum $T = 4$. Adeoque $A R_t = A R_4$. Et dividenda proponatur $A R_4$ — A per R — 1. Cum igitur sit R) $A R_4$ ($A R_3$.] Non amplius intelligo quid sibi vult.

B. Dicit, si quantitas facta sit ex multiplicatione A in R , & producti in 4, Quotientem esse factum ex A in R & producto in 3.

A. Non vult hoc sed aliquid aliud.

B. Nescio, sed aliis in locis symbola similia id significant quod dixi. Ut Pag. 172. l. 23. ubi sic loquitur, quoniam F) ABF (AB scribo in quotiente $A B$. Hoc est ABF diviso per F Quotiens erit $A B$.

A. Recte quidem illud; falsum ergo hoc, R) $A R_4$ ($A R_3$. Nam R) $A R_4$ (A + verum est. Si enim A_4 in R facit $A R_4$, etiam $A R_4$ divisus per R dabit quotientem A_4 .

B. Videtur hic lapsus esse aliquis vel festinantis calami, vel Typographi.

A. Sive lapsus sit, sive arcanum aliquod artisymbolicæ, vim certe habet omnem demonstrationis hujus ulteriorem examinationem præcidendi. Transilemus Caput 34. Ut quod nihil aliud est præter earundem demonstrationum breviorum & fere totam symbolicè scriptam synopsis cæcam; Caput 35. est Elementi quinti Euclidis demonstratio Arithmetica. Quod quidem Elementum symbolicè cuilibet & suis symbolis transcribere facile est.

B. Quid? Demonstrationes ejus nihilne aliud sunt præter transcriptiones,

A. Non id dico, sed cum facile sit demonstrationes Euclidis una cum definitionibus ejusdem scribere symbolicè, facilius est Theoremata ejus inferre ex assumpta sine demonstratione Hypothesi. Nam cum totum illud Elementum 5 ex definitione dependeat ejusdem rationis, ille neglecta definitione Euclidis, loco ejus substituit hanc. *Æqualitas sive Identitas Rationis est æqualitas sive identitas quotorum*. Deinde sub-

jungit, Puta si sit $\frac{a}{\alpha} = \frac{b}{\beta}$ est & $a. \alpha :: b. \beta$. & contra; quod nobis erit definitionis loco. Similiter Rationem majorem & minorem definit sic. *Ubi quotus major est, ibi ratio major; ubi minor, minor est.*

B. Propositio est, Definitio non est. Quanquam autem Definitio non sit, sed propria passio, vera tamen erit Demonstratio.

A. Erit, modo ipsa passio fuerit prius demonstrata.

B. Demonstrata est Capite 33 per propositionem Euclidis 6. 16; nempe,

nempe, si quatuor quantitates fuerint proportionales, factum ab extremis æquatur facto a mediis, & contra. Sed hoc Euclides in lineis, VVallisius in numeris demonstrat.

A. Quid opus erat? Nam numerorum rationes omnes accommodari possunt Lineis, quanquam contra non omnes rationes linearum competant numeris. Sunt enim lineæ multæ inter se incommensurabiles, numeri autem incommensurabiles esse non possunt. Sed videamus ipsam Demonstrationem. Capite 32, quo amandamur nihil est quod eo respicit.

B. Quære in Cap. 33, quod totum est de continuè proportionalibus. Lege prop. 21.

A. [Continue proportionalium, si duorum quorumvis rectangulum per terminum primum dividatur, prodibit terminus, cujus index sive distantia a primo æquatur illorum indicibus simul sumptis.] Quod verum est. Dum autem propositionem ejus hanc 21 percurro, intelligo quid significant symbola prop. 68. ejusdem Capituli. Nam R $A R^4$ ($A R^3$ hoc significant, quod diviso numero qui fit ex A in 4 & ex producto $A R$ multiplicato per potestatem cujus index est 4, quotiens erit factum ex $A R$ in potestatem cujus index est 3. Quod non negatur. Sed hoc eine est demonstrare, nimirum rem ita obscure enuntiare ut a nemine intelligi possit nisi qui non modo illius norit symbola sed etiam methodo naturali idem potest demonstrare?

B. Et si propositionem hanc veram esse ex tua perspexi demonstratione, nescio tamen an illius demonstratio sit legitima. Legi enim symbolica ista ut pueri *Homerum*, quibus ad singula vocabula adeundum est Lexicon. Illud autem $A R^4$ ne in Lexico quidem est.

A. Sit quidem vera demonstratio; at quomodo transferri potest ad proportionales quæ nec continuæ sunt, nec in eadem serie continuarum, quales sunt 2. 4:: 3. 6. vel 3. 9:: 4. 12. ubi distantiiis & indicibus locus non est? Nondum ergo propositionem illam *Eucl.* 6. 16. demonstravit.

B. Redeamus ad Cap. 35. unde frustra digressi sumus.

A. Imo transiliamus & illud & proximum illi 36. Credo enim Elementum quintum ex Hypothesi quam ille assumpsit aut recte demonstratum esse, aut si vitium aliquod irrepperit (præter ipsam scriptiorem si symbolicam) non illius imperitiæ, sed Typographo vel transcriptori tribuendum esse. Est autem Cap. 36. ejusdem Capituli 35 Brachystenographia.

A. Caput 37 unicum habet problema hoc, datis tribus proportionalibus invenire quartum; quæ est regula aurea. Cujus constructio hæc est, tertius multiplicetur per secundum, & productus dividatur per primum. Quæ vera & vulgo recepta est. Demonstrans autem sumit (quod

Capite

Capite 25 loco definitionis nullo jure habuit) ubi quotientes sunt æquales, ibi rationes sunt eadem, & ubi quotiens major est ibi major ratio, ubi minor, minor.

B. Si sint duo quotientes æquales, exempli causa, numero 4 (qui est quotiens divisi 20 per 5) æqualis sit 4 (quotiens divisi 12 per 3) dicit ergo 4 ad 4 esse in eadem ratione; quod non intelligo, nam aliquid deest. Forte hoc vult, eandem esse rationem 20 ad 5, & 12 ad 3; vel $\frac{20}{5} = \frac{12}{3} = 4$.

A. Improprè quidem loquutus est, verum autem est quod demonstrare voluit, nec fecit. Postquam enim dixisset, cum sit A. a::B. ß. subjungit, hoc est $\frac{A}{a} = \frac{B}{\beta}$. Quod nondum constat, sed erat prius demonstrandum. Argumentatio ex concessa Hypothesi satis procedit. Sed demonstratio non est.

B. Regula Aurea quomodo aliter demonstrari potest?

A. Eo modo quo demonstratur ab Euclide Elem.9.19. Vel sic; numeri plani sunt rectangula sub rectis quarum partes aliquotæ numerantur. In duobus autem rectangulis æqualibus, ut latus unum primi ad latus unum secundi, ita latus reliquum secundi ad latus reliquum primi. Quare in numeris planis æqualibus est ut factor unus primi ad factorum utrumvis secundi, ita coefficientens secundi ad coefficientem primi. Si dentur ergo tres numeri A, B, C, & quæzatur D, quia factus ex A in D æqualis est facto ex B in C, divisoque AD per A proveniet D, etiam diviso BC per A, proveniet idem D; quæ est Regulæ Aureæ demonstratio naturalis. Nullus enim numerus rerum æqualium (quales sunt partes aliquotæ) multiplicatus per numerum, producit numerum alium quam numerum rerum numeraturum, propterea quod ratio æqualitatis (cum ipsa non sit quantitas) non addit neque detrahât quantitati rationum quam habent ipsi numeri.

B. Satis clarè. Sed putaram potuisse fieri aliquanto brevius.

A. Nescio, nec credo; melius est autem quod probandum susceperis pluribus verbis manifeste demonstrare, quam paucioribus non demonstrare. Sequitur Aureæ Regulæ Praxis, id est, exempla operationis vulgaria. Deinde exemplum aliud ubi quæritur quæta hora sit Athenis quando est Oxonæ octava, cujus praxis nulla esse potest, nisi iis qui sciunt doctrinam Sphæræ & Circulorum quos in illa sinxerunt Astronomi. Il vero nulli sunt qui non regulam hanc ante didicerunt. Non erat ergo Arithmetici hoc docere, cujus est omnia docere abstractè a rebus numeratis, id est, universaliter. Deinde quod monitum lectorem voluit ne quando fraudi sit, quod ea tanquam proportionalia habeantur quæ proportionalia non sunt, ad Arithmeticam non pertinet, sed ad Philosophiam, ut ex suo ipsius exemplo est manifestum, Posito

(in-

(inquit) quod pondus gravitate sua motum duobus temporis momentis 20 pedes descendat; queratur quot pedes descensurum sit momentis 10. Si fiat multiplicatio numeri tertii per secundum, atque divisio producti per primum, prodibit quartus 100. At ille numerus quesito non satisfacit.

B. Nonne ergo Regule Aureæ definitio tradita initio hujus Capituli falsa est?

A. Minime. Sed numerus qui in una questione secundus est, in alia debet fortasse esse tertius. Præterea, queritur aliquando, datis tribus numeris, quis sit ad tertium in ratione primi ad secundum duplicata vel triplicata, pro ratione rerum numeratarum, ut in hac ipsa questione, ubi gravia non percurrunt spatia in eadem ratione, sed in duplicata momentorum temporis; ut a Galileo demonstratum est in Dialogis de motu; id quod *Wallisius* nescit. Qua ratione descendunt gravia, vel fluida e vase effluunt, non est Arithmetici docere, sed Physici.

B. Sed qui obiter Physicum Theorema docet Arithmeticus, an culpandus est?

A. Non. Parergon est si doceat; sin libro Arithmetico inserat, neque demonstrat neque conetur demonstrare (quod fecit ille) ineptum est. Quæ sequitur per tres paginas est præcedentium symbolica scriptio. Deinde ostendit quomodo multiplicari (in Regule Aureæ operatione) possint inter se duæ quantitates Heterogenæ, vel una per alteram dividi possit; puta quomodo pondus in lineam multiplicari, vel per eam dividi possit; dicitque utrumque fieri per reductionem utriusque quantitatis ad numeros; & quidem rectè.

B. Sed nonne fieri potest etiam per reductionem ad lineas, cum ipsi numeri ad lineas reduci possint? Præterea fieri potest ut pondus ponderi sit incommensurabile. Tunc autem reduci ad numeros non possunt, ad lineas possunt.

A. Commodius certè reducuntur ad lineas. Sed ille quanquam non satis, non male tamen fecit.

B. At ille *Hobbium*, quia rationem ponderum & linearum mediantibus lineis permutavit acerrime increpat in *Elencho*.

A. Tanto ille nequior. Venimus jam ad Auream Regulam Inversam five Reciprocam quam docet *Cap. 38. Ubi expositis* (inquit) *tribus quantitatibus queritur quarta reciproce proportionalis.*

Demonstrationem Regule hujus deducit ab eo quod in reſtangularis æqualibus latera sunt reciproce proportionalia. Quod quidem rectè fecit, sed necessario. Fateatur ergo hic, quod negavit ante, Arithmetica a Geometria, non contra, Geometriam ab Arithmetica dependere. Cætera tranſeo cum sint trita, Sequitur *Cap. 30. de Aurea Regula*

Regula composita, quam primò per duas operationes, deinde per unicam absolvit, sed non demonstrat. Nam ratiocinatio ejus ex eo dependet, quod regula composita ea est, qua datis quinque numeris invenitur sextus, ad quem ita se habeat tertius, ut factus ex compositione rationum primi ad tertium sibi cognominem, & secundi ad quartum sibi quoque cognominem. Ratio enim effectuum componitur ex rationibus causarum singularum unius ad singulas causas alterius ejusdem generis, ut hominum ad homines, & mensium ad menses. Itaque ut exemplo utar quod ipse adfert, si 4 *Academici in 3 mensibus expendant 20 libras*; quot *libras expendent Academici 6 in mensibus 12*. Numeri dati sunt quinque. 4 Acad. 6 Acad 3 menses. 12 menses. 20 Lib. Scribantur ergo $\frac{4}{3} : \frac{6}{12}$ Ratio jam quæ oritur ex compositione rationum 4 ad 6 & 3 ad 12 est ratio 12 ad 72. Quare ut 12 ad 72 ita est 20 ad quæsitum. Multiplicatis ergo 72 per 20 fit 1440, qui divisus per 12 dat quæsitum 120.

Caput 40 de regula societatis, nihil habet in neutram partem singulare; itaque transiliri potest. In Capite 41, ubi tractat de numeris fractis, noto primo hæc verba, supponit Arithmetica unitatem, sive unum, numerorum primum esse, quod est falsum. Supponit hoc Wallisius, non supponit Arithmetica; nam unitatem Euclides numerum esse negat. Sed quæstio hæc, non magis ad Arithmeticorum quam ad vulgi cognitionem pertinet. Et quid de ea sentiendum sit a nobis satis disputatum est supra ad Cap. 4. Secundo, verba hæc, [*Unum aliquod in partes dirimendum vero aliquo numero designari non potest.*] Nam & hoc falsum est; quia tres quartæ partes unius cujuscunque rei non minus verus est numerus quam tres quartæ partes unius octonarii. Et simpliciter tres partes sunt æquæ verus numerus ac tria tota. Sed pro veris numeris haberi (inquit) non solent. Neque hoc concedo.

B. Sed probat ex eo quod sub numeri appellatione apud Euclidem non censentur.

A. Quia numerus hominum sub appellatione numeri apud Euclidem non censetur, ideo ne sequitur quod numerus hominum non est numerus? Cur autem numerus hominum magis est numerus, quam numerus partium unius hominis?

B. Nescio, sed perge.

A. Hoc quoque animadversione dignum est. Quod dicit [*ex imperfecta & impossibili radicum extractione oriri numeros surdos* $\sqrt{3}$. $\sqrt{5}$, &c.] Numerus enim nullus est qui non est in progressionis hujus Arithmetice serie 1, 2, 3, &c, si continuetur quantum potest.

B. Nihil manifestius. Sed ignosce.

A. Quidni? Condonamus ei non modo hanc sed omnem ejus (quantacunque sit) ignorantiam; sed falsa corrigentibus liceat vera inve-

investigare. Fractionem mox laboriose definit esse *qua unius integri pars indicatur, quæ ad totum illam rationem habet quam habet fractionis Numerator ad Denominatorem.*

B. Male hoc. Ni enim cognitum prius sit quid sit *fractio*, cognosci non potest quid sit *Numerator*, aut *Denominator fractionis*.

A. Poterat brevius verius & plenius naturam fractionis explicasse sic, *Fractio est numerus partium. Propria quidem unius; impropria vero plurimum quam unius.*

B. Accuratè.

A. Deinde verba hæc, [*Sed & hinc etiam patet Rationum & Fractionum identitas, sive Affinitas maxima,*] illorum sunt qui quid accuratè dicendum sit ignorant. Vox enim illa *Affinitas Mathematicorum* non est. Si ratio & fractio eadem res sit, quid opus est loqui de affinitate? si diversæ, quomodo affines?

B. Quia fractio rationem indicat dividendi ad divisorem.

A. Horologium indicat horam; quare ergo non est Horologii & Horæ vel identitas vel saltem maxima affinitas? Non ita ratiocinari solent Mathematici, Porro hæc, *Quippe nil aliud sunt fractiones quam rationum denominatores*, accurata non sunt, nam fractio denominat numerum certum certarum partium ut $\frac{1}{3}$, id est, tres partes quartas, qui numerus est absolutus; ratio autem quantitas est non absoluta sed comparativa; Non ergo denominat fractio rationem, sed ostendit quantitatem numeri absoluti ut $\frac{1}{3}$, comparatè cum numero absoluto, ut $\frac{1}{4}$.

B. Non video quomodo hæc negari possunt. Neque quicquam illum juvat quod deinceps habet, nimirum, *quod Aurea Regula rationum rationes comparat; & quod opus sit Arithmetici non minus rationem quam numerorum rationes contemplari.*

A. Caput 42 est de Additione & Subductione Fractionum. Quod de Additione dicit earum Fractionum quarum idem denominator est, verum est, & quidem demonstratum esset, nisi medium ipsum quo utitur ipse alias negasset. [*Numeri (inquit) 2 & 3 simul additi constituunt 5, quæcunque res illa sint quæ numerantur, puta sive integra sive partes. Et quæ ratione 2 & 3 homines, sunt 5 homines, &c. eadem plane ratione 2 & 3 semisses sunt 5 semisses.*] Cum ergo 2 & 3 homines sunt verus numerus; etiam 2 & 3 semisses, vel etiam 2 & 3 centesimæ sunt verus numerus; sunt autem fractiones; est ergo fractio verus numerus. Quod cum ille in præcedentibus semper negaverit, propositum non demonstravit. Ostendit paulo post, duarum fractionum diversos habentium denominatores, ad duas alias quæ denominatorem eundem habent, Reductionem. Exemplo utitur $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{3}$ quas fractiones ad eundem denominatorem reduci demonstrat, nempe ad fractionem hanc $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ & quidem (cum aliis plerisque) rectè. Adeoque mirum est quod

quod non viderit fractiones & rationes quantum differunt. Nam si ratio $\frac{1}{3}$ (id est juxta illum ratio 1 ad 3) addatur rationi $\frac{1}{4}$ (id est, ut illi placet) rationi 1 ad 4, summa erit ratio $\frac{7}{12}$, id est, ratio 7 ad 12, quod manifeste falsum est. Si enim ratio 1 ad 3 addatur rationi 1 ad 4, summa erit ratio 1 ad 12, id est secundum *Wallisium* $\frac{1}{12}$. Itaque æquales inter se erunt $\frac{7}{12}$ & $\frac{1}{12}$. Vel componendo rationes eo modo quem docet *Euclides*, erunt, $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$. Similiter fractio $\frac{1}{3}$ addita fractioni $\frac{1}{2}$ duplicatur & fit 1. At ratio 1 ad 2 addita rationi 1 ad 2 duplicatur & fit ratio 1 ad 4. Sunt ergo per illum qui fractionem & rationem pro eadem habet re, $\frac{7}{12}$ & 1, inter se æquales, Quod vides quam sit absurdum. Sed absurda quæ in ipsis numeris satis parent, descripta symbolis, symbolorum imperitis (quæ est utilitas symbolorum) facile fallunt. Neque si non fallerent, quicquam valerent symbola nisi ad obscuritatem (alioqui) clarissimis inducendam: sequuntur *Cap. 43. de fractionum Multiplicatione & Divisione*, & *Caput 44 de fractionum reductionibus*; in quibus ut nihil falsum, ita nihil novum reperimus, neque in demonstratis neque in demonstrationibus. *Caput ultimum Epilogus* est quo præcedens opus Arithmeticum se dicit absolvisse. Doctrinam enim de rationum rationibus traditam esse ait in *Doctrina Fractionum*; quod quam rectè factum sit audisti modo. Et siquidem ipse huic Doctrinæ Theoremata ulla superstruxisset, absurda ea esse intellexisset ipse.

B. Non puto. Nam hæc Doctrina fundamentum est totius fere tractatus illius quem inscripsit *Arithmetica Infinitorum*; quem tractatum una cum tractatibus de *Conicis sectionibus*, & de *Angulo Contactus* mecum attuli ut examines. Nam illos examinari cupio.

A. Examinabo. Sed ad opus *Integrum Arithmeticum* defunt adhuc *Regule Alligationis & falsæ positionis*, quarum altera (inquit) tum aliis de causis, tum quod illa non adeo frequentis usus sit, altera sine magno dispendio post introductam *Arithmetica speciosam* careri possit. Quod utrumque falsum est. Nam & regulæ alligationis apud Mercatores usus est satis frequens; & regula falsæ positionis cum dependeat ab hoc Theoremate, *Ut unum falsum suppositum, est ad errorem a se natum, ita alterum falsum suppositum, est ad errorem itidem a se natum, demonstrari potest sine Algebra*. Demonstratio longiuscula est. Sed legere eam poteris in fine libri quinti *Bartholomæi Pitisci de Triangulis*.

B. Legam.

A. Sed deest etiam ad opus *Arithmeticum integrum*, methodus inveniendi radicem cuiusque potestatis datæ. Item ars *Analytica*, nisi illa *Arithmeticæ* pars vel regula aliqua non sit, quæ an rectè prætermisit, item an ea quæ tradidit rectè tradidit tuum est considerare.

B. Restat adhuc percurrendus *Tractatus Elencticus contra Meybomium de proportionibus*, una cum dedicatione. Deductio paginas habet 50; opus dedicatum 62.

A. Scio. Sed non est illa tam dedicatio quam laborantis lapsi sunt sum in Conicis corrigere miserabilis labor & perplexitas.

B. Scripserat *Prop. Sect. Con. 47. in paraboloide cubicali diametros esse sibi invicem Parallelas*; Quod Robervallus illi falsum esse indicavit. Lege ergo ut sciamus si quid afferat nunc quod sit rectius.

A. Non est tanti tota Geometria, sunt enim paginarum sequentes duodecim quibus quaeritur *Æquationis* nescio cuius radix q adeo stigmata symbolisque scribillata, ut nulla humana patientia examinari possint. Illas igitur abhominans prætereo; præsertim cum Diametrum Paraboloidis cubici ne sic quidem inventam esse dicat. Sed æquatio illa cuius Radix est q (q autem quid sit nescio) illum vexaverat; itaque homo vindictæ amans ulcisci parat. Nempe (inquit) vexanda adhuc est æquatio illa que nos vexavit hætenus, ut tandem quid certi prodatur. Assimulansque Proteo *Æquationem*, ea occasione usus, versus ex Homer. *Odys.* plusquam duodecem inseruit. Deinceps autem resumptam eandem æquationem vexat frustra, nec quidquam adhuc certi prodit Proteus.

B. Transeamus ergo ad ea quæ habet contra *Meybomium*.

A. Prætereo illa quæ ex *Meybomio* affert proprium inventum extollente (nam & *Wallisius* non minus gloriose, & multo magis contumeliosè scribit quam *Meybomius*) & illud quod non satis distinguit *Meybomius* inter τὸ ἀπὸ & τὸ οὐπὸ, quia propero ad ea quæ scribit de Natura Rationum. Primum igitur quod reprehendit *Wallisius* est quod *Euclides* illud (in Definitione Rationis) ποῖα ὁρίσιν vertit per certam quendam relationem, propterea quod ποῖα qualitatem respicit. Si quid peccavit hoc loco *Meybomius*, peccatum, est quod illud quod *Euclides* insignificanter dixerat id voluit dicere accuratius. Verteret *Wallisius* habitudinem qualitativam, quanquam qualitativa vox latina non sit, neque intelligibilis. Habitus autem in qualitatibus nihil aliud est quam habitus, id est facilitas agendi consuetudine acquisita. Hoc inquam ita est Latine. Ergo secundum *Wallisium* ratio est duarum magnitudinum Homogenearum ea que secundum quantitatem est, facilitas agendi consuetudine acquisita. Qua definitione quid potest esse magis ridiculum? non respexit *Euclides* ad prædicamentum qualitatis, in voce ποῖα, sed ad vocem in enuntianda rationum similitudine vulgo usitatam ὅτις ὅτις (ut in præcedentibus notavimus) atque inde definit rationem per aliqualem habitum, seu (quod hoc loco idem est) per habitum quendam (subaudi) nescio quem; rectius ergo *Meybomius* rationem definivit quam aut *Wallisius* aut ipse *Euclides*. Quid enim ratio aliud est quam magnitudo unius quantitatis quatenus ad aliam comparatur?

B. Nihil.

A. Sed vide *Wallisti* super hæc scholiastæ verba Latine ab ipso ver-
sa, subtilitatem, Verba sunt hæc. Est autem alia quæ dicitur relatio secun-
dum excessum & defectum.

B. Quid? Aliane ratio an alia Relatio?

A. Ἀλλὰ τοῦτο id est alia habitudō.

B. Cur ergo non vertit per *alia habitudo*, sed per *alia relatio*?

A. Quia ratio quæ hic innuitur ea est quam vulgo vocant *rationem Arithmetica*m, quam *Wallius* negat esse *rationem*. Itaque homo subtilis sententiæ suæ convenienter locum vertens, maluit *Relationem* dicere quam *Habitudinem*, quæ vox est in definitione *rationis*. Deinde paulo infra præviso quod non inepte quærere quis posset *an inist in ratione qualitas aliqua*; respondet, ut *figurarum magnitudo ad quantitatem spectat, ita figurarum species spectat ad qualitatem*. Quasi aliud in *Figuris* compararent *Geometrarum præter quantitates*; aut esset aliqua ratio magnitudinum quæ esset *qualitas*. Illæ ipsæ ratio & inclinatio propter quas figuram qualitatibus accenseri possunt, ambæ sunt quantitates, nec ut *quales*, sed ut *quantæ* considerantur a Mathematicis. Quod *Meybomius quantum a quoto non distinguat*, ab *Wallisio* recte reprehenditur. Deinde quod *Meybomium* reprehendit, quia in locis aliquot veterum ubi emendatio debebat fieri per *διπλασίονα*, emendat per *διπλασίον* merito fecit. Sed quod *Meybomius* idem significare censuerat *διπλασίον* & *διπλασίος* recte censuit, *Vallisius* autem id negando, imperitum se ostendit *Linguae Græcæ*, etiam ejus qua utuntur *Geometrarum*, ut in verbis ab ipso recitatis manifestum est, ὅτι δύο λόγοι τῷ ἴσος διπλασίονι ὄντι, καὶ τῷ μὲν ἄλλοι δύο ὅτι δύο διπλασίονι ὄντι; id est non dicit *duas Rationes* unius esse *duplas*, Quod tamen est verum, sed *Rationem* ex duabus compositam esse *duplilatam*.

B. Non capio. Vellem professor noster ostendisset quare duæ rationes æquales compositæ non faciunt rationem unius duplam, & quare duplum simpli non sit ejusdem simpli duplicatum.

A. Sed harum vocum alium sensum esse dicit apud Mathematicos.

B. Credo.

A. Et ego, etsi non semper, tamen sepius ira esse. Id quod ex eo contigit quod (ut dixi ante) non ausi sunt Rationem minoris ad mediam duplam esse dicere Rationis ejusdem minoris ad maximam. Quae tamen magnitudine dupla est, quamquam numero Rationum dimidia; ut ratio 1 ad 2, dupla est Rationis 1 ad 4 quantitate, etsi contra Ratio 1 ad 4, dupla sit, si spectes rationum numerum. Id quod saepe alias dixi, nimirum, in Rationibus minoris

ad majorem, quæ sunt Rationes Defectus, multiplicatio Rationum quantitatem Rationis minuit, Divisio auget. Deinde, quod *Meybomius* dicit, Si rationum magnitudo sit exploranda, ille major est cujus termini longius inter se distant, falsum est; nam 1 ad 2 majorem habet rationem quam 1 ad 4 cum tamen termini 1 & 4 longius inter se distent quam 1 & 2. Quod etiam vidit *VVallisius*. Rursus *Meybomius* reprehendit Definitionem *Eucl. Elem. 5. 6.* ut falsum; non rectè; poterat tamen ut non definitionem; nam potest demonstrari.

B. Et demonstravit *Hobbius*.

A. Vidisti jam quam sunt naturæ Rationum de qua litigant ambo ignari.

B. Reliqua ergo ne examines. Attuli autem mecum alterum illum librum ejus de *Angulo Contactus*, de *Sectionibus Conicis*, & de *Arithmetica Infinitorum*, ut cum perlegeris excutiamus sicut hunc.

A. Libet autem antequam discedas videre utrum rectè reprehenderit *Mersennum*. *Mersennus* in *Cogitatis Physico-Mathematicis*, *Proportio* (inquit) *equalitatis*, *nibili similitudinem refert*, *Proportio majoris inequalitatis attollitur supra nihilum*. *Proportio minoris inequalitatis deprimitur infra nihilum*. Contra hæc ea quæ affert *VVallisius* continentur omnia his verbis. *Qui simplum dicit, non illo rem nullies apponi intelligit, sed semel. Et qui subduplum poni dicit, non aliquid auferri dicit, sed saltem semissem poni. Quæ satis illos quidem redarguerent qui simplum, vel semissem, vel trientem nihil esse dicerent vel quantitatem habere nullam, sed contra Mersennum qui nihil horum dicit, sed semissem, trientem &c, aliquid esse & quantitatem positivam esse concedit, nihil faciunt. Nam illius verbis, non semissem neque trientem &c, aliquid esse negatur, sed tantum semissis sive trientis &c, ad integram rationem quantitatem habere, id negatur. In legendis ergo Mathematicis non nimis est acutus.*

B. Sed nosti juxta sententiam *Wallisii*, semissem, & semissis ad totum rationem, eandem esse rem.

A. Scio. Vidimus jam in hac parte operis Mathematici, Professoris vestri quot sunt errores, scilicet plures quam censor ullus quantumvis severus in omnibus scriptis omnium Mathematicorum editis invenire potest.

B. Id quidem nescio. Verum si de omnibus simul doctrinæ partibus judicium facies, non mediocriter doctum esse existimabis. Theologus enim est, & Logicus, & Physicus, & Metaphysicus, & Politicus, & Ethicus, & Peritus Juris Romani & Anglicani. Præterea linguas novit

novit Hebræam, Arabicam, Teutonicam, Gallicam, Italicam, Ar-
moricam (quarum specimina & criticismos vidisti in hoc libro) &
præterea Symbolicam, quæ, ut lingua quædam universalis est instar
omnium.

A. Vidimus quidem videri velle hæc nosse, neque quicquam aliud
præter errores & nugas nosse.

B. Liber hic alter quem examinaturi sumus videbitur tibi fortas-
se melior. Vale.

DIALO.

(100)

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM
OF
NATURAL
HISTORY
OF
THE
CITY
OF
NEW
YORK





DIALOGUS QUINTUS.

A Bene advenis, sed te expectabam heri.

B. Venire non potui. Tu vero tanto plus habuisti otii librum quem tecum reliqui perlegendi.

A. Perlegi, nisi quod tractatus de *Sectionibus Conicis* Capita aliquot quæ symbolis nimium impedita erant transilui; & tractatus de *Arithmetica Infinitorum*, cum Capita prima & reliquorum omnium fundamenta falsa esse invenissem, cætera legi quidem sed examinare nolui. Capite primo de Angulo contactus occasio declaratur controversiæ de natura ejus inter Clavium & Peletarium, nempe *Pr. 16. Ele. 3.* Euclidis, una cum demonstratione ejusdem. Propositio quidem Græcè & Latine (Græcè in eorum forte gratiam qui Latine nesciunt) Demonstratio Latine tantum repetitur. In secundo controversiam illam ostendit diremptam ab Euclide non esse. Nec mirum, Euclides enim de futura super verbis ejus tanto post tempore inter Peletarium & Clavium controversia ne sonniavit quidem. Capite tertio controversiam intimius (ut ille parum latine loquitur) aggreditur; Anguli plani definitionem afferens hanc, *Angulus* (inquit) *planus est mutua κλίσις, seu inclinatio duarum linearum in plano sese tangentium & non in directum positarum.*

B. Definitio quidem Euclidis est, sed Anguli plani natura ubi explicatur.

A. In ipsa definitione.

B. At non agnosco; nam repugnat iis quæ idem scripsit Euclides *Def. 5. Elem. 11.* Ibi enim definit *recta linea ad planum inclinationem item plani ad planum inclinationem esse Angulum acutum.* Cum ergo omnis inclinatio ad planum, sit inclinatio ad lineam in plano, erit (per hanc definitionem) omnis Angulus Acutus.

A. Sed non videtur vox *Inclinatio* eodem sensu accipienda esse hic atque in *Elem. 11.* Scias ergo nonnullos esse qui etsi a positis Principiis nunquam non rectè Ratiocinentur, ipsa tamen Principia non satis feliciter semper ponunt. Oportuit prius definitum esse quid sit In-

clinatio quam per *Inclinationem* definiisset Angulum planum! Quod enim non fecerit in causa fuit quod *Wallisius* frustra se torserit in vocibus *κλίσις* & *ἀκλίσια*. Sapiat enim definitio Euclidea plus quam satis de vulgi imaginatione Anguli, cum dicant hoc vel illud *non factum esse in Angulo*. Sic quoque accipit *Clavius*, cum contra *Peletarium* disputans, Angulum rectum maiorem esse dicit quam est Angulus semi-circuli, ut totum quam pars; deceptus eo quod superficies aliqua intercipi videtur inter Arcum & Tangentem. Itaque naturam Anguli vulgi more, in arcta quâdam superficie consistere arbitrabatur. Quod est falsum.

B. Imo vero adeo absurdum, ut nemo illud unquam apertè dicere ausus sit; quanquam inhærente illa falsa imaginatione id dixerint ex quo inferri possit.

A. Audiamus *VVallisium*. [Et quidem ipse lineæ concurrentes quamvis totæ forsan inclinentur ad invicem, Angulum tamen non alibi quam in ipso puncto concursus formant.] Nonne hinc sequitur ipsa puncta formare Angulum?

B. Planè. Et siquidem punctum sit (ut vult *VVallisius*) nihil, duo nihila formabunt Angulum.

A. Videntur mihi duæ lineæ etiamsi non concurrant, si tamen eadem regula qua generantur productæ concursuræ sint, Angulum efficere.

B. Hoc quomodo sit possibile vix intelligam, nisi sciero quis sit quem tu appellas Angulum.

A. Angulum simpliciter (excluso Angulo Contactus) appello lineæ quæ Circulum describit conversionis totius portionem. Anguli autem quantitatem, quantitatem arcus quolibet tempore descripti. Itaque qui dicunt Angulum duabus rectis e centro contineri, non superficiem, sed arcum contineri intelligunt, vel intelligere debent.

B. Ita quidem censeo, nec *Wallisius* aliter sentire potest, quicquid tuende existimationis causa dixerit in contrarium.

A. Itaque Angulum contactus Angulum simpliciter dictum non esse ex eo probandum erat quod recta circulum tangens nullum abscindit arcum, *VVallisius* autem hoc partim ex *Pelitario*, partim ipse, ex eo probare vult, Capite 4, quod lineæ illæ non sunt una ad alteram inclinatæ, quamquam quid sit Inclinatione adhuc nesciatur. Inclinationem autem in Angulo contactus nullam esse, satis quidem, sed operationibus a motu circulari deductis tandem demonstrat. Ex quo nihil aliud efficitur præterquam quod Angulus contactus non sit Angulo simpliciter dicto Homogeneus. Quod quidem verum est, ut tamen verum quoque sit quod Angulus Contactus sit verus Angulus, idemque Quantus. Capite 5, idem probat *Pelitarus* ex prop. 1. Elem. 10. Sed Angulum

angulum omnino non esse aut nullam habere quantitatem non probat. Cap. 6. respondetur Argumenta ad Clavii. Ego (dicit Clavius) Angulos illos ejusdem esse generis negavi hac solum de causa, quod Angulus contactus quantumvis multiplicatus Angulum acutum rectilineum superare nequeat. Quod quidem argumentum firmum esset, si modo Angulus Contactus esset Angulo rectilineo Homogeneus. Est ergo Homogeneus aut nullus. Nullum esse respondet *VVallisius*. Quorsum igitur dicitur Angulus contactus, potius quam punctum contactus? Sed neque ille nullum esse demonstravit, sed tantum nullum rectilineum. Quod autem Angulus contactus Angulus sit, & quantus, verum Heterogeneus, post demonstrabitur. Rursus Clavius, ut Angulus planus efficiatur, sufficit (inquit) duas lineas in plano ad invicem inclinari, non autem requiri ut se mutuo secant, Quod *VVallisius* non negat, inclinari negat. Quid autem est inclinatio si duæ lineæ tunc non inclinantur ad se invicem, cum a diversis regionibus utraq; concurrunt ad idem punctum? At Inclinatio in definitione Anguli non sumitur ut in Elemento 11, pro Angulo rectilineo acuto, ita ut Angulus præter acutum nullus sit.

B. Quin arcus & tangens ad se inclinentur dubitari non debet. Non ergo solvit argumentum Clavii.

A. Atqui hæc sunt præcipue quæ disputantur Cap. 6. ubi neuter ob ignorationem naturæ Angulorum veritatem constanter tenet, sed modo hic, modo ille incidit in absurda. Capite 7. probare conatur *Wallisius* Anguli simpliciter & Anguli contactus *dyversitatem*. [Primo (inquit) quæ mutuo possunt vel addi vel auferri ea non sunt heterogenea. Conceditur. At Angulus contactus (siquidem sit Angulus) & recto auferri potest ut maneat Angulus semicirculi internus, & recto adjungi potest ut fiat Angulus semicirculi externus.] Percepistin' hujus argumenti vim?

B. Ita. Si, inquit, superficiem illam quæ se ingerit inter tangentem & arcum auferas, remanebit Angulus quem efficiunt diameter & arcus. Quod per se manifestum est, quia auferitur pars a toto.

A. Ergo per *VVallisium* uterque Angulus tam semicirculi quam contactus est superficies.

B. Id quidem quanquam sit absurdum manifestè sequitur.

A. [Secundo, duæ (inquit) quantitates quarum altera est major, altera minor sunt Homogeneæ. Conceditur. Sed Angulus contactus (siquidem sit Angulus) & Angulus quavis rectilineus ejusmodi sunt quantitates;] id est, quarum altera altera potest esse major vel minor. Negatur.

B. Sed probat ex prop. 16. Eucl. Elem. 3.

A. Nego hoc quoque. Nam per illam propositionem probatur hoc solum, intercedere inter tangentem & arcum superficiem aliquam, non autem angulum aliquem.

B. Tertio [*Angulus* (inquit) *Semicirculi ad angulum rectum rectilineum certam habet & determinatam rationem.*]

A. Conceditur.

B. Habebit ergo rationem ad reliquum, id est, ad angulum contactus.

A. Negatur. Non est enim angulus contactus pars reliqua anguli recti rectilinei, neque dempto angulo semicirculi ex angulo recto rectilineo relinquitur angulus contactus. Verum autem est dempta superficie intercedente inter diametrum & arcum, quod relinquitur superficies quæ intercedit inter arcum & tangentem; quam superficiem putavit *VValisius* esse angulum. Caput 8. Testimonium habet *D. Hen. Savilii*. Is vero Quadratum & Circulum Homogenea esse ostendit; de angulo contactus, eo loco, ne verbum quidem. Sed paulo inferius de hac re dubitasse eum faretur ipse *VValisius*. Nec si aliter sensisset, ullius apud Mathematicos qui omnia rationibus, Authoritatibus nihil pensant, momenti esset. Capite 9. Continetur primo Argumentum Peletarii deductum ex gratis assumpto Lemmate, *Angulos semicirculorum*, (id est quos faciunt diametri cum semiperimetris) *esse æquales*. Quod verissimum quidem est, sed omnino idem quod probandum erat. Inde autem demonstrare, quod angulus contactus non habet quanti ateri, impossibile est. Sequitur quidem inde angulum contactus nullam partem esse anguli qui continetur a Diametro & Circumferentia, non autem quod non habet suam sibi quantitatem; nec quod angulus contactus unus altero non possit esse vel major, vel minor, vel æqualis. Ea autem quæ per Lemma suum tria enuntiantur, non sunt de angulo contactus, sed de ipso contactu; quasi essent qui ipsum contactum angulum esse dicerent.

B. Sed per contactum intelligi vu't contactus angulum.

A. Credo. Sed quod non loquutus sit accuratè in causâ erat quod naturam anguli non perspexerit. Verum lemma illud Peletarii Cap. 10. demonstrare frustra conatur *VValisius*. Nam etsi verissimum sit, tamen nisi ex definitione anguli simpliciter dicti, sive rectilinei, demonstrari non potest.

B. Quomodo autem lemma illud demonstrabis tu?

A. Quantitas anguli rectilinei (per definitionem meam) est quantitas quam habet arcus interceptus inter duos radios comparata ad quantitatem totius perimetri. Sed angulus factus inter Diametrum & tangentem nullum intercipit arcum. Est ergo quantitas anguli contactus, nulla pars quantitatis anguli rectilinei. Quare arcus semicirculi solus absque angulo contactus rectus est.

B. Si angulus contactus nulla pars sit ejus qui efficitur a Tangente & Diametro, quare dicitur angulus? & quomodo dici potest quantus?

A.

A. Dicitur angulus, quia formatur a duabus lineis in communi puncto concurrentibus. Quantum dicitur propterea quod unius anguli contactus quantitas, potest esse vel major vel minor quam quantitas alterius. In quinque paginis quæ faciunt Cap. 10. ad probandum quod angulus semicirculi est rectus, affert sex demonstrationes, quarum ne una quidem satis firma est; ideoque Caput undecimum totum occupat objectio contra Cap. 10. & ad objectionem responsio. Quod non fuisset necessarium, si fuissent legitimæ demonstrationes ejus. Elige quamlibet & quam putas firmissimam.

B. Eligo quartam, ubi cum angulum constituisset in semicirculo rectum ABC , supponit AB super terminum Diametri moveri circulariter ad terminum oppositum. Quanto ergo eo motu minuitur perpetuo angulus ad A , tanto augetur angulus ad C . Itaque angulus in circumferentia perpetuo servatur rectus, quare & rectus erit quando AB est in ipso Diametro in C . Itaque angulus semicirculi in C erit rectus.



A. Ita quidem, cujus crus alterum semicirculum tangat in C . Sed si crus alterum sit arcus, non est necesse, non inquam necesse est propter vim hujus demonstrationis, nisi & angulus factus ab AB & arcu BC sit etiam rectus; quod, quamquam verum sit *Clavius* non concedet. Capitibus

12 & 13 Argumenta quæ adducit, nihil amplius probant quam quod angulus contactus anguli rectilinei non est pars. Quod non negatur. Capite 14. Argumenta explicat desumpta ex optica *Vitellionis* (ut ne hujus quidem philosophiæ partis ignarus esse videretur) sed ab illis nihil aliud derivari potest præterquam quod angulus contactus angulo rectilineo nihil addit. Quod quidem fieri potest ex eo quod quantitati nihil addit non modo quantitas nulla, sed etiam quantitas Heterogenea. Postremo, Cap. 15. respondet ad *Clavii* quædam Corollaria. Quorum unum est, quod potest aliqua quantitas continue & infinite augeri, & tamen augmentum illius quantumcunque minus semper erit decremento hujus. Quod quidem eo sensu quem hoc loco habere debet, dictum est planè absurdum. Alterum, transiri posse a minore ad majus vel contra, & per omnia media nec tamen per æquale. Quod est absurdissimum. Hicne fuit qui adeo superbe insultaverat *Jos. Scaligero*, quod dixerat latera 12 Dodecagoni majora esse Perimetro circuli circumscripti; quod quidem absurdum erat, sed non tam, quam monstrum hoc *Clavii*, propter quod Geometriam ipsam non magni facerent homines non Geometriæ. At notat hoc non ut absurdum *Wallisius*, sed ut falsum.

B. Restat, (quoniam angulo contactus quantitatem tribuis, sed anguli

anguli rectilinei quantitati Heterogeneam) ut ostendas quare sit Heterogenea, & qua mensura quantitates duorum Angulorum contactus possint mensurari. Primo autem quid est illud esse *Homogeneousum*? Et quid est esse *Heterogeneousum*?

A. *Homogeneousæ* quantitates sunt quarum mensuræ applicari possunt una ad alteram ita ut congruant. Itaque cum linea lineæ applicari possit, & superficies superficiei; & solidum solido applicari concipi potest, erunt quantitates eorum *Homogeneousæ*. Item quia quantitas temporis per lineam mensurari potest, & linea lineæ applicari potest erit quantitas temporis quantitati lineæ *Homogeneousæ*.

B. An tempus & linea congruere inter se possunt?

A. Non. Nec id dixi, sed mensuram lineæ, & mensuram temporis quæ ambæ sunt lineæ congruere posse. Etiam Motus & Ponderis quantitates ad lineas reduci possunt, & proinde eorum quantitates *Homogeneousæ* sunt.

B. Quid ergo *Homogeneousum* non est? Nam solidum & Linea ad numeros reduci possunt; est autem numerus numero *Homogeneousus*.

A. Numerus numero, si quæ numerantur sunt *Homogeneousæ*, *Homogeneousus* est; alioqui *Heterogeneousus*, ut duæ lineæ & duæ superficies. Nisi enim numeri ex *Unis Homogeneis* consistant, ipsi *Homogenei* non sunt. Numerus enim omnium rerum est communis, et lineæ sunt numerus linearum, quadrata numerus quadratorum; fractio numerus partium. Præterea, angulus rectilineus cum angulo rectilineo congruere potest, cum possint per arcum circuli ambo mensurari; arcus autem cum arcu ejusdem circuli congruere potest. Anguli autem contactus mensura cum Anguli rectilinei mensura congruere non potest, quia angulus rectilineus non mensuratur per lineam nisi circularem; & quidem quatenus circularem, mensura autem anguli contactus est linea recta quatenus recta.

B. Quomodo id fieri potest?

A. Circulum non modo circino describi posse nosse, sed etiam continua flexione rectæ. Ut enim recta linea frangi potest in Polygonum quotvis laterum aqualium; ita flecti potest (id est, in omni parte frangi) in Polygonum laterum numero infinitorum.

B. Scio.

A. Prior generatio lineæ circularis est generatio ab initio, nulla præexistente linea recta; posterior est præexistentis rectæ mutatio in curvam circularem.

B. Ita est.

A. Sunt autem curvarum aliæ magis, aliæ minus curvæ. Itaque & curvitati omni sua est certa quantitas.

B.

B. Est.

A. Et curvitatē circulari sua certa quantitas.

B. Etiam.


A. Si quærat̃ autem duorum arcuum æqualium in diversis circulis, uter sit magis curvus, quomodo respondebitur?

B. Nescio, nisi quod mihi quidem videatur minor circulus esse magis curvus. Nam legi in Galileo quod arcus circuli, si radius esset infinitus, esset linea recta.

A. Ego vero omnium circularum perimetros, si totas spectes dico æque esse curvas; item partem perimetri unius similem parti alterius esse æque curvam; nec dissentio a Galileo. Nam si in perimetris diversorum circularum arcus sumperis æquales, magis curvus est is qui sumitur in perimetro minore. Id quod voluit Galileus. Verum si sumperis arcus proportionales æquē curvi sunt; ut quorum curvitatē oriuntur a totidem rectæ lineæ fractionibus, in partibus totidem (quæ sunt numero infinitæ) proportionalibus.

B. Manifesta hæc sunt, sed non mihi videntur satis respicere ad angulum contactus.

A. Dico igitur quantitatem anguli contactus esse quantitatem curvitatē perimetri quam contingit. Vide figuram hanc, ubi centris A & B descripti sunt duo circuli C D, C E contigui in C. Ducta autem recta C D secans circulum alterum in E, alterum in D, non modo ostendit quod similes arcus C E, C D æqualem habent curvitatē, sed etiam quod illa curvitas distributa sit in majori circulo per majorem arcum quam in minori; contra vero partem C E in minore perimetro magis curvam esse quam pars perimetri majoris, puta C F, ipsi arcui C E æqualis idque in ratione Chordæ majoris C D, ad Chordam minorem C E, id est in ratione radii A C ad radius B C.



B. Nihil clarius. Sed quid hæc ad angulum contactus?

A. Ducatur ergo tangens C G, determinabitque illa quanto arcus C E propter curvitatē suam in arcu minore magis recedit a Tangente quam arcus C D, propter curvitatē eandem in arcu majore.

B. Video reliqua. Recta a puncto contactus cum secet omnes circulos interiores transeuntes per C proportionaliter, determinabit quantitatem curvitatē arcuum æqualium in unoquoque circulo sumptorum.

torum; & proinde earum curvitarum est mensura; quæ mensura cum sit linea recta, CED, partes ejus omnes applicatæ sibi invicem æquales cum æqualibus congruent. Quare anguli contactus inter se Homogenei sunt, habentque quantitatem, & sunt angulis rectilineis Heterogenei. Perge modo.

A. Hactenus tractatus *de Angulo contactus*, quem vides ejusdem esse farina cum opere ejus Arithmetico integro.

B. Progrediamur ergo ad tractatum *de Sectionibus Conicis*, qui distinguitur in tres partes; quarum prima præmiū habet & Prop. 20. Secunda, Prop. 23. Tertia, Prop. 6. In præmiis plus promittit quam post præstat. Supponit autem Prop. 1. *planum quodlibet constari ex infinitis Parallelogrammis æqualibus quorum quidem singulorum altitudo sit totius altitudinis pars aliquota infinite parva*. Prætereo, quod si planum parallelogrammum non sit, constari ex parallelogrammis non potest. Prætereo item quod planum finitum ex infinitis parallelogrammis constari non potest. Ille autem hoc voluit constari planum ex infinitis numero parallelogrammis, idem putans esse infinita parallelogramma & infinita numero parallelogramma. Id quod notare volo hoc est, quod supponat partem aliquam aliquotam esse infinite parvam; nam est contradictio in adjecto, non minor quam si quis diceret curvam aliquam lineam esse rectam. Cum enim dicit partem aliquotam, dicit quantitatem in quantitates divisibilem perpetuo divisibiles. Si ergo pars aliquota sit infinite parva, erit illa nihil. Et quia pars aliquota ad totum est ut 1 ad numerum, erit quoque, ut nihil ad quantitatem, ita unitas ad numerum. Nonne hoc æque absurdum est ac illud *Clavii*, transiri posse a minore ad majus nec tamen per æquale? Et multo magis absurdum quam ulla aut Scaligeri conclusio aut Orontii?

B. Ita est. Neque rectè dicit Consentaneum esse hoc Geometriæ indivisibilem Cavallerii, qui per indivisibilia intelligit indivisa.

A. Falsum quoque est quod dicit planum quodlibet constari ex infinitis parallelogrammis æqualibus. Neque enim trianguli constant ex parallelogrammis, sed ex Trapezis; neque ullum aliud planum ex parallelogrammis constat præter parallelogrammum. Neque sequitur ex doctrina Cavallerii, sicut ex doctrina hac Wallisi, nullam esse cujusque plani altitudinem. Prop. ergo prima nihil egit.

B. Dicit fortasse idem sentire se quod Cavallerius, nempe esse altitudines suorum parallelogrammorum infinite parvorum non prorsus nullas, sed valde exiguas.

A. Quid ergo opus erat dicere infinite parvas, cum suffecisset dixisse non consideratum se illorum altitudines ut quantitates. Deinde

Prop.

Prop. 2, ubi demonstrare vult triangulum totum æquale esse omnibus
 pasi parallelis, supponitque triangulum divisum esse in parallelogramma
 altitudines habentia infinitè parvas; & quia illa parallelogramma
 sunt Arithmetice proportionalia, concludit (& quidem rectè) ea simul
 omnia toti triangulo esse æqualia; animadverto, quod si altitudines
 nullæ sint, ut is supponit, nulla erit proportio Arithmetica, nisi 0, 0, 0,
 0, &c, sint Arithmetice proportionales. Neque erunt parallelogram-
 ma toti triangulo æqualia; nisi infinities nihil possit esse æquale
 alicui rei; neque si per *infinite parvum* intelligit *exiguum*, necesse erat
 facere illa exigua. An in ratione Arithmetica non fuissent aut toti,
 non æqualia, si altitudines supposuisset quascunque? Tota ergo hæc
 propositio unicam habet demonstrationem, quæ poterat decuplo esse
 brevior. Itaque quæ sequuntur Prop. 3, 4, 5, 6, etsi veras habeant
 conclusiones, vitiosas continent ratiocinationes. Easdem tamen con-
 clusiones nemo non novit, nec rectè non potest, & breviter demon-
 strare. Prop. 7. præter terminorum, quibus utuntur scriptores Conici
 definitiones, unicam habet demonstrationem, & monita quædam ne
 non rectè intelligeretur, illi qui non satis accurate loquitur planè
 necessaria. Propositio quam demonstrat hæc est. *Planum con- secti-*
onem efficiens, si unum ex parallelis in cono circulis secet secundum rectam
ipsius diametro perpendicularem, etiam reliquos illi parallelos circulos
secabit secundum rectas, quæ ipsorum Diametris parallelis sunt perpen-
diculares, quæ per se perspicua, nec nova est. Hanc ergo propositio-
 nem ut non falsa continentem (quod deberi puto absentia symbolo-
 rum) dimittamus.

B. Expectabam hic ut demonstraret circulorum omnes in Cono
 perimetros perimetro basis parallelas coni totius superficiei esse æquales;
 ut antè minuta parallelogramma triangulo toti.

A. Et ego. Sed id forte oblitus prætermisit nam propter 2^{am}, A-
 rith. Infin. non potuit videre falsitatem. At Prop. 5. eadem illa methodo
 ostendit semiparabolæ planum ex infinitis constare lateribus quadra-
 torum Arithmetice proportionalium; & rectè quidem modo latus
 quadrati concedamus esse parallelogrammum.

B. Sed illud falsum est.

A. Scis autem ex falsis verum, etsi non contra ex veris falsum con-
 cludi posse. Idem eodem modo Prop. 9, probat de Conoide parabo-
 lico, quod constat ex infinito numero planorum Arithmetice propor-
 tionalium. Quod concedimus ut verum, sed non ut novum, nec hic
 demonstratum, nisi illa plana sint Cylindru i. Quod tu iterum dices
 esse falsum.

B. Quidni?

A. Propositio 10 est, quod *Pyramidoëidis Parabolici & plani per*
 Q *Axem*

Axem secantis communis sectio est parabola. Quod est falsum, nisi addat quod sectio transire debeat per angulos oppositos. Cum enim Conoidis parabolici planique per axem communis sectio sit parabola, impossibile est ut idem contingat in pyramidoide aut ulla alia figura basem habente rectilineam nempe polygonum.

A. Prop. 11. figuram exhibet aliam novam quam appellat Cuneum parabolicum, qui nihil aliud est ut mihi videtur quam simpliciter Cuneus, nimirum prisma cuius basis est parallelogrammum, acies autem linea recta. Quod quidem prisma est aggregatum Triangulorum quorum quidem bases simul omnes faciunt parallelogrammum, vertices autem lineam rectam. Quæ est figura recti domus.

B. Temerè hæc.

A. Sequuntur rursus inventa aliena. Itaque Prop. 12. ostendit quid sit *latus rectum*, sive *Parameter*, sive *juxta quam possunt ordinatim Applicatæ*. [*Parameter hæc, non uspiam (inquit) vel in coni sectione vel in ipsa Cono realiter existit, sed sola imaginatione suppletur.*] Quod est falsum, natumque ex imperitia hominis in Conicis semidocti.

B. Quænam autem est recta illa in Coni sectione realiter existens parameter?

A. Dicam. Describere parabolam (non nunc sed cum fueris apud te) & comprehende parallelogrammo, cuius unum latus tanget parabolam in vertice & faciet angulum cum Diametro. Angulum illum, ducta recta secans lineam parabolicam alicubi, dividat bifariam, & compleatur parallelogrammum, cuius unus Angulus est in vertice, alter est in linea parabolica. Erit autem parallelogrammum illud vel quadratum vel Rhombus. Hujus latus est parameter. Meditare, inquam, hoc tecum, & judica an Parameter magis sit imaginaria quam Diameter, vel alia quævis linea. Est autem ubique ut intercepta Diameter ad illam, ita illa ad ordinatim applicatam. Id quod *Wallisius* enuntiat per *Quantuplo major est vel minor &c tantuplo &c*; quæ voces *Quantuplum* & *Tantuplum* neque Latine sunt, neque quicquam significant.

B. Miror certè alienæ Latinitatis reprehensorem tam acrem, toties barbare scribentem non sensisse.

A. Fieri potest ut linguæ Latine usum aliqua ex parte labefactaverit studium nimium Linguæ Arabicæ.

B. Non puto.

A. Proximo loco quamlibet parabolam cuiuslibet cono aptari posse (puto nam obscure) demonstrat; neque enim nova res est, neque difficilis Prop. Decem hujus partis primæ reliquæ, ubi de Ellipticis & Hyperbolicis Pyramidoidibus & Cuneis, & de Elliptium & Hyperbola-

rum

rum parametrīs *imaginariis* loquitur, eodem laborant vito. Vides ergo sectiones Conicas quatenus in ipso Cono consideratas quam parum intelligit. Quod attinet ad considerationem earundem sectionum extra Conum, ea scribit quæ (quia non intelligi) reprehendi non possunt; nam Theoremata (excepto quadagesimo septimo, quod suum est & falsum) ab aliis vere demonstrata sunt, *Wallisii* autem demonstrationes propter densitatem symbolorum non apparent. Neque quicquam habent, etsi veræ essent, præter *Analyfin* alienæ *Syntheseos*. Ea igitur transilio, properans ad tractatum de *Arithmetica infinitorum*, quo nihil unquam quisquam vidit in Geometria turpius.

B. Incipiamus ergo ab Epistola Dedicatoria.

A. Non est necesse. Nihil enim continet præter ordinem suarum ipsius cogitationum quibus perductus est ad absurdam illam ejus circuli quadraturam: Neque in tractatu ipso ulterius legam quam ad prop. 41. quia priores has pro fundamento ponit omnium quæ sequuntur. Prima propositio est *Lemma* vel potius *Problema* hoc, *Si proponatur series quantitatum Arithmetice proportionalium (sive juxta naturalem numerorum consequutionem) continue crescentium, a puncto vel o (cyphra seu nibilo) inchoatarum (puta 0, 1, 2, 3, 4, &c.) propositum sit inquirere quam habet rationem earum omnium aggregatum ad aggregatum totidem maximæ æqualium.*

B. Rationem habet tota series ad numerum terminorum multiplicatum per maximum, eandem quam habet semissis ad integrum. Summa enim terminorum omnium (ut in hac serie 0, 1, 2, 3, 4,) æqualis est producto ex numero terminorum ducto in semissem maximæ. Itaque cum termini hic sint quinque & maximæ semissis 2, erit productus ex 2 in 5 æqualis 10. Est autem 10 summa terminorum omnium: idem contingeret in alia quavis progressionē Arithmetica incipiente a cyphra, ut 0, 3, 6, 9, ubi summa maximæ & minimæ id est 9 ducta in semissem numeri terminorum 2, facit 18, semissem ducti 9 in numerum terminorum 4. Geometricè etiam prebari potest, eodem Argumento quo triangulum ostenditur parallelogrammi sui esse dimidium.

A. Notissimum est. Sed non hic de veritate quaeritur conclusionis sed demonstrationis. Nam per inductionem probat. Inductio autem demonstratio non est, nisi ubi particularia omnia enumerantur, quod hic est impossibile. Itaque cum post exposita aliquot particularia subjungit, [*Et parimodo quantumlibet progrediamur, prodibit semper ratio subdupla,*] libenter velim scire, unde id scit, nisi causam proferat aut sciat quare necessario ita est. Secunda propositio eadem est cum prima (& propterea falsa, ut alio tempore ostendetur) nisi quod addit idem contingere etli numerus terminorum sit infinitus.

Q.

B.

B. Id certè falsum est. Siquidem enim numerorum termini numero infiniti essent, etiam terminus maximus solus per se infinitus esset, & summa terminorum numero infinitorum semilis esset infinitæ summæ infinities multiplicatæ.

A. Non ille primus se induit absurdis quæ circumstant contemplantæ Infinitatem. Prop. tertia hæc est, *Triangulum ad Parallelogrammum (super æqualibasi æque altum) est ut 1 ad 2.* Imo verò, non ergo, sed propter causas ab Euclide dictas Elem. 1. Prop. 41. Idem dicendum est ad Prop. 4. de Conocide parabolico, propter causas ab aliis exhibitas. Propositione quinta, eadem methodo probare vult lineam spiralem esse ad Arcum Circuli sibi respondentem ut 1 ad 2. Quod est falsum.

B. Etiam confitente *Wallisio*, qui in Scholio ad Prop. 13: per spiralem in telligere se dicit arcuum omnium infinite parvorum aggregatum.

A. Sed in propositione hac loquitur manifesto de spirali descripta ab Archimede. Propositiones ergo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sunt falsæ, ut quæ ab hac dependent. Præterea quam absurdum est lineam constantem ex infinitis numero Arcubus infinitè parvis appellare spiralem, quæ si regulariter sive regulari motu generetur, necessario erit arcus circuli. Itaque etiam propositiones 14, 15, 16, 17, 18, quæ fundantur super hanc ejus spiralis interpretationem, sunt omnes falsæ. Neque ductæ a Centro ad æquales illos exiguos arcus erunt Arithmetice proportionales. Comparata hæc ad sequentia leviuscula sunt.

B. An pejus in Geometria esse potest quàm facere spiralem constare ex arcubus circuli, iisdemque a rectis e centro interceptis Arithmetice proportionalibus, quique etiam æquales efficiunt Angulos?

A. Satis quidem absurda illa sunt; sed videamus & hæc. *Propositio 19. Lemma. [Si proponatur series quantitatum in duplicata ratione Arithmetice proportionalium (sive juxta seriem numerorum quadraticorum) continue crescentium a puncto vel o inchoatarum, puta ut 0, 1, 4, 9, 16, &c, propositum sit inquirere quam habeat illa rationem ad seriem totidem maximæ æqualium.*

Fiat inuestigatio per modum inductionis (ut in prop. 1.)

$$\text{Eritq;} \left\{ \begin{array}{l} \frac{0+1}{1+1} = \frac{1}{2} = \frac{1}{6} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \\ \frac{0+1+4}{4+4+4} = \frac{5}{12} = \frac{1}{3} + \frac{1}{12} \\ \frac{0+1+4+9}{9+9+9+9} = \frac{14}{36} = \frac{1}{3} + \frac{1}{18} \text{ \& sic deinceps.} \end{array} \right.$$

Ratio

Ratio proveniens est ubique major quam subtripla, seu $\frac{2}{3}$. Excessus autem perpetuo decrescit prout numerus terminorum augetur; puta $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$ &c, aucto nimirum fractionis denominatore, sive consequente rationis, in singulis locis numero senario (ut patet) ut sit rationis provenientis excessus supra subtriplum, ea quam habet unitas ad sextuplum numeri terminorum post 0, adeoque;

B. Permitte mihi eadem unà tecum inspicere.

A. Illud $\frac{0+1}{1+1}$ quid sunt? Fractiones an Rationes?

B. Utrumvis. Nosti enim huic scriptori eandem esse rem, Rationem & Fractionem.

A. Est ergo Fractio, & $\frac{1}{2}$ Fractio & $\frac{0+1}{1+1}$ summa earum, eademque æqualis $\frac{1}{2}$.

B. Ita.

A. Sed Fractio $\frac{1}{2}$ est nihil; ergo sola Fractio $\frac{1}{2}$ per se æqualis est fractioni $\frac{1}{2}$. Satin' hoc absurdum?

B. Ita est, sed non magis quam doctrina ejus de spirali. At fortassis $\frac{0+1}{1+1}$ unica est fractio & proinde, æqualis $\frac{1}{2}$, & illa æqualis $\frac{1}{2}$ & hæc æqualis $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$. Quid hic absurdi est?

A. Nonne vides dum copulatas quantitates pro fractione una habes facere te $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ id est $\frac{2}{2}$ æqualem $\frac{1}{2}$?

B. Video. Sed etsi ponat $\frac{0+1}{1+1}$ pro unica fractione, ponit fortasse $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ pro duabus.

A. Ego. Quomodo ergo unica ratio 3 ad 6 æqualis est duabus Rationibus 1 ad 3 & 1 ad 6, quod ille dicit, cum rationem 3 ad 6 superare dicat Rationem 1 ad 3 Ratione 1 ad 6?

B. Nonne recte?

A. Minime. Quoniam enim $\frac{3}{6}$ est Ratio 3 ad 6, eademque æqualis duabus simul Rationibus 1 ad 3, & 1 ad 6; si componantur Ratione, 1 ad 3, & 1 ad 6, erit Ratio proveniens (per illum) Rationes 3 ad 6.

B. Rectè.

A. Componuntur autem Rationes quando Rationum quantitates id est, tam Antecedentes quam Consequentes ipsarum inter se multiplicantur. Rationes ergo 1 ad 3, & 1 ad 6 compositæ faciunt Rationem 1 ad 18. Vel sic, fiat ut 1 ad 6 ita 3 ad aliam, & oritur 18. Et proinde expositis his numeris 1, 6, 18, priores duo habent Rationem 1 ad 6, & posteriores Rationem 6 ad 18, sive 1 ad 3. Quare ratio $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ æqualis est Rationi 1 ad 18. Est ergo per Wallisium eadem Ratio 3 ad 6 quæ 1 ad 18.

B.

B. Monstri simile est.

A. Similiter rationem 5 ad 12 æqualem facit Rationibus 1 ad 3, & 1 ad 12 simul sumptis; quæ duæ Rationes compositæ faciunt Rationem 1 ad 36, itaque 5 ad 12 eandem habet Rationem quam 1 ad 36:

B. Itaque quicquid ex hac operatione inferetur pro indemonstrato habendum est.

A. Inferetur autem primo, propositio sequens, nempe vicesima. [Si proponatur series quantitatum in duplicata Ratione Arithmetice proportionalium (sive juxta seriem numerorum quadraticorum continue crescentium, a puncto vel 0 inchoatarum; ratio quam habet illa ad seriem totidem maximæ æqualium, subtripulam superabit; eritque excessus, ea ratio quam habet unitas ad sextuplum numeri terminorum post 0; sive, quam habet radix quadratica termini primi post 0, ad sextuplum radices quadraticæ termini maximi.] Clarè hic loquutus est.

B. Intellego. Rationem quam habet series crescentium ad seriem totidem maximæ æqualium, majorem esse dicit, quam Ratio 1 ad 3 tanto quanto est Ratio unitatis ad sextuplum numeri terminorum post 0, hoc est (in serie, $\frac{0+1+4}{4+4+4} = \frac{5}{12}$) rationem 5 ad 12 majorem esse Ratione 1 ad 3, sive 4 ad 12 tanto quanta est ratio 1 ad 12.

A. Rectè intelligis. Est autem falsum. Nam ratio 5 ad 12 æqualis esset ambabus simul rationibus 1 ad 3, & 1 ad 12. Quæ rationes compositæ juxta definitionem Elem. 6. 5. faciunt rationem 1 ad 36. Est ergo ratio 5 ad 12 æqualis rationi 1 ad 36. Vel si inter 5 & 12 interponamus 4, ut sint tres quantitates 5, 4, 12, ratio primæ 5 ad tertiam 12, major erit ratione 4 ad 12, id est Ratione subtripla, tanto quanta est ratio 5 ad 4: Itaq; per bonum vestrum Professorem eadem est ratio 5 ad 4, & 1 ad 12.

B. Error manifestus est, & quidem major illo quem erravit in doctrina spiralium. Quod non facile credidissem.

A. Vide jam id quod inde inferit, nempe, Si series hæc quadratica esset infinita, summa crescentium ad summam totidem maximarum esset accuratè in ratione 1 ad 3. Sic enim probat, [Cum autem crescente numero terminorum, excessus ille supra Rationem subtripulam ita continuo minuat, ut tandem quovis assignabili minor evadat, (ut patet) si in infinitum procedatur prorsus evaniturus est. Adeoque, si (quæ est propositio 21) proponatur series infinita quantitatum in duplicata Ratione Arithmetice proportionalium (sive juxta seriem numerorum quadraticorum) continue crescentium, a puncto sue 0 inchoatarum; erit illa ad seriem totidem maximæ æqualium, ut 1 ad 3.]

B. Videtur sane excessum rationis si perpetuo minuat, debere tandem evanescere; saltem tam exiguum esse, ut nullius deberet esse con-

considerationis. Itaque pereunte excessu rationis supra subtriplam relinquetur præcisè subtripla.

A. Ita certè, nisi una crescerent quantitates comparatæ. Vide seriem primam $\frac{0+1}{1+1}$; nonne majorem rationem habet $0+1$ ad $1+1$ quam 1 ad 3 , id est quam ratio suptripla?

B. Ita quidem, sed ut additâ ad consequentem unitate esset subtripla.

A. Deinde vide seriem secundam $\frac{0+1+4}{4+4+4}$. Nonne ratio seriei crescentis 5 ad seriem maximarum 12 major est quam subtripla?

B. Etiam. Ita vero ut addito ad consequentem numero 3 fiat subtripla?

A. Manifestum ergo est, si procedatur in infinitum numerus crescentium major erit numero subtriplo maximarum; eritque excessus numerus major quam ut possit dici. Tantum abest ut series crescentium, quantumvis procedendo, possit esse subtripla seriei maximarum.

B. Error est manifestissimus.

A. Ex propositione hac dependent non modo omnes sequentes usque ad 39 , sed etiam omnes illæ quibus rationem determinat parabolæ & paraboloideum ad circumscripta parallelogramm.

B. Sed rationes quas assignavit veræ sunt, & a Mathematicis receptæ.

A. Vere quidem, & jamdiu circumlatæ sunt, sed sine demonstratione.

B. Demonstratæ extant ab *Hobbio* Cap. 7. Lib. de Corpore, Editione Latina. Item aliter demonstratæ in Editione Anglica, Cap. 15. Art. 2.

A. Prop. 39. [Si proponatur series quantitatum in Triplicata ratione Arithmetice proportionalium, (sive juxta seriem numerorum Cubicorum,) continue crescentium, a puncto vel o inchoatarum, (puta ut $0, 1, 8, 27, 64$, &c.)] propositum sit inquirere quam habeat illa rationem ad seriem totidem maxime equalium.]

Fiat investigatio per modum inductionis (ut in Prop. 1. & 19.)

$$\text{Eritq;} \left\{ \begin{array}{l} \frac{0+1=1}{1+1=2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \\ \frac{0+1+8=9}{8+8+8=24} = \frac{3}{8} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \\ \frac{0+1+8+27=36}{27+27+27+27=108} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} \end{array} \right. \text{Et sic deinceps.}$$

Ratio proveniens est ubique major quam subquadrupla, seu $\frac{1}{4}$. Excessus autem

autem perpetuo decrescit prout numerus terminorum augetur, puta $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64}$ &c. autio nimirum fractionis denominatore, siue consequente rationis, in singulis locis, numero quaternario, (ut patet) ut sit rationis provenientis excessus supra subquadruplam, ea quam habet unitas ad quadruplum numeri terminorum post 0, Adeoque.]

B. Eadem est methodus quæ in Prop. 19. An & iidem errores?

A. Plane iidem. Nam si $\frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ rationes sint, impossibile est ut ratio 2 ad 4, sit æqualis duabus rationibus 1 ad 4, & 1 ad 4, Nam ratio 2 ad 4 duplicata esset rationis 1 ad 4. Sed ratio 1 ad 16 duplicata est rationis 1 ad 4. Effet ergo ut 2 ad 4, ita 1 ad 16. Conclusio autem quam deducit ex hac Prop. 39. est propositio 40, nempe hæc. [Si proponatur series quantitatum in Triplicata ratione Arithmetice proportionalium (siue juxta seriem numerorum cubicorum) continue crescentium, a puncto vel 0, inchoatarum; ratio, quam habet illa ad seriem totidem maximæ æqualium subquadruplam superabit; eritque excessus, ea ratio quam habet unitas ad quadruplum numeri terminorum post 0; siue, quam habet radix cubica termini primi post 0, ad quadruplum radice cubice termini maximi.]

B. Erit, inquit, excessus rationis quam habet series crescentium ad totidem maximas, supra rationem subquadruplam, ea ratio quam habet unitas ad quadruplum numeri terminorum post 0. Id est, in hac serie $\frac{0 + 1 + 8}{8 + 8 + 8}$ ratio 9 ad 24 superabit rationem subquadruplam, & excessus erit ratio 1 ad 32.

A. Nonne ergo ratio 1 ad 32 composita cum ratione subquadrupla faciet rationem 9 ad 24.

B. Certissimè.

A. Sed ratio 1 ad 32; & ratio 6 ad 24, id est subquadrupla faciunt rationem 6 ad 768. Est ergo ut 9 ad 24 ita 6 ad 768. Vel si ponantur ordine hi numeri 9, 6, 24, ratio 6 ad 24 est subquadrupla. Superat autem ratio 9 ad 24 rationem 6 ad 24 subquadruplam, ratione 9 ad 6, Est ergo ut 9 ad 6 ita 1 ad 32. Siccine solent *γίγνεται* Professores publici?

B. Eundem errat errorem nunc & ante.

A. Deinde quod infert, [Cum autem, crescente numero terminorum, excessus ille supra rationem subquadruplam ita continuo minuatur, ut tandem quolibet assignabili minor evadat, (ut patet); si in infinitum procedatur, prorsus evaniturus est. Adeoque (quæ est propositio 41) Si proponatur series infinita quantitatum in Triplicata Ratione Arithmetice proportionalium (siue juxta seriem numerorum cubicorum) continue crescentium, a puncto seu 0 inchoatarum; erit ille ad seriem totidem maximæ æqualium, ut 1 ad 4,] falsum est. Est enim in prima serie

0 + 1

$\frac{0+1}{1+1}$ Summa crescentium major quam subquadrupla totidem maximarum, tanto quanta est semissis Unitatis. In serie secunda summa crescentium superat subquadruplam maximarum tribus unitatibus. In tertia novem Unitatibus &c. Quousque procedendum esse putas ut summa crescentium sit tandem maximarum subquadrupla.

B. Quanto plus proceditur tanto pejus. Propositio est falsa.

A. Deinde prop. 43. [*Pari (inquit) metodo invenietur ratio seriei infinite quantitatum in ratione quadruplicata, quintuplicata, sextuplicata, &c, Arithmetice proportionalium a puncto seu o inchoatarum ad seriem totidem maxime equalium, nempe in quadruplicata 1 ad 5. &c.*]

B. Falsum est; ne examines.

A. Imo vero quid afferant novi quæ sequuntur, ulcerius ne quæramus, cum ab his dependant cætera omnia.

B. Ne imaginari quidem possum quicquam quod aut *Wallisius* aut eorum ullus, qui libros ejus literis ad ipsum scriptis laudaverunt contra hæc tam perspicue demonstrata afferre possunt.

A. Extantne Geometrarum literæ quibus Geometria hæc *Wallisii* comprobatur?

B. Extant quidem (editæ ab *Wallisio*) altera *Hugenii*, altera nescio cujus, sed dicunt aliqui esse *Schootenii* vix Latina. Præterea *Robervallus*, Professor Parisiis Celeberrimus, idemque alias in demonstrationibus propriis satis cautus, chartulæ cujusdam manuscriptæ exemplaria, aliquot in Angliam transmisit, in qua doctrinam de comparatione parabolarum, & Conoideum ex illis factorum ad parallelogramma & Cylindros circumscriptos, in hoc tractatu *De Arithmetica Infinitorum*, expositam negat ab *Wallisio* primo, sed a se inventam esse asserit. Quod non fecisset nisi Doctrinam ipsam veram esse censuisset.

A. Mirandum non est si illi qui maximam operam in eo posuerunt ut rationem Arcus ad radium ad numeros reducerent, Methodum hanc Symbolicam incautè amplexi sint. Sed ut *Robervallus*, qui Geometrarum primus esse vult & ferè est (nam excipio saltem D. Fermatium) Paralogsismos tam crassos videre non potuerit, profecto mirandum est.

B. Habet hoc peculiare *Robervallus*, cum egregium quis a se inventum Theorema in publicum emiserit, ut statim distributis chartulis dicat idem a se inventum esse prius. Itaque Theorema de solido Hyperbolico inventum, a Toricellio postquam esset editum ad se rapuit; & nunc Methodum de comparatione Paraboloidæ editam

R

ab

ab *VVallisio* & solo *Wallisio* dignam suam haberi incautus petit. Idem *Hobbium* qui æqualitatem inter spiralem, & parabolicam, primus vidit, quia ipse eandem prius demonstraverat appellat Plagiarium.

B. Et merito? siquidem *Robervalli* demonstrationem ediderat ut suam.

A. Sed demonstrationem *Robervalli* negat se vidisse; sed cum convenissent Parisiis in Cænobio Minimorum, ipse, *Mersennus*, *Robervallus*, & quartus (quem non nominat) incidissetque sermo de comparatione Spiralis & Parabolicæ, videtur, inquit *Hobbins*, linea spiralis æqualis esse rectæ quæ subtendit Semiparabolam, cujusque quidem Axis, sit æqualis Semiperimetro circuli spiralem continentis; Basis autem ejusdem circuli Radio. Itaq; creta designans figuram in pariete, sic arguebat. Quoniam in Axe parabolæ, motus quo parabola generatur augeatur juxta rationem temporum duplicatam, motus autem in Base est uniformis; item quia motus quo generatur spiralis, in circulo augeatur in ratione temporum duplicata, & in Radio est Uniformis; videtur similis esse generatio unius generationi alterius; & proinde si vertex Semiparabolæ cum termino Basis connecteretur per lineam rectam, rectam illam, ut quæ eandem habet generationem, æqualem esse oportere Spirali. Quæ illatio vera non erat, sed contra conclusionem quam probare conatus est. Id cum animadvertisset *Robervallus*, recta (inquit) Semiparabolam subtendens sit a motu utroque uniformi. Itaque abjecta creta errorem agnovit *Hobbins*. At *Robervallus* postmodum eandem propositionem ad *Mersennum* demonstratam attulit. Quam tamen demonstrationem non vidit *Hobbins*, sed postea Theorema idem sua Methodo demonstravit ediditque.

A. Si ita est, inventionem illam *Hobbins* potius quam *Robervallo* adjudicarem, & hunc quam illum dicerem plagiarium. Sed quo tectorem ita esse probaveris si opus sit.

B. Quæsit *Hobbins* per epistolam a quarto illo, quem non nominavit utrum chartula illa ipsius esset *Robervalli*, necne. Is autem nescire se rescripsit cujus esset; sed paratum se testem esse, lucem & Methodum demonstrationis suæ accepisse ab *Hobbio Robervallum*. Sic enim scribit Gallice. *Je n'ay pas vu sa démonstration, mais quoy quil fasse il ne peut desnier que vous ne soyes cause quil ait trouvé cette proposition, puisque vous luy auez donné l'idée, & le suiet de la trouver, C'est ce que ie tesmoigneray tous jours;*

B. Quoniam parabolæ & Paraboloidæum cum Parallelogrammis, & Conoideum cum Cylindris comparationem, neque methodo hac *Wallisiana*, neque ab ullo alio (quanquam vulgo receptam) demonstrationibus

strationibus editis demonstratam esse dicis, age, si quam habes ejus rei demonstrationem, profer illam.

A. Proferam, puto, eamque universalem.

Describatur parallelogrammum $ABCD$ intelligaturque basis AB moveri parallela ad CD , ita ut dum movetur perpetuo decrescat donec evanescat in puncto C ; sitque ratio diminuta AB ad ipsam AB integram, ubique eademque ratio AC ad AG , vel ubique duplicata, vel triplicata, vel in alia quacunque ratione rationis ad rationem. Dum AB eo modo decrescit, punctum B describat lineam aliquam, puta $BEFC$. Dico jam, si ratio AC ad AG sit eadem quæ ratio AB ad GE , spatium $ABEFC$ esse ad spatium $ACFEB$ ut 1 ad 1 ; si vero ratio AC ad AG sit duplicata rationis AB ad GE spatium $ABEFC$ esse ad spatium $ACFEB$ ut 1 ad 2 ; si triplicata, ut 1 ad 3 ; & sic deinceps. Intellexisti?

B. Intelligo, & siquidem ita esse demonstraveris, video esse facillimum paraboloidis cujuscunque ad suum parallelogrammum, & Conoidis cujuscunque ad suum Cylindrum rationem exhibere in numeris.

A. Assumo autem primo, [quod quæ ratione Mobilis velocitas angatur eadem ratione augeri quoque spatia ab ea iisdem vel equalibus temporibus percurfa. Secundo, quod si inter duas rectas interponantur medietum Arithmetica tum Geometrica numero infinita, hæc illa magnitudine non different; saltem differentia earum minores erunt qualibet quantitate finita.]

B. Utrumque manifestum est; & potest demonstrari. Nam incipiendo a maxima extremarum major est media Arithmetica quam Geometrica; quanto autem minus inter se extremæ differunt tanto differentia inter mediam Arithmeticam & Geometricam minor est. Itaque si medietum Arithmetice tum Geometricæ ubiq; interponantur minus inter se different omni quantitate effabili.

A. Recte. Itaque in parallelogrammo $ABCD$ consipatiur latus AB moveri ad latus CD Parallelas, & movendo decrescere donec tandem evanescat in puncto C , & per talem motum descripta sit figura $ABEFC$, relicto complemento $DCFEB$, cujus linea $BEFC$ describitur a termino B decrescens AB . Eodem autem tempore moveri intelligatur latus AC ad latus AB uniformiter; potest igitur haberi CD pro mensura Temporis; rectæ autem ipsi CD parallelæ, terminatæ ab una parte in linea $BEFC$, in altera parte in recta AC erunt mensura partium Temporis in quo AB movetur ad CD , & AC ad BD . Sumatur jam in recta CD , ad placitum punctum O , ducaturque OR parallela lateri BD secans lineam $BEFC$ in E , & rectam AB in R , Et rursus a puncto Q sumpto, in CD

arbitrarie, ducatur eidem lateri BD parallela QS secans $BEFC$ in F , & AB in S . Ducantur etiam EG , FH parallelæ CD secantes AC in G & H . Postremo idem supponatur fieri per omnia puncta lineæ $BEFC$. Habes Constructionem.

B. Habeo & teneo.

A. Dico jam esse ut aggregatum omnium velocitatum quibus describuntur rectæ QF , OE , DB , cæteræque omnes eadem Methodo genitæ, ad aggregatum rationum Temporum designatorum per rectas HF , GE , AB , & cæteras, ita planum $DCFE$ ad planum $ABEFC$. Sicut enim AB decrecendo per lineam $BEFC$ in Tempore CD , evanescit in punctum C , ita CD (ipsi AB æqualis) decrecendo per eandem lineam $CFEB$ eodem Tempore evanescit in punctum B , descripta recta DB æquali AC . Sunt ergo velocitates quibus describuntur AC & DB inter se æquales. Rursus quoniam eodem Tempore quo punctum O describit rectam OE , eodem Tempore punctum R describit rectam RE , erit OE ad RE , ut velocitas qua describitur OE , ad velocitatem qua describitur RE . Et propter eandem causam QF erit ad SF ut velocitas qua describitur QF ad velocitatem qua describitur SF ; & sic de cæteris omnibus rectis rectæ DB parallelis. Ut ergo rectæ quæ sunt parallelæ lateri AB , terminanturque in linea $BEFC$ sunt mensuræ Temporum; ita rectæ quæ sunt parallelæ lateri BD , terminanturque in eadem linea $BEFC$, sunt mensuræ velocitatum. Nam concessum est, in qua ratione augentur velocitates, in eadem augeri rectas eodem Tempore percursas, id est, rectas QF , OE , BD , &c.

B. Verum est.

A. Jam lineæ illæ omnes QF , OE , BD , &c. constituunt planum $DBEFC$, & lineæ omnes HF , GE , AB &c. constituunt planum $ACFE$. Quarum illæ sunt aggregatum velocitatum, hæ aggregatum Temporum. Ut igitur aggregatum velocitatum ad aggregatum temporum, ita Complementum $DBEFC$ ad figuram $ABEFC$. Siquidem ergo rationes DB ad OE & OE ad QF fuerint ubique rationum AB ad GE , & GE ad HF (exempli causa) triplicatæ, erunt vice versa rationes OE , ad DB , & QF ad OE , rationum GE ad AB , & HF ad GE subtriplicate. Quare aggregatum omnium QF , OE , BD &c. aggregati omnium HF , GE , AB , &c. erit (per assumptum secundum) subtriplum. Ut ergo aggregatum velocitatum ad aggregatum Temporum quibus describuntur figura deficiens & Complementum, ita erit ipsum Complementum ad figuram ipsam, nimirum complementum $DBEFC$ ad figuram $ABEFC$ quod erat Demonstrandum.

B. Sequitur hinc quod cum in Triangulis basis decrefcit in ratione Temporum, parallelogrammum erit fui Trianguli duplum; cumque basis femiparabolæ decrefcit in ratione Temporum duplicata erit parallelogrammum fuæ parabolæ feſquialterum, ut & Cylindrus fui Conoidis parabolici duplum; cum item basis paraboloidis cubici ſive parabolæſtri primi, decrefcit in ratione Temporum triplicata, erit parallelogrammum fui parabolæſtri primi ſeſquicertium; & Cylindrus fui Coni triplum; & parallelepipedum fui pyramidis triplum. Et ſit de cæteris figuris, prout poſtulant rationes juxta quas generantur.

B. Itaq; Theorema hoc univerſale nempe [*in omni figura generata per motum quanti decreſcentis donec evaneſcat in punctum, ſecundum quamlibet rationem conſtantem ab initio motus ad finem, Rationem figuræ factæ ad complementum ejus, id eſt ad id quo figura facta ſuperatur ab ea figura quæ facta eſſet ſi Quantum Generans manſiſſet integrum, eam eſſe quam habet ratio reliqui ad reliquum ad Rationem ablati ad ablatum,*] Ideoque ubi reliquum ad reliquum eſt in ratione ablati ad ablatum duplicata vel triplicata &c. ibi figuram factam ad complementum eſſe duplum, triplum &c. reſpective; Theorema (inquam) hoc habet claritudinem per ſe tantam ſerè ut poſſit haberi pro Axiomate, atque ob hanc fortæſſe cauſam, veritatem a tot Geometris agnitam fuiſſe, etſi a nemine hætenus demonſtratam.

A. Itaque *Vallifius* qui nil tam difficile eſſe arbitratus eſt quin per artem Analyticam inveniri & ſolvi poſſet, artemque Analyticam nihil aliud eſſe quam vocabulorum & orationis loco, notis quibuſdam novis (quæ vocant ſymbola) Ratiocinationis ſuæ veſtigia pingere, Theoremata hæc, aliaque difficiliora, quæ ut certa jam ludum circumferebatur, nova a ſe methodo demonſtrata eſſe opinatus eſt. Et quia videbat (cum omnibus) in progreſſione numerorum a Cyphra ſine o, ſummam numerorum progredientium dimidiam eſſe ſummæ numeri maximi toties ſumpti, quot ſunt termini progreſſionis, idem accidere etiam affirmavit ubi lineæ latitudinis infinite exiguæ, creſcentes a puncto, ſecundum progreſſionem eandem, conſtituent ſuperficiem qualemcunque. Quod (neſcientibus illius Encomiaſtis & nonnullis præterea Geometriæ profeſſoribus) falſum, neque niſi de Triangulis rectilineis univerſaliter pronunciandum eſt.

A. Vidisti jam Tractatus *Walliſii* tum Geometricos tum Arithmeticos nullius eſſe pretii, ut qui nullam continent veri Theorematis demonſtrationem novam; ſed vel aliorum demonſtrationes ſymbolicè (id eſt obſcurè) transcriptas; vel ſuas ipſius falſas; vel etiam aliquando, (præſertim in Tractatu de Arith. infin.) Theoremata ipſa falſa.

Judica

Judica ergo, ipse *Wallisius* & Doctrinæ *Wallisiane* comprobatores & Encomiastæ quales sunt Mathematici. Legisti etiam Elenchum ejus & vidisti quam sit refertus convitiis rusticis. Judica ergo quam necessaria conditio sit ad Theologiæ Doctoratum ut quis sit vir bonus. Convictorum causa fuit ira, sed quæ causa iræ? Nempe homines ambitiosi cupidique regnandi non modo in foro externo, sed etiam in interno, ad omne dictum vel scriptum quod cupiditati eorum adversatur illico excandescunt; & (siquidem audent) maledictis onerant. Causa autem ignorantiz est parum quod scientias non ipsarum amore, sed lucri causa adeunt ut stipendia mereantur; maxime vero quod scientiam non in rerum ipsarum Imaginibus, sed in verbis Magistrorum querunt, iisque non semper intellectis. Itaque Principia ignorantes, id est naturam Puncti, Lineæ, Anguli, Rationis nescientes, in absurda quæ recensuimus delapsi sunt.

B. Sic puto.

A. Accessit quoque scientiis damnosa illa multitudo Symbolorum, quorum fiducia attentionem ad rerum ipsarum Ideas remiserunt, quæ inventa ad leniendum nobilium adolescentulorum in querendis Problematum Arithmeticonum solutionibus molestiam, adeo visa est res elegans, ut nihil esse neq; in Arithmetica, neq; in Geometria tam difficile videretur quod ope Symbolorum solvi non posset. Itaq; omnes laudare & magnificere scientiam quandam quam nominarunt *Symbolicam*; etiam homines quibus nihil videbatur ad eminentiam deesse præterquam ut docti essent in Mathematicis, Magistris usi sunt Symbolicis, frustra. Verum sicut sine suspicionis criminis nemo fit inexpectatè & repentine dives, ita nemo nullo modo sine magno studio & labore fiet doctus.

B. Parumne prodest ad solutionem problematum Mathematicorum ars Analytica, & ad Analyticam usus symbolorum?

A. Imo multum. Sed quid hoc ad nuper introducta Symbola? Literæ A, B, C, &c, quibus solis usi sunt Geometrz veteres, nonne sunt Symbola? Plura autem sæpius *εργασίη* quam adjuvant. Quod autem Analytin attinet, non minus apparet in scriptis *Euclidis*, *Archimedis*, *Apollonii* aliorumque antiquorum, quam *Viète*, *Oughtredi*, & cæterorum *Algebraistarum*. Quid enim est Analytica hæc recentium?

B. Est ars qua a quesiti suppositione pervenitur per consequentias ad vera Naturæ ordine priora. Et Synthetica, qua reciproce a veris prioribus venit ad quesiti Conclusionem.


A. *Euclides* ergo & cæteri antiqui ea perpetuo usi sunt. Quid enim, cum apud illos Theorema legis quod incipit a Si, nonne vox illa Si denotat aliquid esse suppositum, exempli gratia æqualitatem angulorum,

rum, unde per consequentias venit ad aliquod prius quæ est æqualitas laterum? Hæc autem est *Analysis*. Deinde reciproce ex æqualitate laterum concluditur æqualitas angulorum, quod ante erat quæsitum; quæ est *Synthesis*. Itaque ne crede symbolicam hanc hodiernam veteribus in usu fuisse, aut omnino cognitam, neque, ut quidam nimium astuti homines dixerunt (nescio quam ab causam) dissimulatam. Sed *Wallisio* laudatoribusque ejus nunc amissis, convertamur ad alia.

DIALO-

There is a great deal of
information to be gathered
from the study of the
history of the country
and the people. It is
important to know the
past in order to understand
the present. The study of
history is not only
interesting but also
useful. It helps us to
know our place in the
world and to understand
the people with whom we
live. It is a subject that
should be studied by all
people. It is a subject that
is full of interest and
importance. It is a subject
that is worth studying.





Dialogus Sextus.

A.



N dimensione Circuli investiganda Methodus Arithmeticorum vulgo recepta falsa est. Salve mi B; non te prævideram.

B. Et tu salve.

A. Unde advenis.

B. ἤκω λίπον Ἀγγλείᾳ ἄλμυρον βάδιον πόντι.

A. Usus ergo es (ut videtur) navigatione adversa.

B. *Famjam castruos sidera summa putes. Famjam casuros Tartara ad ima putes.*

A. Non tam marinis quam Heliconiis aquis madescere videris. Sed unde ad mare?

B. Parisiis.

A. Gaudeo saluum te rediisse atq; etiam hilarem. At quid istinc adfers novi?

B. Reges, aiunt—.

A. Noli de Regibus mihi, Loquere de iis rebus quæ pertinere possunt ad te & me.

B. Nuntio ergo tibi, inventam esse quadraturam Circuli.

A. Papæ! a quo?

B. Inventam dico, non ediram. Nam siquidem nemo ante primum diem mensis Octobris proximi (in quem diem circa eam rem indictum est Geometris, proposito præmio, certamen) demonstrationem ejus invenerit, is qui præmium proposuit ipse a se inventam publici juris faciet.

S

A. Loqueris

A. Loqueris, credo, de quaesitis circa Cycloidem, nimirum, *Quanam sit data partis ejus magnitudo, & quod Centrum gravitatis. Item quae sit solidi magnitudo & Centrum gravitatis facti ex data partis revolutione, sive circa Cycloidis Basem, sive circa Diametrum Circuli genitoris; sine ulla quadraturae Circuli mentione.*

B. Sed qui ista problemata omnia solverit, nonne Centrum gravitatis etiam Circuli genitoris idem exhibebit? Eo dato, quin dimensio Circuli innotescat quid impedit? Adde, quod vera Cyclois, nisi cognita perimetri Circuli magnitudine, id est, ratione quam habet ad suam Diametrum, ne describi quidem potest. *Describitur enim Cyclois a puncto Circuli genitoris & diametri communi, moto super lineam rectam in plano existentem cui Diameter est erecta, per motum compositum ex motu Circulari per peripheriam. & motu recto Centri uniformi, & aequè veloci.* Fit igitur ut Circulus, una facta revolutione, rectam describat in plano, suae perimetrio aequalem; ut videre est in revolutione cujuslibet rotæ. Dum ergo perimetri longitudo justa ignoratur, neque vera Cyclois describi, neque Centrum gravitatis ipsius (multo minus partium ejus) exhiberi potest.

A. Quod Centrum gravitatis Cycloidis sit in linea recta Basi Parallela, ita secante Diametrum Circuli genitoris, ut pars major sit ad minorem ut 7 ad 5, demonstrari potest, etiam si magnitudo perimetri sit incognita. Etiam demonstrari potest Centrum gravitatis ejusdem esse in linea recta, ita secante Basem ipsius ad angulos rectos, ut pars major ad minorem iterum sit ut 7 ad 5. Duæ ergo Diametri gravitatis inventæ sunt. Sed illæ se mutuo secant in gravitatis Centro. Nonne ergo datur Centrum ipsum?

B. Minime. Nam lineam non datam secare in datas partes non potes. Etsi enim motus uterque (rectus & circularis) uniformis sit, si tamen aequè veloces non sint, facient compositi talem motum, ut partes rectæ lineæ super planum a Circulo designatæ, sint partibus perimetri eodem tempore percursis proportionales quidem, verum non æquales; id quod in vera Cycloide requirendum est.

A. Recte dicis. Expectabimus ergo Circuli quadraturam, non illam veræ propinquam Arithmeticorum, sed in lineis vel numeris calculo exactissimo demonstratam. Sed quis est certaminis hujus institutor Hercules Mathematicus?

B. Nescio sane. Sed propositum præmium intuenti videtur mihi, quisquis est, non esse e numero Professorum.

B. Sed cur non ad certamen hoc accessisti tu?

A. Ut dicam quod res est, problemata illa ante diem præstitutum non potui omnia solvere; sunt enim difficillima, Quoniam autem dignissima

ea judicavi in quibus exercerer, quantum potui animum ad ea applicui. Sed cum non viderer mihi quicquam proficere posse sine cognitione magnitudinis Arcus Circuli, meditationes meæ primæ in ea investiganda consumptæ sunt; & Theorematum aliquot Cyclometricorum demonstrationes (ut mihi videntur) faciles & perspicuas jam scriptas habeo.

B. Licetne mihi eas videre?

A. Imo vero, nisi improbum esset, ultro te rogarem, ut illas velles examinare.

B. Quid improbum? Ego vero ad te venio tibi vacaturus, & si quid vis, operam meam, quantulacumque ea sit, oblaturus; sed ea lege, ut si quid reprehendero, quanquam etiam inepte, æquo animo id feras.

A. Bene ne dicis. Et malo errata mea à te minime maledico monstrari mihi, quam ab inimicis cum convicio exprobrari.

B. Profer quæ scripsisti.

A. En Lege, adhibens figuram primam.

B. Hanc dicis lineosam?

A. Ne metue. Nam cum multis ea inserviat demonstrationibus, brevitate ipsa perspicuis, fiet ut multitudo linearum paulatim tibi familiaris facta molesta futura non sit.

Prop. I.

Si ad Arcum quadrantis Circuli, & ejusdem Radium, assumatur tertia proportionalis; & ab ea tertia, ut radio, describatur rursus Arcus quadrantis; erit is Arcus æqualis Radio quadrantis prioris.

Fig. 1. Describatur quadratum ABCD, & Centro D, describatur Arcus quadrantis AEC, quem secet Diagonalis BD in E. Secet & diagonalis AC arcum BD in L, supponaturque in recta BC producta, sumptam BF æqualem esse arcui AEC, jungaturque AF, secans DC in G. Erit ergo (propter similitudinem triangulorum FBA, ADG) ut FB ad AB, id est, ad AD, ita AD ad DG, & propterea erunt BF, AB, DG, continue proportionales. Centro D, intervallo DG, describatur arcus quadrantis GHI, secans Diagonalem BD in H. Dico arcum GHI esse æqualem Radio AB. Quoniam enim FB, AD, DG sunt continue proportionales, etiam illarum æquales, nimirum arcus AEC, Radius DE, & recta DH sunt continue proportionales. Ut ergo arcus AEC ad DE, ita est DE ad DH. Sed ut arcus AEC ad DE, ita est arcus GHI ad DH. Est ergo arcus GHI æqualis rectæ DE, id est, Radio arcus AEC. Quod erat demonstrandum.

A. Qualis tibi videtur hæc demonstratio?

B. Proba & perspicua. Procedo ad cætera.

Definitio

Recta quæ ad Arcum quadrantis & Radium totius Circuli est tertia proportionalis; sive Recta, a qua descriptus arcus quadrantis æqualis est Radio totius circuli appelletur Z.

Confectarium. Radius quadrantis, cujus quidem arcus æqualis sit rectæ BO sive Semiradio, æqualis est dimidiæ Z. Et Radius arcus quadrantis, qui quidem arcus æqualis sit duabus tertiis Rectæ AB, æqualis est duabus tertiis ejusdem Z. Et sic per omnes proportionēs.

Prop. 2.

Dividatur quadratum ABCD in quatuor quadrata æqualia a rectis MN, OP (quæ secabunt se mutuo ad angulos rectos in centro totius quadrati ad Q) junganturq; AO, BN secantes se mutuo in V. Dico angulum AVB esse rectum.

Cum enim trianguła ABO, NMB, sint similia, erunt anguli ad A & N æquales. Equales item erunt anguli ad O & B. Sed in triangulis ABO, AVB angulus ad A est communis, & angulus ABV æqualis angulo AOB. Quare angulus reliquus AVB, æqualis est reliquo ABD; id est rectus. Quod erat demonstrandum.

Confectarium. Punctum V est in arcu AEC; producta enim recta BN abscinder in producta AD, duplam ipsius AD. Idem autem faciet arcus AEC continuatus in Semicirculum. Erit ergo angulus AVB (qui ostensus est rectus) in semicirculo. Et proinde punctum V est in arcu AEC.

Prop. 3.

Continuetur arcus BD usq; ad productam BA in K; & rectæ MN apponatur in directum NS æqualis semiradio; junctaq; KQ producat, secans arcum BD in R, & rectam BC in T. Jungaturq; BS. Dico BS transfiguram esse per R.

Sunt enim trianguła KMQ, SMB similia & æqualia. Ducta autem recta BR, erit angulus KRB (in semicirculo) rectus. Similia ergo sunt trianguła KMQ id est SMB, & KRB; Habent enim angulum KBS communem. Et propterea transit BS per punctum R. Quod erat demonstrandum.

Confectarium 1. Angulus BRQ est rectus in semicirculo.

Confectarium 2. Recta BT est $\frac{1}{2}$ Radii BC. Est enim ut KM ad MQ; id est, ut 3 ad 1, ita KB diameter ad BT. Quare BT est $\frac{1}{2}$ diametri KB, id est, $\frac{1}{2}$ semidiametri BC.

Confectarium 3. Q est $\frac{1}{2}$ rectæ KQ sive BS. Et BR $\frac{1}{2}$ rectæ KR. Sunt

Sunt enim similia triangu^{la} $KM\mathcal{Q}$, KBT , KRB . Cum ergo recta MB sit tertia pars rectae KM , erit $\mathcal{Q}T$ tertia pars rectae KQ sive BS ; & $BR\frac{1}{2}$ rectae KR . Et praeterea recta RT erit $\frac{1}{2}$ rectae BR . Nam similia sunt triangu^{la} KBT , BRT , propter angulum rectum ad R .

Prop. 4.

Recta BS dividit rectam $\mathcal{Q}C$ bifariam.

Secet BS rectam $\mathcal{Q}C$ in X . In triangulis BCX , SQX , anguli ad X verticales sunt aequales; anguli ad B & S alterni in parallelis BF , MS sunt etiam aequales.

Similia ergo sunt triangu^{la}. Sunt autem latera BC , QS aequalia. Quare etiam QX , XC sunt aequalia. Itaq; recta BS dividit rectam $\mathcal{Q}C$ bifariam. Quod erat demonstrandum.

Consect. Xa ducta parallela rectae BC & terminata in AB est $\frac{1}{2}$ Radii AB . Et potest BX decem quartas Radii AB .

Prop. 5.

Ut AO ad Radium AB ita est BX ad BQ , & ita BQ ad BR .

Est enim tum AB ad BO , tum BQ ad QX ut 2 ad 1. Sunt & anguli ad B & Q (triangulorum ABO , BQX) recti. Sunt ergo triangu^{la} illa similia. Quare ut AO ad AB ita BX ad BQ . Quod est primum. Rursus, quoniam in triangulis BQX , BRQ anguli ad Q & R sunt recti, & angulus ad B communis triangu^{la} illa sunt similia. Ut ergo BX ad BQ ita est BQ ad BR . Quod erat demonstrandum.

Coroll. BR est dupla QR , & BQ dupla QX .

Prop. 6.

Radi^{us} AB (sive recta QS) est media proportionalis inter BS & BR .

Quoniam enim in triangulis SMB , SQR angulus ad S est communis, & anguli ad M & R recti; triangu^{la} illa sunt similia. Quare ut BS ad BM ita est QS (sive dupla BM) ad QR , & ut BS ad duplam BM , ita QS ad duplam QR , id est ad BR . Est ergo AB sive QS media proportionalis inter BS & BR . Quod erat demonstrandum.

Prop. 7.

Recta BR aequalis est duabus quintis rectae BS .

Cum enim quadratum a QS aequale sit decem quadratis a QR , erit recta SR tripla rectae QR . Sed BR est dupla ejusdem QR . Quare BS est quintupla QR . Est ergo BS ad BR ut quintupla ad duplam, hoc est ut 5 ad 2.

S 3

Itaq;

Itaq; BR est æqualis duabus quintis totius BS. Quod erat demonstrandum.
 Coroll. Arcus quadrantis descriptus radio BS (æquali BF) nempe arcus
 FSe est ad arcum quadrantis descripti centro B, semidiametro BR, ut 5
 ad 2. Nam arcuum similibus ad suas semidiametros eadem est ratio.

Prop. 8.

Si a puncto R ducatur recta RY perpendicularis ad AB, erit RY æ-
 qualis tribus quintis Radii AB.

Nam propter angulum RYB rectum, erunt SM, RY parrallelae, & an-
 gulus BSM æqualis angulo BR Y, & per consequens, triangula BSM, BRY
 similia. Quare ut BS ad BR, id est ad $\frac{2}{5}$ ipsius BS ita est SM ad RY. Sed
 ut BS ad $\frac{2}{5}$ ipsius BS, ita est SM ad $\frac{2}{5}$ ipsius SM. Est ergo RY $\frac{3}{5}$ ipsius
 SM sive trium semiradiorum, id est $\frac{3}{5}$ duorum semiradiorum, sive ipsius
 radii AB. Est ergo RY æqualis tribus quintis radii AB. Quod erat de-
 monstrandum.

Prop. 9.

Recta BY est quinta pars Radii AB.

Est enim KQ æqualis rectæ BS, sive BF. Est ergo KQ ad BR ut 5
 ad 2; & proinde eadem KQ est ad QR ut 5 ad 1; & KR ad QR ut 6
 ad 1. Quare (propter similitudinem triangulorum KYR, KMQ) erit
 KY ad KM ut 6 ad 5, sive ut 18 ad 15. Sed KM est $\frac{1}{2}$ semiradii BM;
 ergo KY est $\frac{18}{15}$ ejusdem semiradii BM, id est $\frac{6}{5}$ Radii AB. Cum ergo
 KA sit $\frac{1}{5}$ Radii AB erit AY $\frac{1}{5}$ ejusdem AB; & BY $\frac{1}{5}$. Quod erat de-
 monstrandum.

Prop. 10.

Recta BR est media proportionalis inter BC & YV, id est $\frac{1}{5}$ ejusdem BC

Cum enim YR æqualis sit $\frac{3}{5}$ & BY æqualis $\frac{1}{5}$ radii AB, quadratum a
 BR æquale erit decem quadratis a BY, id est rectangulo sub tota BC vel
 AB, & sub $\frac{3}{5}$ ejusdem AB. Ut ergo radius BC vel AB est ad BR, ita
 est BR ad YV sive ad duas quintas radii ejusdem BC. Quod erat de-
 monstrandum.

Coroll. Intervallo B R descriptus arcus quadrantis bRc est me-
 dia proportionalis inter arcum BLD, & arcum quadrantis descripti
 semidiametro YV. Centro enim B intervallo Bf æquali YV descriptus
 arcus quadrantis fg est ad arcum BLD, id est ad arcum CA descrip-
 tum radio BC, ut BR, sive Bb ad BC; & arcus bRc ad eundem arcum
 CA ut Bb ad BC. Nam arcus similes sunt inter se ut Radii; & recta Bb
 est media proportionalis inter Bf & BC. Quare arcus bRc est medias
 proportionalis inter arcum CA & arcum descriptum Radio YV nem-
 pe arcum fg.

Itaq;

Prop. 11.

Radius BC est media proportionalis inter quintuplam dimidiæ Z, & duas quintas arcus BLD.

Supponatur quod recta aliqua, puta BF sit æqualis quintuplæ dimidiæ Z, Dico radium BC mediam esse proportionalem inter BF & duas quintas arcus BLD.

A recta BN auferatur Bd æqualis semiradio BO. Reliqua ergo dN erit majus segmentum radii BC divisi extrema & media ratione, per 13 *Eucl.* 1. 2. Subtendit ergo dN decimam partem circuli cujus radius est BC (per 14. *Eucl.* 4.) id est quintam partem semicirculi BDK, id est duas quintas quadrantis BLD. In arcu BLD applicetur recta Br æqualis IK. Est ergo arcus Br æqualis duabus quintis ipsius BLD. Semidiametro BF describatur arcus quadrantis FSe secans rectam Br productam in s. Erit ergo arcus Fs quinta pars arcus FSe; cujus duplus sit Ft. Eritq; arcus Ft duæ quintæ arcus Fe. Quoniam autem arcus quadrantis descripti a Z (per primam) est æqualis rectæ BC, erit arcus quadrantis descripti a quintupla dimidiæ Z æqualis quintuplæ rectæ BO. Quare arcus Ft est æqualis rectæ BC. Jungatur Br secans arcum CnA in n. Erit ergo recta Bn æqualis radio BC; & arcus Cn æqualis duabus quintis arcus CnA, five arcui Br. Est autem ut BF vel Br, nempe quintupla dimidiæ Z ad arcum Ft, id est ad rectam BC, id est ad rectam Bn ita recta Bn id est BC ad arcum Cv, id est ad duas quintas arcus CnA five arcus BLD. Est ergo recta BC media proportionalis inter quintuplam dimidiæ Z & duas quintas arcus BLD. Quod erat demonstrandum.

Prop. 12.

Radius BC est media proportionalis inter arcum quadrantis descripti a quintupla dimidiæ Z & duas quintas ipsius radii BC.

Supponatur quod arcus FSe sit quintuplus semiradii BO. Erit ergo recta BF quintupla dimidiæ Z. Sumatur autem recta Bb æqualis duabus quintis ipsius BF; & describatur quadrans Bbc. Erit ergo arcus bc æqualis ipsi radio BC. Sumatur etiam Bf æqualis duabus quintis radii BC. Eritq; ut arcus FSe id est quintuplus semiradius ad arcum bc, id est ad duplam BO five 2 ipsius arcus FSe, ita arcus bc id est recta BC ad duas quintas ipsius BC five ad Bf. Est ergo radius BC media proportionalis inter arcum quadrantis descripti a quintupla dimidiæ Z & duas quintas radii BC. Quod erat demonstrandum.

Prop. 13,

Prop. 13.

Ut recta BS , nempe ea quæ potest 10 semiradios, ad rectam AO , ita est recta AV ad BR five Bc , five duas quintas ipsius BS .

Cum enim idem radius BC sit media proportionalis inter BS & BR , & inter AO & AV ; erit rectangulum sub BS , BR æquale rectangulo sub AO & AV . Ut ergo BS ad AO , ita reciprocè AV ad BR . Quod erat demonstrandum.

Prop. 14.

Ut radius BC ad semissem rectæ BS , five ad BX , ita est BR ad semissem radii BC .

Quoniam enim rectæ BR , BC , BS sunt continue proportionales, erit ut BC secunda ad dimidiam BS tertiæ, id est ad BX ; ita BR prima ad dimidiam BC secundæ. Quod erat demonstrandum.

Prop. 15.

Ut radius BC ad dimidiam quintuplæ semissis Z , id est ad $\frac{1}{2} Z$, ita est $\frac{1}{2}$ arcus BLD ad semissem BC .

Sunt enim quintupla dimidiæ Z . Radius BC . $\frac{1}{2}$ arcus BLD (per 11) continue proportionales. Quare ut secunda BC ad semissem primæ, (id est ad $\frac{1}{2} Z$) ita est tertiæ; nempe $\frac{1}{2}$ Arcus BLD , ad semissem secundæ BC five ad BO . Quod erat demonstrandum.

Prop. 16.

Ut radius ad semissem arcus BLD , ita est Z ad semissem radii BC .

Sunt enim Arcus BLD . Radius BC . Z continue proportionales. Quare ut BC secunda ad dimidiam BLD primæ, ita Z tertiæ ad $\frac{1}{2} BC$ semissem secundæ. Quod erat demonstrandum.

Prop. 17.

Si centro B intervallo BV describatur arcus quadrantis hV , ducta recta hi æqualis erit rectæ Bb five duabus quintis rectæ BS .

Quoniam BT est $\frac{1}{2}$ radii AB , & YV est $\frac{1}{2}$ ejusdem radii, & angulus BYV rectus quadratum a recta BV five Bb æquale est quinque quadratis a recta BT . Quare quadratum a recta hi æquale est decem quadratis ab eadem BT . Sed recta TR est æqualis triplæ BT . Quadratum ergo a BR , id est a Bb æquale est decem quadratis a BT . Sunt ergo Bb , hi inter se æquales. Quod erat demonstrandum.

Prop. 18.

Prop. 18.

Si centro B intervallo Bk , quod sit æquale semissi rectæ AO describatur arcus quadrantis $k l$; erit recta quæ ipsum subtendit æqualis rectæ BX , sive semissi rectæ BS .

Quadratum ab AO æquale est quinq; quadratis à BO . Quare quadratum a semisse ejus Bk æquale est quinq; quadratis a dimidia BO . Et quadratum a recta kl æquale decem quadratis a dimidia BO . Sed quadratum a BX æquale est decem quadratis a Ba , id est decem quadratis a dimidia BO . Sunt ergo rectæ BX & kl inter se æquales. Quod erat demonstrandum.

Prop. 19.

Describere arcum quadrantis æqualem duabus quintis arcus BLD , & in ipso rectam semiradio BO æqualem ita accomodare ut a Diagonali BD dividatur bifariam.

Centro B intervallo Bf , quod sit æquale duabus quintis radii BC describatur quadrans Bfg . Erit ergo arcus fg æqualis duabus quintis arcus BLD . Centro eodem B , intervallo BQ describatur arcus quadrantis op secans diagonium BD in q ; Eritq; recta op (quæ secat diagonium BD in q) æqualis radio BC ; Centro B , intervallo quod sit æquale dimidiz BQ , describatur Arcus quadrantis mn . Et a punctis m & n ducantur rectæ mx , ny parallele diagonali BD secans arcum fg in x & y . Ducta ergo xy est æqualis rectæ mn . Et quia subtensa arcus quadrantis descripti radio BQ æqualis est radio AB , recta quæ subtendit arcum quadrantis descriptum dimidia BQ æqualis erit semiradio BO . Itaq; descriptus est arcus, &c. Quod erat faciendum.

Prop. 20.

Recta hi quam ostendimus (Prop. 17.) esse æqualem duabus quintis rectæ BS sive BF transit per puncta x & y .

Centro B , intervallo BN (æquali AO) describatur quadrans circuli Bac , jungaturq; ac secans arcum CuA in γ & δ , poteritque recta ac 10 semiradios, & proinde æqualis erit rectæ BF . Ducantur Bx , By & producantur ad arcum CuA . Quoniam ergo est ut recta xy , (id est duæ quartæ Radii BC) ad arcum fg duas quintas arcus CuA , ita quinq; quartæ radii BC ad quinq; quintas arcus, id est ad totum arcum CuA , erit recta quæ jungit Bx , By productas ad arcum CuA æqualis $\frac{1}{2}$ radii BC . Similiter si sumatur in recta hi pars ipsius æqualis ipsi xy , divisa item a Diagonali BD bifariam, & per

Extrema ejus puncta ducantur a puncto B duæ rectæ donec occurrant rectæ ac , erit rursus ut xy id est duæ quartæ radii BC ad hi duas quintas rectæ ac ita $\frac{2}{5}$ radii BC ad totam, ac & proinde pars ea ipsius ac quæ intercipitur a rectis ductis a puncto B , æqualis erit $\frac{2}{5}$ radii BC , id est rectæ $\gamma\delta$ quæ jungit Bx , By productas ad arcum CuA .

Rursus quoniam est ut Bx vel By (id est $\frac{2}{5}$ radii BC) ad arcum fg (id est ad $\frac{2}{5}$ arcus CuA) ita radius totus $B\gamma$ ad arcum totum CuA ; & ut eadem Bx vel By ad hi (id est ad $\frac{2}{5}$ rectæ ac) ita radius totus $B\gamma$ ad totam rectam ac , necesse est ut rectæ Bx , & By productæ incidant in puncta γ, δ . Nulla enim alia recta præter $B\gamma$ & $B\delta$ incidere potest in rectam ac , quin vel major sit radio BC , vel minor. Cum ergo recta ac transeat per puncta γ, δ , etiam recta hi transibit per x & y . Quod erat demonstrandum.

Coroll. Omnes arcus quadrantum paralleli sunt ad omnes rectas parallelas quæ ipsos secant in rectis Bx , By in ratione arcus CuA ad rectam ac , propterea quod arcus fg est $\frac{2}{5}$ arcus CuA , & hi $\frac{2}{5}$ rectæ ac sive BF .

Itaq; cum arcus OM sit semissis arcus CuA , & recta kl semissis rectæ BF , secabunt se mutuo arcus OM & recta kl in productis Bx , By .

Item quia arcus bc est media proportionalis inter arcum CuA , & arcum fg (nam recta Bb quæ potest $\frac{1}{5}$ radii BC est media proportionalis inter radium BC & rectam Bf) recta autem op (id est radius) est media proportionalis inter BF & $\frac{2}{5}$ ejusdem BF , secabunt se mutuo arcus bc & recta op , in rectis Bx & By productis.

Item quia arcus op est media proportionalis inter arcum CuA , & semissem ejusdem arcus OM , recta autem $n\zeta$ sive AO (quæ sunt ut infra ostendetur inter se æquales) media inter BF & semissem ipsius BF (nam BF potest 10 semiradios, & AO potest 5 semiradios (recta $n\zeta$ & arcus op secabunt se mutuo in productis rectis Bx & By . Et sic de cæteris.

Prop. 21.

Radi BX describatur arcus quadrantis $nX\zeta$; & erit recta $n\zeta$ quæ ipsum subrendit æqualis rectæ AO .

Est enim BX , semissis rectæ BS sive BF . Potest ergo BX sive Bn decem quartas radii BC . Tantundem potest $B\zeta$. Itaq; recta $n\zeta$ potest viginti quartas radii BC . Sed recta AO potest quinq; semiradios, id est viginti quartas Radii sive BC . Sunt ergo rectæ $n\zeta$ & AO inter se æquales. Quod in præcedente promissimus demonstrare.

Confectarium. Constat hinc rectam $n\zeta$ sive AO esse mediam proportionalem inter BF & dimidiam ejus BX vel Bn .

Prop. 22.

Prop. 22.

Recta bc quæ subtendit arcum bc æqualis est rectæ AV .

Nam BR , id est Bb , potest decem quintas Radii AB . Tantundem potest Bc . Quare recta BC potest viginti quintas Radii AB . Sed recta AV (nempe $\frac{1}{2}$ Radii AB) potest sexdecim quintas Radii AB , & IV (quæ est $\frac{1}{2}$ Radii AB) potest quatuor quintas ejusdem AB . Potest ergo AV viginti quintas Radii AB sive BC , Sumt ergo rectæ bc & AV inter se æquales. Quod erat demonstrandum.

Coroll. Recta AV est media proportionalis inter Bb & ipsius duplum; nimirum, propter triangulum rectangulum & æquicrurum bBc .

Prop. 23.

Ut semissis arcus BLD , id est arcus OM ad BQ sive rectam OM (semissem Diagonalis BD) ita est BQ sive recta OM ad Z .

Quoniam enim Radius BC est media proportionalis inter Arcum BLD & Z ; & idem Radius media proportionalis inter rectas BD & BQ , erit ut arcus BLD ad rectam BD , ita reciprocè BQ ad Z ; & proinde ut semissis arcus BLD ad semissem rectæ BD , id est ad BQ ; ita est BQ sive recta OM ad Z . Quod erat demonstrandum.

Confectarium. Recta BQ potest quinq; quorum BR potest quatuor.

Nam recta BX (quæ est semissis rectæ BF potest quinq; rectam QX . Itaq; (propter Triangula Rectangula similia BQX , BRQ) BQ potest quinq; rectam QR . Sed est dimidia BR . Quare BR potest quater QR . Potest ergo BQ quinq; quorum BR potest quatuor.

Consect. 2. Arcus op , est media proportionalis inter arcum quadrantis descriptum Radio qui æqualis sit semissi arcus CuA , & Radium. Nam Radius arcus op est media proportionalis inter semissem arcus CuA & Z , nempe radium Radii.

Prop. 24.

Z . Recta hi . Arcus fg sunt continue proportionales.

Quoniam enim Radius BC est media proportionalis tam inter arcum CuA & Z quam inter $\frac{1}{2}Z$ & arcum fg , erit ut $\frac{1}{2}Z$ ad arcum CuA , ita reciprocè Z ad arcum fg . Et quia Radius BC est etiam media proportionalis inter BF & hi , erit ut $\frac{1}{2}Z$ ad BF ita recta hi ad arcum fg , sed ut $\frac{1}{2}Z$ ad BF ita est Z ad hi ; nam utraq; ad utramq; est ut 5 ad 2 . Quare ut Z ad hi ita est hi ad arcum fg . Sunt ergo Z . Recta hi . Arcus fg , continue proportionales. Quod erat demonstrandum.

Consect. Arcus quadrantis cujuslibet descripti centro B , si secetur recta quæ sit recta hi parallela, terminata in BC & BA , & secante arcum in rectis Bx , By productis, erit ille arcus ad illam rectam in ratione non modo arcus CuA ad rectam BF , sed etiam in ratione rectæ BF ad quintuplam dimidiæ Z .

Prop. 25.

Recta Bu æqualis est semissi arcus CuA .

Nam si Bu semissi arcus CuA æqualis non sit, erit vel major eo vel minor. Et sit primo major. Sumatur ergo minor quam Bu , puta Be quæ ipsi arcui supponatur æqualis. Et centro B , intervallo Be describatur arcus quadrantis $e\theta$ secans rectas By , $B\delta$ in κ & λ . Ducaturq; per $\kappa\lambda$ recta μ secans BC , BA in ϵ & θ . Secet autem arcus $\eta\zeta$ rectas By , $B\delta$, in π & ρ , & rectas BC , BA , in σ & λ . His constructis. Erit ut arcus fg ad rectam hi , ita arcus $e\theta$ ad rectam μ . Sed arcus $e\theta$ descriptus est Radio æquali semissi arcus CuA . Quare (per coniectarium præcedentis) recta μ æqualis est arcui quadrantis descripti radio qui est æqualis dimidiæ BF , id est arcui $\eta\zeta$. Rursus quoniam arcus $\eta\zeta$ est descriptus Radio qui est æqualis dimidiæ BF , erit recta $\sigma\tau$ æqualis arcui quadrantis descripti à semissi quintuplicatæ dimidiæ Z , id est $\frac{5}{2}Z$. Est autem ut arcus $e\theta$ ad rectam μ , ita arcus $\eta\zeta$ ad rectam $\sigma\tau$. Et Ratio quidem arcus $e\theta$ ad rectam μ eadem est quæ arcus fg ad rectam hi , ratio autem arcus $\eta\zeta$ ad rectam $\sigma\tau$ eadem quæ rectæ hi ad Z , id est arcus fg ad rectam hi . Est etiam ut arcus fg ad arcum $e\theta$, ita recta hi ad μ (sive ut modo ostensum est ad arcum $\eta\zeta$). Sunt ergo arcus $e\theta$, recta μ , & recta $\sigma\tau$ continue proportionales. Quod est impossibile. Nam cum sit ut arcus $e\theta$ ad rectam μ id est ad arcum $\eta\zeta$ ita arcus $\eta\zeta$ ad rectam $\sigma\tau$, media proportionalis inter arcum $e\theta$ & rectam $\sigma\tau$, erit ea recta, quæ media est inter rectas μ & $\sigma\tau$. Non est ergo recta Bu major quam semissis arcus CuA . Eadem plane methodo ostendi potest quod recta Bu non est minor quam semissis arcus CuA . Nam si sumatur in BC major quam Bu quæ supponatur æqualis dimidio arcus CuA , & illa semidiametro, describatur arcus quadrantis, & ducatur recta per intersectiones ejus & rectarum By , $B\delta$ (quibus lineis ducendis in tantula tabula sine confusione non est locus) omnia contingent quæ prius; nisi quod antè major erat Z quàm hi nunc vero minor. Est ergo Bu nec major nec minor quam semissis arcus CuA , & proinde ipsi æqualis. Quod erat demonstrandum.

Coroll. Recta BF , quintupla dimidiæ Z , & arcus CuA sunt inter se æquales. Et Bc (sive hi) Z , & arcus fg inter se æquales.

Prop. 26.

$\frac{1}{2}$ Z & BF sunt inter se æquales.

Cum enim arcus fg . Radius. $\frac{1}{2}$ Z sint continue proportionales, erunt convertendo, Radius. Arcus $fg :: \frac{1}{2}$ Z. Radius. proportionales. Et sumpto dimidio Antecedente primo, & duplo Consequente altero, erunt Radius. Arcus $fg :: \frac{1}{2}$ Z. Duplus Radius, proportionales. Rursus quoniam recta hi five Bb . Radius. BF $::$ sunt continue proportionales, erunt convertendo, Radius. $Bb :: BF$. Radius. proportionales; sumptoq; dimidio Antecedente primo, & duplo Consequente secundo, erunt $\frac{1}{2}$ Radius. $Bb :: BF$. Duplus Radius proportionales.

In rectis BF, B ϕ sumantur B ν , B ϕ utraq; æqualis diagonio BD, eritque $\nu\phi$ æqualis duplo Radio, tangerq; arcum C μ A in medio ejus puncto. Rectam $\nu\phi$ secent productæ By, B δ in χ & ψ . Erit igitur ut $x\gamma$ (id est $\frac{1}{2}$ Radius) ad arcum fg ; ita $\frac{1}{2}$ Z ad duplum Radium, nempe ad rectam $\nu\phi$. Radio B χ describatur arcus quadrantis $\xi\omega$. Erit ergo ut $\frac{1}{2}$ Radius ad arcum fg ita $\frac{1}{2}$ Z ad arcum $\xi\omega$. Sunt ergo duplus Radius five recta $\nu\phi$ & arcus $\chi\omega$ æquales. Est ergo recta B ξ vel B ω æqualis duplæ Z. Et quia est ut $\gamma\delta$ ad B γ ita γ ad 4, erit $\chi\psi$ æqualis $\frac{1}{2}$ Z. Rursus quoniam est ut $\frac{1}{2}$ Radius ad B b , id est ad hi , ita BF ad duplum Radium, id est ad $\nu\phi$ five ad arcum $\xi\omega$, erit recta B ξ æqualis duplæ Z. Sunt ergo B b & Z inter se æquales, & prouide etiam BF & $\frac{1}{2}$ Z inter se æquales. Quod erat demonstrandum.

Coroll. 1. Manifesto hinc sequitur quod etiam arcus C μ A & $\frac{1}{2}$ Z sunt inter se æquales. Nam ostensum est in præcedentibus quod $\frac{1}{2}$ Z. BF, et arcus C μ A sunt continue proportionales.

2. Dux quintæ arcus quadrantis est media proportionalis inter Radium & duas quintas Radii. Nam ostensum est B b five FR cui æqualis est arcus fg , posse decem quintas Radii BC, & per consequens mediam esse proportionalem inter totum Radium BC & duas ipsius quintas.

Decem quadrata ab octante perimetri circuli æqualia sunt viginti quinque quadratis a quarta parte diametri, vel (quod eodem recidit) quatuor quadrata ab octante perimetri æqualia sunt decem quadratis a quarta parte diametri.

Cum enim quadratum a BF æquale sit decem quadratis a BO quarta parte diametri, erit quadratum ab arcu F ϕ æquale decem quadratis a semissi arcu C μ A, id est ab octante totius perimetri. Quia vero BF & quinta pla dimidiæ Z. sunt æquales, etiam arcus quadrantum ab illis de-

scripti sunt æquales. Sed arcus quadrantis descripti a quintupla dimidia Z est æqualis quinq; semiradiis, id est quinq; quartis diametri. Quare quadratum ejus æquale est 25 quadratis a quarta parte diametri. Itaq; decem quadrata ab octante perimetri æqualia sunt 25 quadratis a quarta parte diametri, five semiradii. Id est (quia est ut 10 ad 25, ita 4 ad 10) quatuor quadrata ab octante perimetri, five quadratum unum a quadrante perimetri, five ab arcu CⁿA æquale est decem quadratis a semiradio BO. Quod erat demonstrandum.

B. Ita certe, sed a *Josapho Scaliger* oprius quam a te. Nam & ille potentiam perimetri facit decem diametros. Quem errorem confutatum esse nosti a *Clavio*.

A. Quomodo autem confutavit?

B. Ostendens majorem esse rectam illam quæ potest decem diametros quam ea quæ numeris determinata est ab *Archimede*.

A. Videtur ergo *Scaligerum* refutasse non *Clavium*, sed *Archimedes*.

B. Parum refert uter id fecerit. Pone Radium partes habere æquales 1000000. Itaq; semiradius est 500000; quadratum ejus est 250000000000. Id decuplatum est 2500000000000. Hujus numeri Radix est 15811, &c. At qui *Archimedes* sequuti sunt quadrantem perimetri minorem esse faciunt quam 15708, &c.

A. Scio. Et nisi tibi Arithmeticos Cyclometras omnes hac in re deceptos esse: clarè ostendam. Et præterea rationem hanc perimetri ad diametrum manifestius adhuc comprobavero, sentias licet cum *Clavio* aliisq; atq; etiam cum illis (nisi mores tui id non sinant) convitiare. Interea vero vides quod, nisi hæc vera non sint, quam facile sit arcui quadrantis cujuscunq; rectam exhibere æqualem; & contra, rectam arcui quadrantis, ope rectæ B^y datæ positione. Nam omnes rectæ quæ sunt parallelæ arcui *hi*, & arcus quadrantum ipsas secantes in rectis B^x, & B^y quando opus est productis, sunt inter se æquales.

Prop. 28.

Radius AB assumpta Tangente arcus triginta graduum æqualis est rectæ BF. Ducatur A^z Secans arcus 30. grad. Jam radius AB est media proportionalis inter secantem arcus 30. graduum, & Sinum grad. 60. Eadem autem AB est media proportionalis inter arcum CⁿA & Z. Quare ut arcus CⁿA est ad Secantem grad. 30. ita est Sinus arcus 60. grad. ad Z. Est ergo etiam ut arcus CⁿA ad potentiam Secantis 30. grad. id est ad radium AB una cum dimidia Secante B^z (quæ est Tangens arcus 30. graduum) ita sinus arcus 60. graduum ad potentiam ipsius Z, id est ad radium quadrantis cujus arcus est æqualis ipsi Sinui arcus 60. graduum, una cum dimidia ipsius Z. Sed radius quadrantis cujus arcus

arcus æqualis est Sinui 60. graduum, potest $\frac{1}{2}$ Z. Quare ut arcus C μ A est ad radium AB plus Bz, ita est Sinus 60. graduum ad eam quæ potest $\frac{1}{2}$ Z una cum ipsa dimidia Z. Arcus hi secet diagonalem in 2. ducaturque 23 parallela BO secans AB in 3; eritque 23 æqualis dimidiæ Z. Nam recta Bhi id est B2 est media proportionalis in hi & $\frac{1}{2}$ hi, id est inter B3 $\frac{1}{2}$ 23 & ipsam 23. Centro 2 intervallo quod sit duplum rectæ 23 ducatur arcus circuli secans AB in μ ; eritque quadratum ab μ 2 æquale quatuor quadratis a dimidia Z, & quadratum ab μ 3 æquale tribus quadratis a dimidia Z. Est ergo μ 3 radius quadrantis, cujus arcus est æqualis Sinui 60 graduum. Est autem μ 2 radius quadrantis cujus arcus est æqualis AB. Cum ergo sit ut μ 2 ad 23, ita radius ad semiradium; & ut μ 2 ad μ 3, ita radius AB ad Sinum 60. graduum, producta μ 2 incidet in punctum O, quia BO æqualis est semiradio. Et proinde μ O erit æqualis AB; & per consequens, μ B æqualis est Sinui 60 grad. Quoniam autem anguli B23 & 3.B2 semirecti sunt æquales, etiam rectæ B2.23 sunt æquales. Est ergo recta B3 æqualis dimidiæ Z; & tota μ B (id est Sinus 60 graduum) æqualis rectæ quæ potest $\frac{1}{2}$ Z una cum dimidia Z. Quoniam ergo est ut arcus C μ A ad radium AB una cum Tangente 30 graduum, ita Sinus 60 graduum ad eam quæ potest $\frac{1}{2}$ Z una cum dimidia Z; & ostensum modo est Sinum 60 grad. æqualem esse ei quæ potest $\frac{1}{2}$ Z una cum dimidia Z, erit quoque arcus C μ A æqualis Radio AB una cum dimidia secante, sive tota Tangente 30 graduum. Sed BF (per præcedentia) æqualis est arcui C μ A. Quare radius AB assumpta Tangente arcus triginta graduum æqualis est rectæ BF. quod erar demonstrandum.

B. Videtur bene demonstratum esse, ut est certissime, si hi & Z sint æquales, id est, si vera sunt præcedentia. Sed res adeo subtilis esse videtur ut minus fidenter huic quam præcedentibus demonstrationibus assentiar.

A. Age ergo, alia methodo, omitta ista Z, clarius adhuc idem demonstrabo. En Methodum, quæ sequitur, alteram, atque etiam tertiam.

Prop. 29.

Describatur rursus (Fig. 2.) quadratum ABCD; dividaturq; a rectis MN, OP secantibus se mutuo in centro quadrati ad Q in quadrata quatuor æqualia. Ducantur idem diagonales AC, BD, quæ transibunt per Q deinde Radiis AB, BC, CD, DA describantur quatuor arcus BLD, CEA, DHP, AGC secantes rectas MN, OP, in I, K, S, T; & diagonales AC, BD, in H, L, G, E. Postremo producat AP in directum usq; ad X, ita ut AX sit æqualis duplæ MK, id est duplo Sinui recto 60 graduum. Dico ductam XD æqualem esse duplo Radio AD; & productâ

ducta XD ad BC productam in F, rectam CF æqualem esse tangenti arcus 30 graduum.

Producta enim recta SP donec occurrat producto arcui BLD in V, erit PV Sinus rectus 60 graduum. Itaq; ducta DV erit æqualis radio AB; & ducta VY parallela AD, erit æqualis semiradio; & AY æqualis PV, id est semissi totius AX. Itaq; producta DV ad AX dividetur bifariam in V. Incidet ergo DV producta in X. Est ergo XV æqualis VD, id est Radio AD; & proinde XD æqualis est duplo Radio. Quod est primum. Rursus, quoniam est ut PV Sinus rectus 60 graduum ad Radium CD, ita Radius ad secantem arcus 30 graduum, si producatur XD ad BC productam in F, erit DF ipsa secans arcus 30 graduum; & per consequens CF erit Tangens arcus 30 graduum. Quod erat demonstrandum.

Confect. 1. Recta XF est dupla rectæ BF. Nam XD est dupla Radii DC & DF est dupla CF. Quare & tota XF est dupla duarum DC, CF id est totius BF.

Confect. 2. Omnis pars rectæ XF sumpta ab X dupla est rectæ quæ ipsi parti sumptæ existens contermina ducitur rectæ BF parallela. Nam in triangulo quocunq; quæ ducuntur basi parallelæ sunt inter se ut laterum segmenta.

Prop. 30.

In triangulo rectangulo cujus Hypotenusa est laterum reliquorum unius dupla, potentia laterum sunt inter se ut 4.3.1.

Quoniam enim Hypotenusa est dupla lateris unius eorum quæ continent angulum rectum, quadratum ab Hypotenusa erit quadrati ab eodem illo latere quadruplum. Quare potentia Hypotenuse ad potentiam unius laterum reliquorum est ut 4 ad 1. Sed in triangulo rectangulo potentia Hypotenuse æqualis est duabus potentiis duorum laterum reliquorum. Quare si a potentia Hypotenuse, id est a 4 subducatur potentia lateris ejus cujus Hypotenusa est dupla, remanebit potentia lateris reliqui. Deducta autem 1, (potentia unius lateris) a 4 (potentia Hypotenuse) restant 3. Est ergo 3 potentia lateris reliqui. In triangulo igitur rectangulo cujus Hypotenusa est unius laterum reliquorum dupla, potentia laterum sunt inter se ut 4, 3, 1.

Prop. 31.

Si a puncto L quod dividit arcum BLD bifariam ducatur recta lateri CD parallela secans XD in A, erit XA æqualis diagonali AC.

Ducatur Lb sinus rectus arcus BL. Deinde ducatur recta LA parallela rectæ

rectæ XA . Præterea ducatur ΔZ ad XA perpendicularis, eritq; ΔZ æqualis rectæ bL , id est semissi diagonalis AC . Quoniam autem est ut XD ad AD ita 2 ad 1, & ita XA , ad ΔZ , erit XA dupla rectæ bL , id est æqualis diagonali AC . Quod erat demonstrandum.

Prop. 32.

Si per punctum S ducatur recta eS parallela rectæ BF secans diagonalem AC in g , & rectam XF in f , erit recta Ag æqualis rectæ XZ .

Cum enim in triangulo rectangulo AeS latus AS est duplum lateris eS , erit potentia rectæ Ae tripla potentia eS . Potest ergo Ae tres semiradios. Et quoniam angulus Aeg est rectus, & angulus eAg semirectus, etiam angulus, egA erit semirectus. Itaq; trianguli Aeg anguli ad A & g sunt æquales; quare & rectæ Ae , eg sunt æquales, quarum utriusq; potentia est 3 semiradii. Quare recta Ag quæ potest utramq;, potest 6 semiradios. Tantundem autem potest recta XZ . Est enim XA æqualis diagonali AC & proinde potest 8 semiradios, & semissis ejus ZA potest 2 semiradios, est autem angulus ad Z rectus; potest ergo XZ 6 semiradios. Sunt ergo ipsæ Ag , XZ (quæ æqualia possunt) inter se æquales. Quod erat demonstrandum.

Prop. 33.

Si fiat triangulum rectangulum cujus Hypotenusa æqualis sit duplæ diagonali AC , & latus minimum sit eidem AC æquale, poterit latus reliquum 24 semiradios.

Producatur bL ad a ita ut ba sit dupla ipsius bL , & (per consequens) æqualis diagonali AC . Centro autem a , intervallo quod sit duplum ipsius ba vel AC describitur arcus circuli secans BA in λ . Itaq; triangulum λba est rectangulum in b , & Hypotenusa λa est dupla lateris ba . Dico latus λb posse 24 semiradios. Nam diagonalis AC vel ba potest 8 semiradios. Quare dupla ejus, id est λa potest 32 semiradios. Ab latere autem 8 a 32 restant 24 semiradii pro potentia lateris λb . Itaq; si fiat triangulum rectangulum, &c. Quod erat demonstrandum.

Prop. 34.

Idem est punctum X & λ .

Secet ba latus CD in g . Quoniam ergo utraq; AL , bg est æqualis radio, erit LC (nempe excessus diagonalis supra Radium (æqualis ga (excessui item diagonalis supra Radium.) Et quoniam λa est æqualis duplæ ba , si detrahatur ab λa duplus Radius, id est XD , relinquetur dupla

U

LC

LC, five dupla *ga*. Sed *Da* pars rectæ *DF* est dupla rectæ *ga*. Nam ut *DF* ad *CF*, id est ut 2 ad 1, ita est *Da* ad *ga*. Recta ergo *XD* una cum recta *Da* est æqualis duplæ *AC*, id est rectæ *la*. Sunt ergo *Xa*, *la* inter se æquales. Est ergo *X* & *l* idem punctum. Quod erat demonstrandum.

Prop. 35.

Recta quæ potest 3 semiradios assumpta quarta parte Diagonalis, poterit 6 semiradios.

Producatur *AL* ad latus *BC* in *R*. Intersectio autem duarum rectarum *OQ* & *BR* sit in *r*. Juncta ergo *Ar* potest 3 semiradios. Nam *br* potest unum semiradium, & *Ab* duos semiradios. Producta autem *Ar* ad latus *BC* incidet in *R*. Est enim ut *Ar* quæ potest 3 semiradios ad *br* quæ potest unum semiradium, ita *AR* quæ potest 6 semiradios (nam *AB* potest 4 semiradios, & *BR* duos semiradios) ad *BR*. Sumatur jam in recta *RB* pars ejus *Rs* æqualis dimidiæ *BR*, id est quartæ parti diagonalis *AC*. Et in recta *AD* sit sumpta *At* æqualis rectæ *Ar*; jungaturq; *ts*. Jam tam *Ar* quam *At* (quarum utraq; potest 3 semiradios) potest 6 rectas *Rs*; & ipsa *Rs* unam *Rs*. Est ergo *Ar* ad *Rs* ut ea quæ potest 6 ad eam quæ potest 1. Et ut *Ar* ad *Rs* ita est utraq; simul *Ar* & *At* ad *Rs* bis sumptam. Jungatur *ts*. Si ergo *ts* transeat per *r* erunt *Rr*, & *Rs* inter se æquales; & per consequens *AR* quæ potest 12 quartas partes diagonalis *AC*, superat *Ar* quæ potest 6 quartas partes diagonalis ejusdem *AC*, tanto quanto est quarta pars diagonalis *AC*. Quod est propositum. Sin *Rr* non sit æqualis *Rs*, sumatur a puncto *R* in ipsa recta *RA* alia quædam *Ru* ipsi *Rs* æqualis; ductaq; *su* producat ad latus *AD* in *h*. Eruntq; (propter *Ab*, *Rs* parallelas) triangula *Rus*, *Auh* similia. Et quoniam latera *Rs*, *Ru* trianguli *Rus* sunt æqualia, erunt quoq; latera *Ah*, *Au* trianguli *Auh* inter se æqualia. Quod est absurdum. Nam rectæ *sb*, *st* non possunt esse parallele, quia ducuntur ambæ a puncto *s*. Itaq; cum *At*, *Ar* sint æquales, rectæ *Ab*, *Au* non possunt esse æquales. Sunt ergo *Rs* & *Rr* æquales; & per consequens *Rr* est æqualis quartæ parti diagonalis *AC*. Quare differentia inter *Ar* quæ potest 3 semiradios, & *AR* quæ potest 6 semiradios est æqualis quartæ parti diagonalis *AC*. Quod erat demonstrandum.

B. Manifestum est. Pergo ad cætera.

Prop. 36.

Ducta *XP* & producta transibit per *L*, & secabit omnes rectas parallelas rectæ *BF*, interceptaq; inter *XB* & *XF*, bitariam.

Est

Est enim ut ea quæ potest 12 semiradios (id est ut XA) ad eam quæ potest unum semiradium (id est ad AP) ita ea quæ potest 24 semiradios (id est Xb) ad eam quæ potest 2 semiradios, id est ad bL . Quoniam ergo AP & bL sunt parallelæ, & Anguli ad A & b recti, ducta XP transibit per L . Secundo quoniam XP secat AD bifariam, eadem producta secabit omnes rectas ipsi AD parallelas, quæ intercipiuntur inter XA & XD productas, bifariam. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. XL dividit arcum BLD ita ut pars una sit ad reliquam ut 1 ad 1.

Prop. 37.

Si AD divisa sit in d , ita ut Ad sit $\frac{1}{3}$ totius Ad , ducta Xd , & producta transibit per punctum S .

Quoniam enim est ut $\sqrt{12}$ ad $\sqrt{27}$ ita $\sqrt{4}$ ad $\sqrt{9}$, & ut $\sqrt{4}$ ad $\sqrt{9}$ ita $\sqrt{1}$ ad $\sqrt{\frac{1}{4}}$, erit ut $\sqrt{12}$ ad $\sqrt{27}$ ita $\sqrt{\frac{1}{4}}$ ad $\sqrt{\frac{1}{9}}$. Est autem Ad $\sqrt{1}$ Radii BC ; (nam Ad est tertia pars Radii) quare Xd producta ad eS abscindet partem ejus quæ erit $\sqrt{\frac{1}{4}}$ BC . Abscindet ergo ipsam eS ; (nam quadratum ipsius eS est æquale quartæ parti quadrati a Radio BC .) Transibit ergo Xd producta per punctum S . Quod erat demonstrandum.

Aliter.

XA est ad Xe (per constructionem) ut 2 ad 3. Item Ad est ad AP five eS (per Hypothesim) ut 2 ad 3 est ergo ut XA ad Xe , ita Ad ad eS . Ducta ergo Xd & producta transibit per S . Quod erat demonstrandum.

Confectarium 1. Xd producta ita secat arcum BLD ut pars minor sit ad reliquam ut 1 ad 2. Est enim arcus BS tertia pars totius arcus BLD .

Confect. 2. Producta eS ad XF in f , manifestum est, cum sit Ad $\frac{1}{3}$ AD , totam ef triplam esse semiradii eS ; minorem autem arcu BLD .

Confect. 3. Manifestum quoque est omnes rectas quæ sunt parallelæ AD , & interceptæ inter XB , & XF secari ab eadem Ad producta in ratione Ad ad dD , id est in ratione 1 ad 2.

Prop. 38.

Si recta Ad secetur bifariam in i , ducta Xi & producta secabit arcum BS bifariam.

Ducatur Xi & producat ad arcum BS in c secans eS in p . Quoniam ergo in triangulis XAd , XeS bases Ai , eS , interceptæ sunt parallelæ,

parallelæ, & Xi secat Aa bifariam, secabit bifariam quoq; eS , puta in p . Dividitur ergo eS bifariam in p . Dico eandem Xp productam secare arcum BS bifariam in c .

In latere BC sumatur Bo æqualis chordæ arcus BS ; & in latere AD sumatur eidem chordæ æqualis An ; ducaturq; on secans XS productam in m . A puncto autem m ducatur ad latus AB perpendicularis ml . Deinde centro n , Radio no (qui est æqualis Radio AB) ducatur arcus circuli indefinire. Quoniam jam lm (æqualis Bo) est æqualis chordæ arcus BS , erit semissis ipsius lm æqualis Sinui recto arcus graduum 15 . Arcus autem 15 graduum sumptus ab o in arcu qui describitur Radio no , æqualis est arcui 15 graduum sumpto a B in arcu BS ; & utriusq; Sinus rectus est semissis rectæ lm . Quare duo arcus, quorum alter describitur a Radio AB , alter a Radio no secabunt se mutuo in medio rectæ lm . Sed quoniam lm & eS sunt parallelæ, & ambæ terminatæ in rectis Xl , Xm , recta Xp quæ secat eS bifariam, secabit quoq; lm bifariam. Secat autem in c . Est ergo lc Sinus rectus arcus 15 graduum sumptorum in arcu BS ; & cm Sinus rectus arcus 15 graduum sumptorum in arcu descripto Radio no . Itaq; producta recta Xi dividit arcum BS bifariam. Quod erat demonstrandum.

Confectarium. Eadem methodo ostendi potest, Quod bisecta rursus Al in x , juncta Xx & producta secabit arcum Bc bifariam. Et sic perpetuò ab eodem puncto X rectæ ductæ per partes ipsius A d ortas ex bisectione, bisecabunt etiam arcum quæq; sibi respondentem.

Prop. 39.

Recta BF est æqualis arcui BLD .

Producatur recta lc ad occursum rectæ XF in a , & erit ut Al ad AD , ita lc ad la . Sed Al est sexta pars lateris AD . Ergo & lc est sexta pars rectæ la . Est ergo la æqualis 6 Sinibus rectis arcus bc , id est 6 Sinibus rectis sextæ partis arcus BLD . Est autem arcus Bc major quam Sinus suus lc . Totus igitur arcus BLD major est quam tota recta la . Similiter quia Xx producta dividit arcum Bc bifariam, Sinus rectus dimidii arcus Bc productus ad XF erit duodecuplus ejusdem Sinus. Arcus autem totus duodecuplus dimidii arcus Bc . Est autem dimidius arcus Bc , major quam Sinus suus. Quare & totus arcus BLD major est quam duodecuplus Sinus dimidii arcus Bc , id est quam Sinus dimidii arcus Bc productus ad XF . Atq; ita continet per omnes bisectiones ultiores. Omnis ergo recta parallela BF , & intercepta inter rectas XB & XF minor est quam arcus BLD . Non est ergo recta BF major quam arcus BLD . Minor autem esse non potest. Recta enim parallela ipsi BF , & intercepta inter XB , & XF quantulumcunq;

pro-

productis, major erit omnibus simul Sinubus rectis arcuum æqualium totorum ex bisectione etiam æterna. Non est ergo recta BF aut major aut minor quam arcus BLD. Restat ergo ut illi sit æqualis. Quod erat demonstrandum.

B. Absq; dubio ita est. Recta BF arcui BLD æqualis est exactissimè. Neq; quisquam, credo, est qui negabit.

A. Non videris ingenium humanum satis explorasse, qui sic credis. Homines enim ad contemptum pecuniæ nondum exculti accedunt ad scientiarum studium lucri causa. Eorum ergo interest, si volunt magnis mercedibus conduci, ut non videantur Artium quas profitentur quodquam alio esse imperitiores. Præterea quotus quisq; est qui, cum Problema aliquod ex difficultioribus solutum esse a se publice prædicaverit & deceptus fuerit, emanantem aliunde veritatem quantum potest & quamdiu color aliquis inveniri potest, ad tuendam existimationem suam suppressere non conabitur? An fœdissimos illos errores quos prioribus colloquiis in Scriptis *Wallisi* animadvertimus, confitebitur *Wallisus*? Nihil minus.

B. Tecum sentio.

A. Propositionis hujus 38 veritatem confirmabunt non nihil, & valè illustrabunt quæ nunc dicturus sum. Semidiametris AP, A d, A i, A x, describantur quadrantes, quorum arcus sint MP, k d, y i, z x. Imaginare autem dum producuntur rectæ XP, XA, una promoveri puncta A, & P, usq; ad arcum BL. Nonne ergo, cum arcus MP & BL sint æquales, & producta XP transit per L, nonne inquam rectæ X d, X i, X x, singulæ abscindent partes arcus BL ipsis A d, A i, A x, proportionales? Et quoniam arcus MP, coincidit cum arcu BL, & arcus k d, cum arcu BS, nonne cæteri quoq; arcus y i, z x coincident quoq; cum partibus arcus BL sibi æqualibus? Ex quo sequetur, ut prius rectam BF æqualem esse arcui BLD.

B. Sine dubio coincident omnes cum suis æqualibus, propterea quod congruunt in tribus punctis B, S, L. Alioqui dubitarem ne ex una parte magis extendi possent quam ex altera. Nunc autem videtur hæc ipsa etiam per se planissima demonstratio; & eadem quam scripserat *Hobbius* Cap. 20 de *Corpore*.

A. Ita est.

B. Cur ergo quod bene scripserat retractavit?

A. Confusus demonstrationibus suis non dubitavit quin idem sentiret *Archimedes*. Postea verò cognito quod discrepant inter se Methodus Geometrica sua, & *Archimedis* Arithmetica, quæ rectè scripta erant, quantum potuit ad consensum cum calculo *Archimedis* exipit detorquere. Quod cum non successit, totum illud caput induxit; & de novo rem aggressus non sensit delapsus in eosdem numeros, antequam

librum edidisset. Itaq; iterum demonstrationem suam ad verisimilitudinem revocavit, reverentia *Archimedes*. Tantum absuit ut doctos homines seculorum antecedentium parvi faceret (quod dicunt adversarii) ut veritatem ipsam propter eorum existimationem deseruerit, & penè prodiderit. Quod etiam ante eum fecit *Josephus Scaliger*, sed *ἀνικνωτέως*. Nam *Habitus* conclusionem quam abjecerat resumptam in eodem libro Anglicè edito, ut videtur (nam tacent adversarii) demonstravit.

B. De veritate conclusionis non amplius dubito. Veruntamen habeo quæ te interrogare velim pauca quadam, & (ut mihi videntur) necessaria. Primò, quæ sciam rectam BF posse decem semiradios? Ostende igitur quod recta BF composita ex Radio BC & Tangente arcus 30 graduum potest decem semiradios.

A. Demonstratio sequitur.

B. Ignosce quod respexeram, non prospexeram.

Prop. 40.

Recta BF potest decem semiradios.

Ducantur rectæ Bq, tq, quarum tq erit latus quadrati Aq, junctaq; Xq producat ad BC in μ . Producat quoq; tq ad idem latus BC in ξ . Deinde ducta qv dividat angulum $\xi q \mu$ bifariam; itaq; eadem qv producta ex parte q dividet quoq; angulum Xqt bifariam. In recta Xq sumatur qo æqualis q ξ , jungaturq; Bo quæ producta secet vq, ξq , productas in π & ρ . Sunt ergo quatuor anguli ad q, nimirum $\xi q v$, $v q \mu$, $\xi q \pi$, $\pi q o$ inter se æquales. Producat Bq utcumq; in x, eritq; angulus Bq ξ æqualis angulo $x q \mu$ (ut mox demonstrabitur. Si igitur angulo Bq ξ addatur angulus $\xi q v$, & angulo $x q \mu$ addatur angulus $v q \mu$ (ipsi $\xi q v$ æqualis) erunt anguli Bqv & xqv (anguli deinceps super rectam Bx) inter se æquales; & propterea utriq; est rectus. Itaq; similia sunt trianguula Bqv, B ξ q; & proinde anguli eqB, $\xi q v$, id est eqB, $\pi q o$ sunt inter se æquales. Est ergo angulus Xq recto minor, tanto quantus est angulus eqB, sed angulus ex BLq est recto minor tanto quantus est angulus eqB. (Nam angulus rectus Xq æqualis est utriq; simul angulo XBq, eqB.) Sunt ergo anguli XBq, XqB æquales. Quare etiam rectæ XB, Xq æquales sunt. Sed recta Xq potest 30 semiradios (potest enim Xe 27, & eq 3 semiradios). Ergo & XB potest 30 semiradios. Et quia XF est dupla BF, potest XF 40 semiradios, & BF 10 semiradios. Quod erat demonstrandum.

Restat probandum quod anguli $x q \mu$, Bq ξ . Sunt æquales. Quod sic ostendo. Quoniam angulus $\xi q \mu$ dividitur bifariam a recta qv, erit ut μv ad $v \xi$; ita μq ad ξq , id est ad qo. Dividit ergo recta Bq angulum

gulum ξq , in eandem rationem in quam recta q dividit ξq id est bifariam. Sunt igitur anguli $Bq\xi$, $Bq\sigma$ inter se æquales. Sed angulus $Bq\sigma$ æqualis est verticali suo $xq\mu$. Sunt ergo $xq\mu$, $Bq\xi$ inter se æquales, ut erat assumptum.

Aliter.

A puncto B ad rectam $X\mu$ ducatur perpendicularis, & in ea sint puncta σ, π, ρ . Est ergo angulus $Bq\sigma$ æqualis duobus angulis $\sigma q, \pi q$; & angulus $B\xi q$ æqualis duobus angulis $\xi \nu q, \xi \rho \nu$. Sunt igitur duo anguli $\xi \rho \nu$, $\xi \nu q$ æquales duobus angulis $\sigma q, \pi q$. Sed angulus $\xi \rho \nu$ æqualis est angulo πq . Quare & angulus $\xi \rho \nu$ est æqualis angulo σq . Itaq; anguli $B\nu q$, $B\pi q$ sunt æquales. Sed & anguli recti ad ξ & σ sunt æquales. Quare omnes anguli trianguli $B\xi q$ æquales sunt omnibus angulis trianguli $Bq\sigma$; sumptis maximo ad maximum, minimo ad minimum, medio ad medium. Habent autem triangula $B\nu q$, $B\pi q$ latus Bq commune. Quare etiam latera lateribus angulos æquales subtendentia sunt æqualia. Sunt ergo rectæ νq , πq æquales; & proinde angulus $B\rho \nu$ est rectus, & angulus $\xi \rho \nu$ æqualis angulo $Bq\sigma$ five $qB\xi$; & angulus σqB (id est XqB) æqualis est angulo XBq . Rectæ ergo XB & Xq sunt inter se æquales. Sed recta Xq potest 30 semiradios. Ergo & XB potest 30 semiradios. Quod erat, &c.

B. Assentior. Sed quando veniemus ad calculum Arithmeticum?

A. Paulo inferius, sed non concordabit cum modo demonstratis.

B. Mirum ergo ni quæ pro demonstratis habuimus demonstrata non sint.

A. Ne metue; nam discordia hæc apparens non nostra est erratio, sed orta a prava vel male intellecta definitione puncti atq; etiam lineæ (tanquam essent indivisibilia) quædam *concordia*, sicut ego facile, ut puto, ostensurus sum.

Prop. 41.

Linea omnis recta comparata cum curva consideranda est ut habens latitudinem. Centro A radio Aq ducatur arcus $q\sigma$ secans AD productum in σ , jungiturq; $X\sigma$, &c. Quoniam ergo XA potest 12 semiradios, & $A\sigma$ potest 5 semiradios; poterit $X\sigma$ 18 semiradios. Et quia $A\sigma$ potest 6 & Ae 3 semiradios, poterit $e\sigma$ 9 semiradios. Sed Xe potest 27 semiradios, id ambas rectas $X\sigma$, &c. Est ergo angulus $X\sigma e$ rectus. Producat recta $X\tau$ in τ , ita ut $X\tau$ æqualis sit duplæ AN, id est duplæ ejus quæ potest quinque semiradios. Poterit ergo $X\tau$ 20 semiradios. Quoniam ergo est ut eX quæ potest 27 semiradios ad $e\sigma$ quæ potest 9 semiradios, ita BX quæ potest 30 semiradios ad eam quæ

X quæ potest 10 semiradios; & iterum ut eX quæ potest 27 semiradios, ad $X\tau$ quæ potest 18 semiradios, ita BX quæ potest 30 semiradios, ad $X\sigma$ quæ potest 20 semiradios, erunt $B\tau$ & $e\sigma$ parallelæ, & uterque angulus $B\tau X$, $e\sigma X$ rectus. Quoniam autem juncta $B\sigma$ potest duas rectas $A\sigma$, AB quarum hæc potest 4, illa potest 6 semiradios poterit $B\sigma$ 10 semiradios. Sunt ergo $B\sigma$, $B\tau$ æquales, & proinde ambo puncta σ & τ erunt in eodem arcu circuli cujus centrum est B , radius $B\sigma$. Cum ergo $B\tau$ sit ducta ex centro, recta $X\tau$ tangit circulum in τ . Quare recta $X\sigma$ circulum eundem secabit. Sunt autem σ & τ in eadem recta $X\tau$ per constructionem. Eadem ergo recta tanget circulum eundem in τ & secabit in σ . Quod est absurdum. Non est ergo recta $X\sigma\tau$ sine latitudine per quam possit latus ejus exterius circulum tangere & latus interius secare eundem circulum. Si ergo comparatur recta & curva neutra earum considerari potest sine latitudine. Quod erat demonstrandum.

B. Etsi mira mihi hæc videantur, nihil habeo tamen quod dicam in contrarium. Sed ita sunt subtilia ut non possim sine majore adhuc luce intimam tanti Paradoxi causam, ut cupio, comprehendere. Expectabo igitur calculum Arithmeticum.

A. Calculus Arithmeticus parum te juvabit, quod ipse facile pravedere potes, qui nosti neq; lineæ rectæ & curvæ, neq; quadrati & circuli ullam partem aliquoram esse posse communem; & proinde nullum illis esse commune *nummum*, quod haberi necesse est in omni comparatione quantitatum Arithmetica. Veniamus tamen ad Calculum. Quod rectangulum sub lateribus duorum quadratorum medium est proportionale inter ipsa quadrata satis nosti. Nam si fuerint duo quadrata AA , BB , erunt AA , AB , BB continuè proportionalia; quia ut A ad B , ita est ram AA , ad AB , quam AB ad BB . Scis etiam quod si duo quadrata AA , BB , constituentur deinceps ita ut eorum utriusq; duo anguli oppositi sint in eadem recta, rectangulum AB erit unum ex complementis ad quadratum a tota $A+B$. His intellectis quæremus potentiam recti XQ hoc modo. Recta XA æqualis est (per constructionem) duplo Siqui recto arcus 60 graduum. Quoniam ergo Sinus ille rectus potest 3 semiradios, potest XA , quæ ejus dupla est 12 semiradios. Potest autem AB 4 semiradios. Quare utriusq; simul quadratum æquale est 16 quadratis à semiradio. Est autem rectangulum sub AX & AB medium proportionale inter 1 & 4 quadrata a semiradio. Quare rectangulum sub XA , AB est, $\sqrt{48}$, idemq; duplicatum fit radix 48 quadruplicati sive $\sqrt{192}$, id est $13\frac{2}{3}$, proximè. Tantum ergo valent ambo simul complementa quadrati ab XB . Totum ergo quadratum ab XB æquale est $12\frac{1}{2} + 13\frac{2}{3}$, id est $29\frac{2}{3}$, quod minus est quam 30 quadrata a semiradio. Quod prædixi tibi fore. Nam ut fieret 30 quadrata, opo tuit rectangulum

angulum sub XA, AB esse $\sqrt{196}$. Vides ergo calculus Geometricus & Arithmeticus quantum inter se differunt. Simili Methodo quadratū ab XF invenietur minus quam 40 quadrata semiradii. Potest enim XD (duplus radius) 16 semiradios: & DF Secans $5\frac{1}{2}$ semiradios (nam Sinus rectus arcus 60 graduum. Radius. Secans arcus 30 graduum, sunt continuè proportionales in ratione $\sqrt{3}$ ad $\sqrt{4}$. Quare Secans DF est $\sqrt{5\frac{1}{2}}$ semirad.) Rectangulum ergo sub XD & DF est $\sqrt{85\frac{1}{2}}$; & duplum ejus est $\sqrt{341\frac{1}{2}}$, id est $18\frac{1}{2}$ proxime. Itaq; totum quadratum ab XF æquale est $16\frac{1}{2} + 18\frac{1}{2}$ semiradiis, id est $39\frac{1}{2}$ semiradiis proxime. Id quod rursus minus est quam 40 semiradii.

B. Equidem stupeo ad hæc, & vereor ne subit novæ methodo calculi aliquod θαυμασίωμα. Scio rectam quæ sit tripla rectæ Ac , five Sinus recti arcus 60 graduum posse 27 semiradios; cum certissimum sit ipsum Sinum posse tres semiradios. Vide si idem probabitur methodo hæc tua.

A. Recta XA potest 12 semiradios, & recta Ac tres semiradios; summa amborum quadratorum est 15 quadrata semiradii. Medium proportionale inter 3 & 12 est $\sqrt{36}$. Duplum hoc medium est Radix quadruplicati 36, id est $\sqrt{144}$. id est 12. Itaq; aggregatum ex 3, 12 & 12, id est 27 æquale est quadrato totius Xc .

B. Videtur ergo recta quæ a D transit per f , id est recta quæ ducta a centro A transit per S , & terminatur in Tangente BC non esse Secans arcus 30 graduum; id quod certe Geometris ferè omnibus videbitur prodigiosum.

A. Sed quæ videntur prodigiosa causa rei nondum percepta, percepta aliter videbuntur. Putasne quadrantem circuli ABD divisibilem esse in Sectores semper divisibiles?

B. Certe. Est enim quantitas.

A. Et diagonalem AC dividere quadrantem ABD bifariam in E .

B. Etiam.

A. Et duos semisses ita divisi quadrantis, nimirum duos sectores BLA, LDA æquare totum ABD ?

B. Quidni?

A. Et, siquidem tu auferres alterum duorum sectorum *Parisios* usq; , ego alterum hic retinerem, illos tamen sectores esse duos?

B. Proculdubio.

A. Et concurrere latera utriusq; in duobus punctis, quorum unum esset hic, alterum *Parisios*?

B. Certissime. Sed quorsum hæc?

A. Ut videas punctum A id est centrum circuli dividi in tot centra, in quot Sectores dividitur quadrans; & proinde centrum circuli non esse punctum indivisibile, sed habere magnitudinem, etsi magnitudinem

itudinem illam non sit necesse semper considerari, id est venire in demonstrationem.

B. Quare autem punctum aliquando consideratur, aliquando non?

A. Quia magnitudo ejus quibusdam binis quantitatibus communis esse potest, ut duabus rectis; quibusdam autem binis quantitatibus communis esse non potest ut rectæ & curvæ. Itaq; punctum A commune non est Radio & circumferentiæ, & proinde in comparatione Radii & circumferentiæ sumi pro unitate non potest. Nam si centrum (cum habeat magnitudinem) sumatur pro nihilo, omnes rectæ ductæ inde ad circumferentiâ considerandæ sunt ut totidem Sectores. Sin sumatur pro quanto, tum linea recta cujus centrum A est terminus habebit latitudinem aliquam, quam diagonalis AC dividet bisariam. Rursus pars utraque centri A, a recta quæ dividet utrumvis Sectorum secabitur in duas partes. Secabit ergo recta illa (exempli causa), quæ ducta ab S Sectorum cujus arcus est BL, secat in ratione 3 ad 2, extra punctum A. Est ergo recta AB rectangulum Parallelogrammum minutum, habens quatuor angulos rectos & quatuor latera, quorum duo latera opposita bisariam dividit recta NM, & reliqua duo opposita latera bisariam dividunt puncta A & B. Itaq; si ab angulo exteriori rectanguli AB, qui est ultra A, ducatur ad S linea recta & producat ad BC erit ea major quam est AS etiam producta ad idem latus & quæ vulgo habetur pro Secante veræ arcus BS. Atq; hinc etiam sequitur quod Tangens minuti alicujus arcus, si Secans ejusdem arcus ducatur a puncto A, minor esse potest quam arcus ipse, Nam triangulum rectangulum quod fit in Radio, Sinu recto, & Secante habet pro uno latere extremam lineam rectam quadrantis, id est lineam extremam rectanguli AB.

B. Itaq; , ut ante recta XT tangebatur arcum $\sigma\tau$ in τ , & secabat in σ ita nunc una eademq; recta AB, (id est rectangulum exilissimum AB) latere suo interiore secat arcum CGA, ad A, & latere exteriori eundem tangit. Et quoniam linea circularis aq; è lata supponenda est atq; ipse Radius, idem rectangulum tanget arcum eundem in duobus punctis, quorum alterum est in CGA convexa, alterum in CGA concava. Nam Curvitas ne intelligi quidem potest sine convexo & concavo. Nonne id vis?

A. Tenes.

B. Sunt hæc acutissima quidem, sed tamen vera. Et revocant in mentem mihi quam habui olim quasi ἀρχὴν τῆς γεωμετρίας. Vidi forte librum Elementorum Euclidis in Bibliotheca quadam, fortuito apertam ad Prop. 47. El. 1. Et cum legissem hæc verba. In rectangulis triangularibus quadratum quod a latere rectum angulum subtendens describitur, æquale est eis quæ a lateribus rectum angulum continentibus describuntur. Ego continuo, etsi verum sit (inquam) sciri tamen ab homine

non

non potest, ignarus scilicet rerum Mathematicarum. Inspiciens autem demonstrationem statim rejectus sum ad *Prop. 36*. Et inde ad alias usq; ad principia. Intellecta demonstratione animadverti quod longitudinem subtrementis angulum rectum *Euclides* vel *Pythagoras* (vel quisquis ille fuerit Propositionis 47 inventor) mensurabat (juxta *Prop. 36*.) per laterum rectum angulum continentium latitudines, id est, ut nunc loquuntur, per indivisibilia. Quod nunquam potuisset facere, si linea sine latitudine semper consideranda essent.

A. Sic est. Itaq; recta quam *Archimedes* intra suos numeros conclusit, *Peripheria* circuli minor evadere debuit.

B. Veritatis hujus, nempe quod aliud est *non esse*, aliud *non computari* (quam primus docuit nos *Hobbes*) ignoratio, multorum absurdorum Mater fuit.

A. Quod erravit *Wallis* in computatione *Spiralium* ab aliis animadversum est; erroresq; ejus tum hic tum in multis aliis locis ortum habuerunt ab ignoratione naturæ puncti, lineæ & Superficie. Etiam propositionem ejus secundam *Arithmetica Infinitorum*, idem infecit error, quem errorem quam absurda sequantur propositiones uno exemplo nunc indicabo.

Arithmetica Infinitorum Wallisij Propositio secunda hæc est. Si sumatur series quantitatum *Arithmetice proportionalium* (sive juxta naturalem numerorum consequuntionem) continue crescentium, a puncto vel o inchoatarum, erit illa ad seriem totidem maxime aequalium ut 1 ad 2. Sumamus jam (in *Fig. secunda*) triangulum *ABO*, quam supponamus divisam esse in partes aliquotas quotcunq; & quatenus fieri potest numero infinitas. Et sit *A* punctum, vel o. Erigit ergo *AB* series quantitatum *Arithmetice proportionalium*, a puncto sive o inchoatarum. Itaq; ductæ rectæ ipsi *BO* per omnes divisiones rectæ *AB* terminatæq; in recta *AO* erunt quoq; *Arithmetice proportionales*, & inchoatæ a puncto, (nempe a puncto *A*) sive o. Eruntq; propterea illæ parallelæ simul omnes ad toties sumptam *BO*, ut 1 ad 2. Quod est verissimum. Nam crescentes parallelæ constituunt planum *ABO*; totidem autem æquales maxime *BO* constituunt rectangulum *AO*. Et est illud triangulum ad hoc rectangulum ut 1 ad 2. Sed est ut quolibet crescentium ad quamlibet crescentium, ita perimenter circuli ex illa descripti ad perimetrum circuli ex hac descripti. Itaq; perimetri circulorum descriptorum a singulis parallelis crescentibus sunt quoq; *Arithmetice proportionales*, eademq; inchoatæ a puncto sive o. Constituunt autem superficiem Coni *Isoceles*, cujus basis est circulus descriptus Radio *BO*, & cujus latus est recta *AO*. Totidem autem perimetri circulorum æqualium maximo, cujus Radius est *BO* constituunt superficiem *Cylindri* cujus basis eadem est cum base

Coni, & altitudo eadem. Est ergo superficies Coni cujus latus est AO , & cujus Radius diametri BO , ad superficiem *Cylindri* eandem habentis basem & altitudinem ut 1 ad 2. Atq; hoc manifestè sequitur ex propositione secunda Arithmetice Infinitorum *Wallisii*. Videamus an sit verum. Latus *Cylindri* recti cujus basis est circulus descriptus Radio BO , est æquale ejusdem circuli diametro. Quare & latus AB est etiam media proportionalis inter ipsum & diametrum *Cylindri* sui; nimirum propter æqualitatem altitudinis & basis. Ergo per *Prop. 14.* libri primi *Archimedis* de Sphæra & Cylindro, superficies *Cylindri* hujus æqualis est circulo descriptio Radio AB , id est circulo quadruplo ejus qui describitur Radio BO . Sed per *Prop. 16.* ejusdem libri primi de Sphæra & Cylindro, omnis Coni Isoscelis superficies est ad basem ut latus ad radium basis. Sit jam Conus Isosceles cujus latus sit AS , æqualis Radio AB & Radius basis S , æqualis BO . Quoniam ergo est ut superficies Coni ad basem ejusdem, ita latus AS ad BO erit superficies Coni cujus latus est AS , & Radius basis BO (id est S) ad superficiem *Cylindri* eandem habentis altitudinem & basem ut 1 ad 2. Est ergo superficies Coni cujus latus est AS vel AB , & Radius basis S æqualis superficiem Coni cujus latus est AO (major quam AS) & Radius basis BO (æqualis S) Quod est impossibile. Falsa est ergo Propositio illa secunda Arithmetice Infinitorum *Wallisii*. Et propter hanc solam causam falsa est quod non videret non omnia puncta esse inter se æqualia.

B. Miror non vidisse hæc *Schooten* & *Hugenium Wallisii* encomiastas, neq; etiam *Robervallum*, qui cum aliqua in libris *Wallisii* rectè reprehenderet, totam ejus Arithmetice Infinitorum reliquam (excepto Paralogismo quem habet circa Spiralem) ita deglutiit ut suã esse dixerit.

A. Quod *Schooten* hæc non viderit mirandum non est homo parum literatus; ut ex Epistola ejus constat scripta ad *Wallisium*, qui eam edidit. *Hugenius* autem qui adhuc puer magnam in Mathematicis spem sui fecerat postea doctissimus sibi visus circa dimensionem circuli tempus contrivit inutiliter.

B. Videbunt tandem Canonum Sinuum, Tangentium, & Secantium admiratores Trigonometrice Tabulas illas non esse Geometricè demonstratas & numeros in illis conscriptos ab initio esse justo minores usq; ad Tangentem graduum 45.

A. Id quidem verum est. Sunt tamen illæ Tabulæ Trigonometricis necessariae; & in operibus parvis errores adeo sunt insensibiles ut videantur satis utiles esse, nec careri posse.

B. Rogo secundo.

A. Differ rogare paulisper, & lege Methodum adhuc aliam & brevioram.

METHODUS III.

Prop. 42.

Superficies Conica Coni sifocelis cujus latus est AO, Radius basis BV, æqualis est circulo descripto Radio BQ.

Est enim (in *Figura prima*) ut AO ad BO, ita AB ad BV, propterea quod triangula AOB, ABV sunt similia. Quare media proportionalis inter BO & AB est media quoq; inter extremas AO & BV, id est inter latus Coni & Radium Basis. Sed media inter BO & AB & proinde etiam inter AO & BV, est semidiagonalis BQ. Ergo (per *Prop. 15.* libri primi *Archimedis* de Sphæra & Cylindro) descriptus circulus Radio BQ sive B ϕ est æqualis superficiei Conicæ Coni cujus latus est AO, Radius basis BV. Quod erat demonstrandum.

Consestarium. Superficies Conica Coni cujus latus est AO, Radius basis BV, æqualis est dimidio circulo descripto Radio AB vel BC. Est enim circulus descriptus Radio BQ semulus circuli descripti Radio AB.

Prop. 43.

Arcus quadrantis descripti Radio BQ sive B ϕ æqualis est rectæ AO (vide *Figuram primam*).

Quoniam enim circulus descriptus Radio B ϕ æqualis est Conicæ superficiei Coni recti cujus latus est AO, Radius basis BV sive B h , Conica hæc superficies, & circulus ille ad circulum *hi* completum rationem habebunt eandem. Ergo & quarta pars dictæ Conicæ superficiei & quadrans B ϕp , ad quadrantem B hi , eandem habebunt rationem, id est rationem rationis B ϕ ad B h sive ad BV duplicatam, id est rationem AO ad B h . Sumatur in latere AO Coni cujus semidiameter basis est B h , pars quædam æqualis BQ. Eritq; superficies totius Coni cujus latus est æquale AO ad superficiem suæ partis habentis latus æquale BQ, in duplicata ratione AO ad BQ id est in ratione AO ad B h . Quare & quarta pars superficiei Conicæ Coni cujus latus est æquale AO, est ad quartam partem superficiei Conicæ ejusdem, habentis latus BQ, in duplicata ratione AO ad BQ, id est in ratione AO ad B h . Jam quarta pars circuli descripti semidiametro BQ, & quarta pars superficiei Conicæ Coni cujus latus æquale est AO, semidiameter autem basis est B h sunt æquales; & utraq; æqualis dimidiæ areæ quadrantis BCA. Quare pars ejusdem Conicæ superficiei quæ habet pro latere BQ, æqualis est areæ quadrantis B hi , id est in ratione AO ad B h . Est ergo area quadrantis B ϕp , ad aream quadrantis B hi in duplicata ratione AO ad BQ. Sed est in duplicata ratione arcus *op* ad arcum *hi*, id est in ratione duplicata B ϕ ad B h , id est in ratione AO ad B h . Quare arcus *op* & recta AO

X 3

sunt

sunt inter se æquales, ut & arcus *hi* & recta *BQ*. Quod erat demonstrandū.

Confectarium. Recta *BF* quæ potest decem semiradios æqualis est arcui *BLD*. Est enim arcus *op* media proportionalis inter arcum *BLD* & ipsius semissem; quia recta *BQ* est media proportionalis inter Radium *BC* & ipsius semissem *BO*. Sed recta *nζ* ipsi arcui *op* est æqualis; & proinde ipsa *nζ* est media proportionalis inter arcum *BD*, & ipsius semissem. Sed *nζ* (cum possit quinq; semiradios) media est proportionalis inter rectam *BF* & semissem ejus nempe rectam *BX*. Itaq; *BF* est æqualis arcui *BLD* & recta *BX* æqualis arcui *BL*.

Prop. 44.

Recta *BS* (quæ potest 10 semiradios, five *BF* sumpta ipsi *BS* æqualis) æqualis est arcui *BLD*. (Vide Fig. 1.)

Cum enim *BQ* sit media proportionalis inter *BC* radium, & *BO* semiradium, erit quoq; arcus quadrantis descripti Radio *BQ* media proportionalis inter arcum *BLD*, & arcum *MO* ipsius semissem. Ergo et recta *AO* (arcui quadrantis descripti Radio *BQ* æqualis) erit media proportionalis inter eundem arcum *BLD* totum, & arcum *MO* ejus dimidium. Sed recta *AO* (quia potest quinq; semiradios) est media proportionalis inter *BS* quæ potest 10 semiradios & semissem ejus *BX* quæ potest decem quartas Radii. Est ergo *BS* æqualis arcui *BLD*. Quod erat demonstrandum.

Confectarium. Arcus quadrantis. Radius, & arcus quadrantis sunt continue proportionales. Nam *Bb* est $\frac{1}{2}$ rectæ *BF*.

B. Argumentorum abundè est; neq; quid porro desit ad perimetri circuli magnitudinem determinandam possum imaginari. Nam quæ ego te rogaturus eram, non ad hæc confirmanda, sed ad minora quædam cognoscenda spectant. Et video quidem rectas omnes (Figuræ secundæ) ductas ab *X*, & secantes *AP*, secare ipsam & arcum *BL* in eisdem rationes. Nam *AP* est semiradius, & *BL* semiarcus, *Ad* est $\frac{1}{2}$ Radii, & *BS* Arcus. Item *XO* abscindit ab *AD* æqualem rectæ *QR* id est dimidiæ *Z*, sed utrum recta *XC* abscindat in arcu *BLD* arcum duplum ejus quem abscindit *XO*, non video. Neq; video utrum juncta *XK* abscinderet ab *AD* duas ejus tertias partes, sed scire cupio.

A. Quamvis semiradius *AP* & semiarcus *BL* similiter dividantur a rectis ductis ab *X*, non sequitur tamen idem fieri oportere usq; ad punctum *D*. Neq; possibile est. At rectæ ductæ ab *X* dividunt totum Radium *AD* & totam rectam *BF* (ipsi arcui *BLD* æqualem) in rationes easdem.

B. Id quidem manifestum est. Cur autem semiradium *PD* & arcum *LD* non similiter dividunt?

A. Non habent duo arcus *BL*, *LD* ad latus *BC* situm similem. Itaq;

si

si velis dividere semicircum LD sicut dividitur BL producendum est latus DA donec æqualis fiat ipsi BX, & ab eo termino oportet rectas ducere ad arcum DL, quæ secabant semiradium AM & DL arcum in easdem rationes.

B. Quoniam sapius & a teipso audiui demonstrationem legitimam omnem procedere a causa Efficiente, scire cupio in his tuis demonstrationibus ubi apparet Causa Efficiens.

A. Quid? Ipsa ductio rectæ ita ut potentia ejus æqualis sit 10 semiradiis, nonne est efficere ut existat linea recta æqualis arcui quadrantis?

B. Est quidem; ego vero causam aliquam expectabam Physicam; nimirum,, motum puncti, vel naturam (non ante cognitam) curvitatatis.

A. Nonne vides ut recta ducta XS & producta ad BC (in Fig. 2^a) aufert secum & extendens arcum BS collocat terminum ejus S in recta BC. Utq; recta XL similiter extendit arcum BL & ponit in eadem BC. Eodem modo fit in omni parte arcus BL. Itaq; per extensionem istorum arcuum factam per motum rectum a puncto X invenietur recta æqualis parti quoræcunq; arcus BL. Atq; cum hoc rectè invenisset *Hobbius*, alieno postea magis quam suo ingenio fusus, repudiavit; quanquam ad demonstrationem ejus infirmandam nihil asserere potuerunt adversarii ejus præter numeros Ludolphinos, quos tandem vides esse falsos. Idem in libro de Corpore Anglicè edito, Problema idem solvit per naturam Curvitatatis; Et demonstratio clara est & facilis: quam ibi, si liber, legas. Interea sume rectam æqualem chordæ quartæ tantum partis arcus AE, & illam quadruplica. Statim videbis rectam illam constare ex 4 chordis quartæ partis arcus BE, quæ multo minor est quam arcus ipse AE, vix tamen sensibilibiter differre a dimidia BS. Adeo ut minorem forte putes BF quam arcus BL D, nunquam majorem. An Paralogismis aliorum tantum tribuendum est (et iam ibi differentia sunt valde sensibiles) ut nostris ipsorum sensibus credendum non sit? Sed mihi consideranti valde paucos esse Geometras qui scribentem de motu possent assequi, aut qui naturam curvitatatis perscrutari sunt, & (quod nos) argumenta a motu (in certamine de Cycloide probata esse) Visum est non aliis uti Principiis quam *Euclidis* & receptis.

Prop. 45.

Si a puncto X ducatur recta Secans arcum BL inter B & L illa producta ad rectam BF abscindet partem ipsius BF a puncto B mensurandam, æqualem arcui abscisso mensurando item a puncto B. (Vide Fig. 2^a.)

Sir.

Sit arcus By minor arcu BL . Dico ductam Xy , & productam donec incurrat in rectam BF ad β , partem ejus abscindere a termino B æqualem arcui By . Secetur arcus By bifariam in ϵ , & ducatur $\zeta\epsilon$ Sinus rectus arcus $B\epsilon$. Ducatur quoq; $\delta\gamma$ Sinus rectus totius arcus By , seceturq; bifariam in θ . Præterea producat $\zeta\epsilon$ in η , ita ut $\zeta\eta$ sit dupla $\zeta\epsilon$, id est æqualis chordæ totius arcus By ; est ergo $\zeta\eta$ duplus Sinus arcus $B\epsilon$, & proinde per ea quæ demonstrata sunt (*Prop. 37. recta $X\theta$ producta secabit $\zeta\eta$ bifariam.*) Eadem Methodo ostendi potest quod perpetuo bisecando ita contingit. Itaq; perpetua bisectione devenietur ad arcum minimum cujus Sinus haberi possit pro ipso puncto B ; & propterea recta $B\epsilon$ æqualis erit omnibus simul Sinibus vel etiam chordis arcus minimi, id est ipsius B , & propterea æqualis ipsi arcui By . Quare si a puncto X ducatur recta Secans arcum BL inter B & L , illa producta abscindet partem ipsius BF mensurandam a puncto B æqualem arcui abscisso mensurando item a puncto B . Quod erat demonstrandum.

Prop. 46.

Datum arcum quemlibet By dividere in ratione data. *Fig. 2^a.*

Jungatur Xy & producat $ad BC$ in β , sitq; ratio data $B\beta$ ad $B\epsilon$. Deinde ducatur $X\epsilon$ secans arcum By in S . Quoniam igitur (per præcedentem) arcus By est æqualis rectæ $B\epsilon$, & arcus BS rectæ $B\epsilon$; erit ut arcus By ad rectam $B\epsilon$ ita arcus BS ad rectam $B\epsilon$. Secatur ergo datus arcus By in S in ratione data rectæ $B\epsilon$ ad rectam $B\epsilon$. Sed si quantitates Rationis datæ vel alterutra earum major sit quam semel arcus BLD , sumendæ sunt in eadem ratione minores, exempli gratia, ipsarum semisses, & operatio instituenda ut prius. Divisimus ergo datum arcum in ratione data. Quod erat faciendum.

Quid ad hæc dicent illi convitantes *Hobbis*?

B. Nescio. Sed etiam si neq; demonstrata neq; vera hæc essent morem tamen illum maledicendi illis qui aliter atq; ipsi sentiunt non excuso; præsertim ex animi sententia scribentibus, nec studio partium veritatem oppugnantibus. Quando vero libros doctorum (ut habentur) hominum, maxime vero Theologorum, maledictis, dictentisq; (frigidis) repletos sæpe videam, admirari soleo quo læsi, Unde tantæ iræ, & cui bono erumpunt.

A. Læsi sunt, eo quod existimatio eruditionis suæ, quæ illis omnia est, læsa est. Sed ut iram convitiis manifestam faciant, causa nulla esse potest præter ingenium illiberale. Convitium enim est indictio quædam belli, sive provocatio ad pugnam, quam Leges prohibent. Vident ergo posse, se impune maledicere silentio legum abutentes, ut mos est

est muliercularum, aut virorum imbellium. Credin' tu authores Librorum quos modò dicebas plenos esse conviciorum, ad pugnam aptissimos esse?

B. Minime omnium. *χίσαίντο γὰρ ἢ μαχίσαίντο.*

Prop. 47. Describenda Cycloidis METHODUS.

Sit Semicirculus BCD cujus Centrum A. Supponaturq; punctum B moveri uniformiter in Arcu BCD, (qui sit divisus bifariam in C) & eodem tempore moveri eadem velocitate in recta AC. Sunt autem anguli ad A recti. Et (quia motus rectus Centri A æqualis est motui Circulari per Arcum BCD) quando punctum B est in D erit descripta a Centro A recta (transiens per C) æqualis ipsi Arcui BCD.

Sit ea recta AE, cui æquales ponantur DF, BG, nempe quæ possit decem (semiradios) AB; erit ergo AE five DF æqualis arcui BCD. Compleatur rectangulum BDFG.

Jam ad descriptionem Cycloidis dividatur tum Arcus BCD, tum recta BG in partes æquales quotlibet. Ego utramq; lineam secui in partes 12; nempe Arcum ad puncta 1.2.3.4.5. C. 7.8.9.10.11.12. D; & rectam BG in totidem partes ad puncta *a. c. γ. δ. ε. ζ. η. θ. ι. κ. λ.* Et per illa puncta duxi totidem rectas diametro DB parallelas. Item per singula puncta divisionis Arcus BCD, singulas rectas lateri BG parallelas; quas appello *parallelas altitudinis*, ut quæ designant partium circumferentiarum BCD altitudines. Quibus constructis erit Arcus B1 (pars Arcus BCD) æqualis B*a* parti ipsius rectæ BG, & tota BG toti Arcui BCD æqualis.

In recta AE notentur divisiones eadem quæ sunt in recta BG, nempe 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. E. Et Radio 1^a ducatur Arcus *a a* secans parallelam altitudinis primam in *a*. Quando ergo punctum B deberet esse (propter motum circularem) in arcu suo ad punctum 1, erit (propter motum rectum Centri) in puncto *a*. Motus enim Centri non variat altitudines circulatione acquisitas, quæ semper sunt in altitudinum parallelis. Deinde radio 2^a ducatur arcus Circuli Secans parallelam altitudinis secundam in *b*. Quando ergo punctum B propter motum circularem deberet esse in suo arcu ad 2 erit propter motum rectum Centri in eadem parallela altitudinis ab *b*; eritq; arcus *a a* æqualis arcui B1, & arcus *b b* æqualis arcui B2. Item si Radio 3^a describatur arcus *γ c* secans tertiam altitudinis parallelam in *c* erit arcus *γ c* tripla arcus B1. Eadem Methodo constituuntur reliqua puncta *d. e. f. g. h. i. k. l.* per quæ puncta Cyclois debet transire, quæ est descriptio Cycloidis.

Confectarium primum. Manifestum hinc est Arcus omnes $a a, b b, \gamma \gamma$ usq; ad Arcum semicirculi GF esse in ratione continua Arithmetica.

Confectarium secundum. Manifestum quoq; est si plures fierent divisiones accuratiorem fore Cycloidem, ratione Arithmetica semper servata, & deniq; si arcus ducerentur eadem Methodo, tot quot duci possibile est, impleretur spatium planum comprehensum duabus lineis curvis (nempe Arcu semicirculi GF & linea Cycloide FdB) & deniq; recta BG.

Prop. 48.

Spatium trilineum inclusum Cycloide & duabus rectis BG, GF, æquale est semicirculo ABCD.

Nam Arcus GHF, $\lambda l, \kappa k, \iota i, \theta \theta$, & cæteri secundum rationem Arithmeticam perpetuo decrecentes æquales sunt totidem Arcubus semicirculorum integris, descriptis a Radiis quorum maximus quidem esset EG, cæteri vero minores decrecentes scilicet secundum eandem rationem Arithmeticam, donec evanescerent in puncto E. Sed Arcus hi constituerent semicirculum, (modo Radius EG partes aliquotas divisus esset in quot partes divici illum est possibile) constituerent, inquam, semicirculum EGHF. Quare compositæ lineæ BGHF, B λl , B κk , B ιi , B $\theta \theta$, Bng, B $\zeta \zeta$, & cæteri omnes eadem Methodo descriptibiles qui dupli sunt arcuum GHF, $\lambda l, \kappa k, \iota i$, &c. cuncti constituent spatium duplum semicirculi EGHF. Sed spatium inclusum Cycloide, & arcu GHF, & recta BG est ipsum spatium quod constituitur a lineis illis compositis BGHF, B λl , &c. Est ergo spatium inclusum Cycloide, & Arcu GHF, & recta B., duplum semicirculi EGHF. Reliquum ergo Spatium inclusum Cycloide, & duabus rectis BG, FG æquale est semicirculo. Quod erat demonstrandum.

Confectarium primum. Sequitur hinc Spatium comprehensum Cycloide & duabus rectis DF, DB triplum esse semicirculi genitoris. Nam rectangulum totum quod fit a semiperimetro (id est a DF) in diametrum BD est semicirculi quadruplum.

Consect. 2. Manifestum quoq; est Spatium duabus curvis, nimirum Cycloide & Arcu BCD & recta DF inclusum duplum esse semicirculi genitoris ABCD. Est enim semicirculus ABCD unum quorum trilineum inclusum Cycloide & rectis DF, DB, est tria.

Consect. 3. Sequitur etiam rectam quamlibet parallelam basi DF & interceptam a Cycloide & Arcu BCD, æqualem esse Arcui sibi contiguo sumpto a contactu ad punctum B. Tota enim recta DF æqualis est toti Arcui DCB, per Hypothesin. Quoniam ergo spatium trilineum comprehensum Cycloide, Arcu BCD, & recta FD, duplum est

est semicirculi ABCD, & recta FD dupla est fc erunt singulae rectae singulis Arcibus (propterea quod similiter generantur) aequales, id est recta 111 aequalis Arcui B11, recta $k10$ aequalis arcui B10, & sic de ceteris.

Coniectatum hoc tertium etiam sic demonstratur seorsim.

Sumpto quolibet Arcu B3 cujus Sinus productus sit ad Cycloidem in c , & pars intercepta sit $3c$. Quoniam ergo (per constructionem) quo tempore per motum circula rem punctum B deberet esse in 3 , eodem tempore per motum rectum debet descripsisse rectam arcui B3 aequalem, erit recta Bc ipsi arcui B3 aequalis. Itaq; si vera sit Cyclois, non modo basi ejus DF aequalis erit arcui BCD, sed etiam omnis alia recta inter arcum BCD & Cycloidem intercepta basi; parallela erit arcui sibi contiguo terminato in B aequalis.

Quod si motus Centri rectus motui circulari per arcum BCD sit inaequalis, erunt parallelae interceptae Arcibus suis contiguis proportionales quidem, sed inaequales; & per consequens non erit ea vera Cyclois quam definivimus.

Prop. 49.

Recta DG dividit bifariam tum triangulum rectilineum BGF, tum partes ejus nempe spatium Cycloidale externum BGF & bilineum BFB.

Secet recta DG Cycloidem in m . Eritq; triangulum rectilineum G6F aequale quartae parti rectanguli BDFG, id est semicirculo genitori; & tria spatia nempe triangulum G6F, spatium Cycloidale externum BFG, & bilineum BFB inter se aequalia. Rursus triangulo rectilineo G6F aequale est triangulum rectilineum G6B. Dividitur ergo totum triangulum BGF a recta DG bifariam. Pars ergo Cycloidalis spatii comprehensa parte Cycloidis Fm & duabus rectis FG, Gm , una cum parte bilinei BfB comprehensa ab eadem parte Cycloidis Fm , & duabus rectis F6, $6m$ aequale est duobus spatiis, nempe Cycloidali BGm & parti bilinei Bm6B. Cum autem triangulum rectilineum G6F aequale sit spatio Cycloidali BFG, ab'ato communi spatio GmB restabit spatium Bm6B (pars bilinei BFB) aequale spatio FGm parti Cycloidalis spatii externi reliquae. Quare spatium Cycloidale ablatum, nempe BGm aequale est parti reliquae bilinei F6m. Si ostendero jam spatium Cycloidale FGm aequale esse spatio F6m parti bilinei BFB, necesse est ut quatuor illa spatia sint inter se aequalia. Dividatur recta G6 bifariam, id est, in s , ducaturq; recta Fs secans Cycloidem in n ; eritq; triangulum rectilineum GFs aequale triangulo sF6. Superat autem triangulum GFs spatium Cycloidale FGm spatio trilineo snm , minus spatio bilineo

Y 2

FnF,

F_6F . Sed triangulum F_6F (triangulo GF æquale) superat spatium F_6m (partem bilinei BFB) eodem spatio trilineo snm , minus spatio bilineo F_6F . Sunt ergo partes trianguli G_6F diremptæ a parte Cycloidis Fm , inter se æquales. Itaq; recta DG secat tum rectangulum totum BGF tum partes ejus, &c. bifariam. Quod erat demonstrandum.

Prop. 50.

Partes duæ Cycloidalis spatii BFG , ut & partes bilinei BFB diremptæ a recta DG æquiponderant super ipsam DG .

A puncto B ducatur recta B_0 secans rectam DG in ipso Arcu BCD . Eritq; B_0 ad DG (propter Arcum semicirculi BCD) perpendicularis; distantia ergo puncti B , a recta DG est recta B_0 . Item Centro E radio EG descripto arcu secante DG in p recta Fp erit distantia puncti F a recta DG ; & sunt rectæ B_0 , Fp inter se æquales. Cum ergo spatia FGm & mGB ostensa sint æqualia, & æqualiter distent a recta DG , quæ dividit illa bifariam, etiam super ipsam DG æquiponderabunt. De partibus bilinei nempe F_6m , B_6m eadem est demonstratio. Quare partes, &c. Quod erat demonstrandum.

Per eandem causam demonstrari potest quod Centrum gravitatis etiam spatii Cycloidalis interni BFD , terminati Cycloide ipsa & duabus rectis BD , DF est in eadem diagonali DG .

Prop. 51.

Centrum gravitatis spatii Cycloidalis externi BGF , est in s .

Juncta enim FA & divisa in I , ita ut FI sit ad IA ut 2 ad 1 erit punctum I Centrum gravitatis trianguli rectilinei BFD , quod quidem triangulum rectilineum BFE duplum est spatii bilinei BFB . Est autem punctum I in concursu rectarum AB & DG . Itaq; si Centrum libræ statuatur in L , ubi 16 dividitur bifariam, erit Centrum gravitatis bilinei BFB in K ubi $6M$ dividitur bifariam. Est enim triangulum BFD , duplum bilinei BFB . Rursus juncta BE erit divisa in M , ita ut BM sit ad ME ut 2 ad 1, nempe in concursu rectarum DG & AB . Erit ergo M Centrum Gravitatis trianguli BFG . Cum ergo Centrum gravitatis bilinei BFB sit in K erit Centrum gravitatis spatii Cycloidalis externi BGF in s , ita ut Ms , MK sint æquales. Et propterea punctum s est in concursu parallelæ 11 & DG . Quod erat demonstrandum.

Confectarium. Centrum gravitatis spatii interni Cycloidalis BFD , est in puncto L , ubi diagonalis DG , ita dividitur ut GL sit ad LD ut 7 ad

7 ad 5. Cum enim spatium Cycloidale internum BFD , triplum sit spatii Cycloidalis externi BGF , si centrum libræ statuatur in puncto 6. erit 6s triplum distantia centri gravitatis spatii Cycloidalis interni ab eodem puncto 6. Sed 6s est triplum $6L$. Est ergo Centrum gravitatis spatii Cycloidalis interni BFD in L . Dividitur autem recta DG ita ut GL sit ad LD ut 7 ad 5, cum sit L in concursu ee & DG .

Prop. 52.

Quadrilineum $m6CB$ comprehensum duabus curvis Bm , BC , & duabus rectis $6m$, $6C$ æqualis est quadranti ABC .

Secet enim recta $6B$ Arcum BC in q . Quoniam ergo triangulum rectilineum $AB6$ est pars octava rectanguli $BDFG$ erit idem æquale quadranti ABC . Ablato ergo spatio communi $ABqC$ erit reliquum spatium $6qC$ æquale bilineo BqB . Sed spatium $6mBC$ comprehensum a parte Cycloidis Bm & duabus rectis $m6$, $6C$ ostensum est æquale quadranti ABC . Itaq; si ipsi addatur spatium $6qC$, & eidem auferatur bilineum BqB , erit factum spatium $m6CB$ (comprehensum duabus curvis Bm , BC & duabus rectis $m6$, $6C$) æquale (ut antè) quadranti ABC . Quod erat demonstrandum.

Prop. 53.

Spatium Cycloidale internum BAf comprehensum a parte Cycloidis Bf , & duabus rectis AB , Af superat semicirculum genitorem tantum, quantum est trilineum $6fm$.

Nam (per præcedentem) spatium quadrilineum $BC6m$ æquale est quadranti ABC . Quare quadrilineum $ABm6$ æquale est semicirculo genitorii, cui si addatur trilineum $m6f$ fit spatium Cycloidale integrum BAf . Spatium ergo Cycloidale BAf , &c. Quod erat demonstrandum.

Prop. 54.

Si ducatur recta DC & producat ad BG in N , juncta FN transibit per punctum f .

Cum enim DN transeat per C erit BN æqualis diametro BD , & quoniam BG est æqualis Arcui semicirculi Genitoris, erit GN excessus quo Arcus BCD superat diametrum BN . Est autem $6E$ semissis ipsius BG , & $6f$ semissis diametri sive rectæ BN . Quare recta Ef est semissis rectæ GN . Etiam FE est semissis FG . Ut ergo FG ad GN , ita FE ad Ef . Transit ergo FN per punctum f . Quod erat demonstrandum.

Prop. 55.

Triangulum rectilineum EFf æquale est spatio intercepto inter arcum quadrantis ABC & ejusdem subtensam.

Triangulum $6EF$ æquale est quadranti ABC . Et quoniam $6f$ æqualis est semidiametro, erit Triangulum $Ff6$, æquale dimidio quadrato ab $f6$. Reliquum igitur triangulum rectilineum Fef , æquale est reliquo spatio, nimirum, spatio quod relinquitur, dempto a quadrante ABC triangulo rectilineo ABC , id est spatio incluso intra Arcum BC & subtensam ejus. Quoderat demonstrandum.

Prop. 56.

Si ducta Bz producat ad basim Cycloidis BF in u , erit recta Du duæ quintæ ipsius DF , sive ipsius arcus BCD .

Ostensum enim est in præcedentibus arcum quadrantis, cujus Radius est æqualis rectæ BD , æqualem esse rectæ quæ potest decem semiradios (id est quæ potest decem radios semicirculi genitoris.) Est autem DF (per constructionem) æqualis arcui BCD . Quoniam autem angulus BzD in semicirculo est rectus, & quatuor rectæ $6G, 6B, 6D, 6F$, sunt æquales, item quatuor anguli $BDz, GBz, 6DB, 6FD$ inter se æquales; erunt triangula GDB, BDz, Dzo similia. Est ergo ut Bz (id est arcus BCD) ad DB diametrum, ita BD diameter ad Du . Est ergo Du æqualis rectæ quam appellavimus Z , sive duabus quintis rectæ quæ potest decem semiradios, id est rectæ BF , id est arcus BLD . Quod erat demonstrandum.

Prop. 57.

Centrum gravitatis bilinei contenti linea Cycloidale BfF , & recta BF , est in eo puncto diagonalis DG , quod ipsam ita dividit in K , ut DK sit ad KG ut 7 ad 5.

Est enim triangulum AFD quarta pars rectanguli DG , id est æqualis semicirculo genitori. Et triangulum BFD æquale duplo semicirculo genitori. Quoniam autem centrum gravitatis trianguli AFD est in recta DG ad I (nam FA est ad IA ut 2 ad 1, & ostensum est centrum gravitatis figuræ Cycloidalis comprehensæ Cycloide BfF & duabus rectis BD, DF esse in puncto L , & bilineum BFB æquale esse semicirculo genitori) erit bilineum BFB unum, quorum triangulum rectilineum BFD , vel etiam BFG est duo. Quoniam ergo centrum gravitatis figuræ $BfFD$, quod est tria, est in L , erunt IL, LK inter se in ratione reciproca magnitudinum KL & LI . Si ergo punctum L statuatur centrum libræ, triangulum BFD & bilineum BFB suspensa in I & K æquiponderabunt. Est ergo K centrum gravitatis bilinei BFB . Quod erat demonstrandum.

Prop

Prop. 58.

Planum inclusum intra Arcum quadrantis & subtensam ejusdem arcus, est ad trilineum conclusum ab eodem arcu quadrantis & duos radios in angulo recto concurrentes, ut sexta pars semiperimetri circuli genitoris unâ cum tertia parte excessus ipsius semiperimetri supra tres radios ejusdem circuli, ad dictam sextam partem semiperimetri mulctatam duabus tertiis prædicti excessus circuli genitoris supra tres Radios.

Centro E , Radio EG vel EF describatur semicirculus GRF secans EA in R . Eritq; $R8$ æqualis $C4$ vel $10f$, id est tertiæ parti excessus rectæ AE , sive arcus GKF supra tres radios sive triplam AC .

Nam ostensum est (Prop. 55.) quod triangulum rectilineum FEF æquale est plano incluso intra arcum quadrantis & ipsius subtensam, id est bilineo RFR . Ducatur RS perpendicularis ad FD in S . Jam duplum planum RFR unâ cum trilineo incluso intra FS , SR & arcum FR constituunt planum quadrantis ERF . Quoniam igitur triangulum rectilineum EFf & bilineum RFR sunt duplum bilineum RFR , erit triangulum rectilineum reliquum FfR æquale trilineo FSR incluso intra radios FS , SR & arcum quadrantis FR . Est ergo bilineum RFR ad trilineum FSR , ut Ef ad fR ; id est ut sexta pars semiperimetri circuli genitoris unâ cum tertia parte excessus ipsius semiperimetri supra tres Radios ejusdem circuli, ad dictam sextam partem semiperimetri mulctatam duabus tertiis prædicti excessus semiperimetri circuli genitoris supra tres Radios. Quod erat demonstrandum.

Coniectarium 1. Rectangulum sub SR , Rf æquale est duplo trilineo FSR ; & rectangulum sub FE , Ef æquale duplo bilineo RFR ; propterea quod æqualia sunt alterum duplo triangulo FfR , alterum duplo triangulo FEf .

Consect. 2. Rectangulum sub SR & dupla $R8$ est æquale excessui quo segmentum RFR superat trilineum conclusum in rectis FS , SR & Arcu quadrantis FR , (quod trilineum est complementum quadrantis ad quadratum Radii) nam rectangulum FEf superat rectangulum SRf duplo rectangulo SK in $8R$. Quare triangulum FEf superat triangulum SRf ipso rectangulo SK in $8R$.

Prop. 59.

Trilineum $6fm$ clausum duabus rectis $6m$, $6f$, & parte Cycloidis fm , æquale est trilineo FEf clauso duabus rectis FE , Ef & parte Cycloidis Ff .

Est

Est enim planum clausum parte Cycloidis Ffm & duabus rectis $F6$, $6m$, æquale quadranti ERS (per *Prop. 49.*) Ablato ergo communi spatio trilineo Ff , RF clauso duabus curvis, nempe arcu FR , & parte Cycloidis Ff & recta fR , restabunt ex altera parte trilineum FEf , ex altera parte $6mf$ inter se æqualia. Quod erat demonstrandum.

Prop. 60.

Trilineum $6fm$ æquale est complemento quadrantis ERF ad quadratum Radii ER .

Sunt enim triangula rectilinea FEf , $FR6$ æqualia, propter altitudinum inter se, & basium inter se æqualitatem. Quare utrumq; eorum æquale est bilineo RFR . Est autem tam triangulum rectilineum $6EF$, quam trilineum $6fm$ æquale quadranti ERF , & proinde æqualia inter se. Itaq; si auferatur commune triangulum rectilineum FfR , restabunt ab una quidem parte duo triangula FEf , $FR6$, quæ sunt inter se æqualia, & ambo simul æqualia duplo bilineo RFR ; ab altera vero parte duo trilinea nempe triangulum rectilineum FfR , & trilineum $6fm$, quæ ambo simul æqualia sunt duplo complemento quadrantis ERF ad quadratum Radii ER . Sed cum duo triangula FEf , $FR6$ æqualia sint duplo bilineo RFR , erit triangulum FfR æquale uno complementorum prædictorum (est enim quadrans æqualis duplo bilineo RFR una cum complemento ipsius quadrantis ad quadratum Radii.) Quare trilineum $6fm$ æquale est altero complementorum. Trilineum ergo $6fm$, &c. Quod erat demonstrandum.

Prop. 61.

Spatium Cycloidale ABf terminatum duabus rectis AB , Af & curva $Bcmf$ æquale est quadranti ABC una cum quadrato $ABzC$.

Ostensum enim est (*Prop. 52.*) quod quadrilinium $m6CB$ terminatum duabus rectis $m6$, $6C$, & duabus curvis, arcu BC , & curva Bcm , est æquale quadranti ABC . Cui additum spatium $6fm$ æquale (ut in præcedente ostensum est) complemento quadrantis ABC ad quadratum $ABzC$ facit planum comprehensum a duabus curvis Bmf & arcu BC , & à recta fC , æquale quadrato $ABzC$. Cui si addatur rursus ipse quadrans ABC , fit totum planum terminatum duabus rectis AB , Af , & curva Bmf æquale utriq; simul, quadranti ABC & quadrato $ABzC$. Quod erat demonstrandum.

B. Cum Rectangulum $fBzC$ duplum sit quadrantis ABC , & rectæ parallelæ quæ complent trilineum $fBCf$ crescant a puncto B secundum progressionem Arithmeticam usq; ad Cf æqualem arcui BC ,

Ego credidissem, juxta doctrinam *Wallisi* in sua Arithmetica Infinitorum, spatium planum $fBCf$ æquale esse dimidio Rectangulo $f\pi zC$, id est quadranti ABC .

A. Vides ergo regulæ *Wallisiane* falsitatem, & quod extra figuras rectangulas & earum partes nihil valet.

Consectarium 1. Si ducatur recta Bf erit factum spatium bilineum BfB , æquale dimidio quadrato $ABzC$. Dueta enim recta $f\pi$ perpendiculari ad BG in π , & juncta fz , erit rectangulum fz (contentum sub fC quæ æqualis est arcui ABC & sub Radio $f\pi$) æquale duplo quadranti ABC ; & proinde totum rectangulum Bf æquale duplo quadranti una cum quadrato $ABzC$. Et triangulum rectilineum ABf æquale uni quadranti ABC una cum dimidio quadrati $ABzC$. Quare quod restat bilineum BfB æquale est alteri dimidio quadrati $ABzC$.

Consect. 2. Recta fz ita secat Cycloidem, puta in c , ut bilineum cfc & trilineum czB sint inter se æqualia; quod ex eo manifestum est quod spatium Cycloidale $fABmf$, & quadrilaterum rectilineum $ABfz$ sunt inter se æqualia.

Consect. 3. Triangulum rectilineum fzB æquale est bilineo fBf . Est enim triangulum fCz (cujus latus fC æquale est arcui BC , & latus Cz æquale Radio AC) æquale quadranti ABC . Quoniam autem triangulum fzB una cum quadrato $ABzC$ æquale est spatio Cycloidali fBA , ablato communi triangulo rectilineo fAB erit reliquum triangulum fzB æquale reliquo bilineo fBf , id est dimidio quadrato $ABzC$.

Prop. 62.

Solidum descriptum a plano Cycloidali $BfFDB$ moto super basem DF per quadrantem circuli est æquale duabus tertiis Solidi quod sit a rectangulo DG moto item super eandem basem, & per quadrantem circuli.

Intelligatur rectangulum DG moveri super basem DF immoram, donec rectæ DB , FG , ceteraq; intermediae parallelae descripserint singulae suos quadrantes; quo facto, dictum rectangulum DG insister plano chartæ perpendiculariter in communi sectione DF ; eritq; descripta quarta pars Cylindri recti. Erit autem arcus quadrantis descripti ab una quaq; parallelarum dictarum, æqualis arcui BCD , & quotolibet pars ejus æqualis parti cognomini arcus BC . Præterea Sinus rectus quotolibet partis arcus quadrantis descripti a DB , æqualis erit chordæ arcus cognominis descripti ab AB . Ubi enim arcus quadrantis arcui semicirculi est æqualis, si sumantur in utroq; eadem partes, quæ recta chorda est arcus sumpti in semicirculo, eadem recta erit Sinus rectus arcus analogi in quadrante. Itaq; si ducatur recta parallela & æqualis

rectæ DB , terminata in DF & BG secans Cycloidem in 1, parte duodecima arcus BCD , erit chorda B_1 æqualis Sinui recto partis duodecimæ arcus quadrantis descripti Radio qui sit æqualis rectæ DB . Quare si in arcu quadrantis descripti a parallela per 1, sumatur pars ejus duodecima, & demittatur inde in Chartæ planum recta perpendicularis, incidet illa in parallelam altitudinis quæ transit per 1.

Similiter ostendi potest quod si sumatur pars sexta, id est arcus B_2 , Sinus rectus duarum duodecimarum partium arcus quadrantis descripti a parallela per 2, ea incidet perpendiculariter in parallelam altitudinis quæ transit per 2. Et sic de cæteris partibus quadrantis. Itaq; arcus quadrantum descriptorum a rectis parallelis ipsi DB , decrescunt in ratione Arithmetica, donec evanescant in puncto F . Plana autem quadrantum eorundem decrescunt in ratione arcuum duplicata. Quare aggregatum quadrantum omnium descriptorum a dictis parallelis sumptis usq; ad Cycloidem, id est Solidum descriptum a plano Cycloidali: $BfFDB$ est ad Solidum descriptum a conversione spatii Cycloidalis externi $BGFfB$. Et ad Solidum descriptum a rectangulo DG ut 2 ad 3. Quod erat demonstrandum.

Consectarium. Sequitur hinc quod solidum descriptum a triangulo FBD , solidum descriptum a bilineo BFB , & solidum descriptum a plano Cycloidali externo $BGFfB$ esse inter se æqualia; & unum quodlibet eorum æquale quartæ parti Coni, ejusdem altitudinis & basis cum Cylindro descripto a rectangulo DG . Est enim Conus, id est solidum descriptum a triangulo rectilineo DGF converso super rectum DF , tertia pars Cylindri descripti a revolutione rectanguli DG super eandem rectam DF .

Consect. 2. Manifestum hinc est eadem Methodo demonstrari posse, sumptâ quavis aliâ parallela altitudinis, ut Af , terminatâ ex una parte in diametro DB , ex altera parte in Cycloide, & ductâ $f\pi$ perpendiculariter ad BG , Quod solidum factum a conversione plani Cycloidalis $BmfA$ circa rectam Af per quadrantem circuli æquale esse duabus tertiis solidi facti eodem tempore a conversione rectanguli $A\pi$ supra eandem Af .

Prop. 63.

Centrum gravitatis semicirculi genitoris $ABCD$ ita dividit Radium AC in O , ut pars AO sit $\frac{1}{2}$, arcus BCD .

Si fiat ut tertia pars arcus BCD ad tertiam partem subtensæ (id est diametri) BD , ita duæ tertiæ Radii AB , id est una tertia diametri BD , ad quartam, erit terminus illius quartæ sumptæ ab A versus C centrum gravitatis semicirculi $ABCD$: (per lib. primum cap. 9

Prop. 1.

Prop. 1. Guldini de Centro gravitatis.) Sit terminus ille O .

Est ergo tertia pars diametri BD media proportionalis inter tertiam partem arcus BCD & AO . Quoniam ergo diameter (per superius demonstrata) est media proportionalis inter arcum BCD & duas quintas arcus ejusdem, etiam tertia pars diametri erit media proportionalis inter tertiam partem arcus BCD & tertiam partem duarum quintarum sive sex quindecimarum dicti arcus BCD . Sed tertia pars sex quindecimarum est $\frac{1}{5}$, quare AO est $\frac{1}{5}$ arcus BCD sive rectæ AE vel DF . Itaq; centrum gravitatis semicirculi genitoris $ABCD$, ita dividit radium AC in O , ut pars AO sit $\frac{1}{5}$ arcus BCD . Quod erat demonstrandum.

Coroll. Ducta ab O recta Ov parallela diametro BD secans rectam Az , in v , erit punctum v centrum gravitatis quadrantis ABC .

Aliter.

Si fiat ut arcus BC ad duas tertias subtenfæ BC , ita $A\xi$ semisubtenfa ad quartam fumendam ab A versus C , erit terminus ejus centrum gravitatis semicirculi. Demonstratum est a *Jo. de la Faille*, *Prop. 56*. Sed ut arcus BC ad subtenfam BC ita subtenfa BC ad $\frac{2}{3}$ arcus BC , id est ad unam quintam totius BCD . Quare ut arcus BC ad $\frac{2}{3}$ subtenfæ BC ita $A\xi$ id est semisubtenfa ad duas tertias duarum quintarum arcus BC , id est ad unam tertiam duarum quintarum totius arcus BCD , id est ad $\frac{1}{5}$ arcus BCD . Quod erat demonstrandum.

B. Si fiat semicirculus æneus accuratus qui sit ejusdem ubiq; crassitudinis, isq; in puncto O tenui filo suspensus maneat plano Horizontis parallelus, quin recta DF æqualis sit arcui semicirculi genitoris, dubitari amplius non potest.

A. Et si experimenta talia vim non habeant demonstrationis, juvat tamen operis cum contemplatione consensio. Itaq; semicirculum æneum fieri curavi, & suspendi ab eo puncto, & parallelismum Horizontalem inveni exactissimum; sed procede.

Prop. 64.

Invenire centrum gravitatis segmenti BCB contentum arcu quadrantis & subtenfa arcus BC .

Invento centro gravitatis trianguli rectilinei ABC fiat ut segmentum BCB ad triangulum ABC , ita distantia inter centra gravitatis quadrantis ABC & trianguli ABC ad aliam. Et illa inventa ponatur

tur a puncto γ versus arcum in eadem recta Az , nempe $\gamma\gamma$, & erit γ centrum quæsitum. Datur autem ratio bilinei BCB ad triangulum ABC , nempe ratio FR ad FE , & est centrum gravitatis segmenti BCB in recta Az in qua sunt centra gravitatis tum Trianguli tum quadrantis ABC . Datur ergo punctum γ , id est centrum gravitatis segmenti BCD . Factum ergo est, quod erat faciendum.

B. Video etiam aliud sequi scitu non indignum, nimirum, Planum quod nascitur ab aggregatione rectarum, quæ æquales sunt partibus arcus BC perpetuo a nihilo crescentibus juxta rationem Arithmeticam, quando applicantur ordinatim ad terminos curvarum sibi æqualium nempe $B_1 B_2 B_3$, &c. æquales esse plano quod nascitur ab aggregatione sinuum rectorum eorundem arcuum, quando illi sinus ordinantur singuli ad terminos arcuum suorum in rectâ quæ sit ipsi arcui BC æqualis. Nam quod aggregatum sinuum rectorum omnium ita ordinatorum æquale est quadrato Radii demonstrarunt fortasse plures, sed invenit & demonstravit primus *Ch. Wren* Astronomiæ Professor *Greshamensis*.

Prop. 65.

Solâ quod fit a conversione trianguli rectilinei FDB per quadrantem circuli super basem FD , centrum gravitatis est in plano quadrantis descripti semidiametro $\gamma\gamma$ & erecti ad planum chartæ, & in ea recta quæ ducta a puncto γ dividit arcum ejusdem quadrantis bifariam, distatq; a puncto γ quod est in basi tantum quanta est dodrans duplæ rectæ $A\gamma$.

Factum enim solidum a revolutione integra trianguli FDB super basem FD est Conus cujus centrum gravitatis dividit basem FD , ita ut pars ad verticem sit ad reliquam ut 3 ad 1, id est in γ . Quare planum erectum ad planum chartæ in communi sectione FD secans eam in γ , est planum æquilibrîi tum ipsius Coni tum etiam dimidii vel quotalibet partis ejus. Planum enim æquilibrîi dividit hæc in momenta æqualia. Est ergo centrum æquilibrîi solidi quod fit a quarta parte conversionis trianguli FD , in plano quadrantis descripti a $\gamma\gamma$, & erecti ad planum chartæ. Quoniam autem arcus quadrantis descripti a DB duplus est arcus BCD descripti ab AB , & centrum gravitatis semicirculi BCD distat a centro A intervallo AO , erit centrum gravitatis semicirculi descripti a DB in distantia, a centro D tanta quanta est dupla AO . Sumatur DT æqualis duplæ AO , ducaturq; FT secans $\gamma\gamma$ in V . Quare, quando in conversione trianguli FDB recta DT sit plano chartæ perpendicularis, erit punctum T centrum gravitatis semicirculi descripti a diametro DB . Secet recta EB rectam $\gamma\gamma$ in X . Quare quando

do in conversione trianguli FDT, γ V est ad planum chartæ erecta, erit punctum V centrum gravitatis semicirculi descripti a semidiametro γ X. Et sic continget in intersectionibus rectarum omnium (quæ sunt Parallela rectæ DB) cum recta FT, ut centra gravitatis quadrantum descriptorum ab ordinatis in triangulo FDB, sint in intersectionibus ipsarum ordinatarum cum recta FT. Sed intelligendum est triangulum FDT erectum esse ad planum chartæ. Itaq; omnes semicirculi descripti a conversione trianguli FDB super basem FD æquiponderabunt super rectam FT, erectam ad planum chartæ. Sed quod æquiponderabunt etiam super $\gamma\gamma$ similiter erectam manifestum est ex eo quod F γ est ad γ D ut 3 ad 1. Est ergo centrum gravitatis Semiconi descripti a triangulo FDB in puncto V elevato perpendiculariter super planum chartæ sive Horizontis in γ ; & distat a puncto γ quod est in base, tantum quanta est $\frac{1}{2}$ arcus semicirculi descripti a semidiametro γ X, sive dodrante rectæ DB.

Rursus, quoniam centrum gravitatis quadrantis ABC est ad ν in recta Az quæ dividit arcum BC bifariam, erit quoq; centrum gravitatis quadrantis descripti a DB in recta quæ dividit arcum quadrantis ipsedem bifariam; distabitq; tantum a puncto D quanta est dupla A ν . Sumatur D ϕ æqualis duplæ A ν , ductaq; F ϕ secet rectam $\gamma\gamma$ in ν . Quoniam ergo D ϕ est distantia centri gravitatis quadrantis descripti semidiametro DB a puncto D, & A ν est in recta quæ dividit arcum BC bifariam, erit quoq; $\gamma\nu$ distantia centri gravitatis quadrantis descripti a γ X & in recta quæ dividit arcum ejusdem quadrantis γ X bifariam. Idem accidit in cæteris omnibus ordinatis trianguli FDB. Est igitur F ϕ diameter æquilibrii solidi quod fit a conversione trianguli FDB super basem FD. Et recta $\gamma\nu$ sumpta in recta quæ dividit arcum quadrantis descripti a γ X bifariam Diameter æquilibrii altera, & $\gamma\nu$ dodrans sive $\frac{3}{4}$ rectæ D ϕ , id est, duplæ A ν . Itaq; punctum intersectionis ambarum $\gamma\nu$ & F ϕ id est punctum ipsum ν est centrum gravitatis Solidi quod fit a conversione trianguli FDB per quadrantem circuli. Quare Solidi quod fit, &c. Quod erat demonstrandum.

Consecutarium. Centrum gravitatis quartæ partis Cylindri descripti a conversione integra rectanguli DG super latus FD est in plano quadrantis descripti a $\zeta\zeta$ in distantia a puncto ζ quod est in base tanta quanta est D ϕ , & est in recta quæ dividit arcum ejusdem quadrantis bifariam. Et centrum gravitatis dimidii Cylindri ejusdem est in recta quæ ex ζ erigitur plano chartæ perpendicularis in distantia æquali rectæ DT.

Invenire centrum gravitatis Solidi quod fit a conversione plani Cycloidalis DBF circa basem DF per circuli quadrantem.

Sumatur $\zeta\zeta$ aequalis rectæ D ϕ , & collocetur unus ejus terminus in recta DF ad ζ , & alter terminus in plano quadrantis erecti ad planum chartæ in $\zeta\zeta$, ita ut $\zeta\chi$ faciat cum recta $\zeta\zeta$ angulum semirectum; jungaturq; $\nu\chi$ seceturq; $\delta\delta$ tam supra quam infra basiam a recta $\sigma\sigma$, quæ secet $\nu\chi$ in τ . Dico punctum τ esse centrum gravitatis Solidi propositi.

Quoniam enim Solidum propositum (per Prop. 62.) est ad Solidum descriptum eodem tempore a rectangulo DG ut 2 ad 3, & centrum gravitatis Solidi facti a rectangulo DG est in plano erecto ad chartam in $\zeta\zeta$, & utriusq; centrum gravitatis in recta quæ facit cum diametro sui quadrantis angulum inclinationis semirectum, cumq; centrum gravitatis Solidi a conversione simili trianguli DBG sit similiter positum ad planum super $\gamma\gamma$, erit centrum gravitatis Solidi propositi (propter rationem magnitudinum 2 ad 1) in eo plano quod distat a plano per $\zeta\zeta$ ex altera parte, ita ut distantia $\nu\zeta$ sit ad distantiam ejus, ex altera parte reciproce ut 2 ad 1. Erit ergo centrum gravitatis Solidi propositi in plano quod ad planum chartæ est erectum in $\sigma\sigma$. Nam $\nu\zeta$ est 3 quorum $\zeta\sigma$ est 1. Rursus centrum gravitatis Solidi propositi est in recta quæ facit cum recta $\sigma\sigma$ angulum semirectum. Rectarum $\delta\delta$, $\nu\chi$ intersectio sit ω . Quoniam jam $\omega\nu$ est ad $\omega\tau$ ut 2 ad 1, id est in ratione Solidi propositi ad Solidum factum a simili conversione trianguli DBF; & centrum gravitatis Solidi a triangulo DBF est in ν , si fiat ω centum librarum, distabit centrum gravitatis Solidi propositi a centro librarum ω , ita ut distantia $\nu\omega$ sit dupla distantie centri gravitatis Solidi propositi ab eodem puncto ω . Erit ergo in τ . Quod erat demonstrandum.

Consequitur. Sequitur hinc punctum ω positum item in recta $\delta\delta$ ita ut faciat cum recta $\delta\delta$ angulum semirectum esse centrum gravitatis utriusq; simul Solidi, nempe Solidi propositi, & Solidi facti a simili conversione trianguli DBF.

B. Credo equidem, & præterea punctum C esse centrum gravitatis utriusq; simul Solidi, nempe Solidi propositi, & Solidi quod fit a conversione simili plani Cycloidalis externi BFG. Video etiam basem FD ita dividi a plano æquilibrii $\sigma\sigma$ ut pars F σ sit ad reliquam ut 5 ad 3, ut sit in semiparabola; nec mirum, cum ratio Solidi propositi sit ad suum complementum eadem quæ plani semiparabolici ad complementum suum. Caterum BD non dividitur in 3 ad 2 ut Diameter semiparabolæ. Cujus rei causam non video.

A. Neq;

A. Neq; ego ; sed neq; quare ita esse debeat. Ex iis quæ demonstrata sunt de ratione propositi Solidi facti a conversione ejus circa basem FD , ad Solidum factum a simili conversione rectanguli DG , & de centrīs gravitatis ipsorum, Methodus apparet inveniendi rationem Solidi facti a conversione cujuscunque partis ejus abscissæ a parallela altitudinis quacunq;. Nam si planum Cycloidale cujus basis (exempli causa) est Af convertatur super basem suam Af recta quidem AB describet quadrantem integrum, reliquæ autem ipsi parallelae describent arcus quadrantum minores semper in ratione Arithmetica, donec in puncto f describatur nihil. Ex quo, ut ante, inferetur Solidum factum a conversione plani Cycloidalis ABf super Basem Af duplum esse Solidi quod fit a simili conversione trianguli fAB ; Cognitiq; magnitudinum rationibus invenientur, ut ante, eorum centra gravitatis.

Prop. 67.

Solidum factum a conversione rectanguli DG per quadrantem circuli, circa diametrum circuli genitoris DB (quæ est Cylindri totius sic facti altitudo) est ad Solidum factum a conversione ejusdem rectanguli DG circa rectam DF (quæ est Cylindri hujus altitudo) ut DF ad illius altitudinem DB .

Sunt enim Cylindri inter se in ratione composita basis ad basem (id est diametri basis ad diametrum basis duplicata) & altitudinis DB ad altitudinem DF . Sunt autem rectæ DF , EB , Du (per *Prop. 55.*) continuè proportionales. Est igitur basis ad basem ut DF ad Du . Componitur ergo ratio Cylindri facti a conversione plani DG circa altitudinem propriam DB ad Cylindrum factum a conversione circa altitudinem propriam DF , ex rationibus altitudinis DF ad Du , & DB diametri basis, ad DF , hoc est rectæ, Du ad altitudinem DB . Si componantur ergo ratio BD ad Du (id est ratio basis ad basem) & ratio DB ad DF id est Du ad DB , erit ratio Cylindri facti a conversione ejusdem rectanguli DG circa DB ad Cylindrum factum a conversione ejusdem rectanguli circa DF in ratione composita, ex rationibus DF ad Du , & Du ad DB ; & propterea Cylindrus ad Cylindrum & proinde $\frac{1}{4}$ illius ad $\frac{1}{4}$ hujus, est ut DF ad DB . Quod erat demonstrandum.

B. Si certum esset quod Cylindri sunt inter se in ratione composita ex rationibus basis ad basem, & altitudinis ad altitudinem, dubitari non posset de Theorematis hujus veritate. Sed ubi est hoc demonstratum?

A. Demonstravit *Hobbius* *lib. de Corpore cap. 12. Art. 14.* Quod caput ipse *Wallisius* non improbavit, sed quia nihil in eo reperit quod potuim

potuit rodere, *Hobbi* ipsius esse negavit. Non quod alienum revera esse putarat, sed quia instituto ejus mentiri expedivit. Theorema hoc non modo in quantitativis factis, sed etiam in omni genere rerum factarum verum est. Neq; arte Logicæ, sed ratione tantum naturali opus est ad veritatem ejus agnoscendam. Satis enim manifestum est quod omnis Effectus naturalis ad omnem Effectum naturalem rationem habet compositam ex rationibus earum rerum quæ causas eorum componunt integras. Nihil enim in effectu esse potest quod non fuit in aliqua parte Causæ suæ; nec in Causa quod non in Effectum derivetur.

B. Mihi nova quidem hæc contingit doctrina, attamen verissima est & procedens a contemplatione quæ in iis (qui jurant in verba magistorum) raro invenitur. Videamus jam consecraria.

Consecrarium 1. Conus qui fit a conversione trianguli FDB circa DB diimetrum circuli genitoris est ad Conum qui fit a conversione ejusdem trianguli circa DF ut DF ad DB . Sunt enim ut ipsi Cylindri. Habent autem vertices ille in B , hic in F .

Consecr. 2. Solidum factum a conversione plani Cycloidalis $DBfF$ circa DB , est ad Solidum factum a conversione ejusdem plani Cycloidalis circa DF , ut DF ad DB . Sunt enim ut ipsi Coni.

Consecr. 3. Excessus Cylindri facti a conversione rectanguli DG circa DB , super Solidum factum a conversione plani Cycloidalis $DBfF$ circa eandem DB , est ad excessum Cylindri facti a conversione rectanguli DG circa DF super Solidum factum a conversione plani Cycloidalis $DBfF$ circa eandem DF , ut DF ad DB . Sunt enim hi quoq; ut Cylindri ipsi.

Prop. 68.

Centrum gravitatis semicirculi cujus diameter est DF , id est recta æqualis arcui BCD est in recta quæ ducta a centro dividit ipsum semicirculum bifariam, & distat a centro D tantum quanta est recta æqualis duabus tertiiis semiradii AB .

Otensum enim est, Quod centrum gravitatis semicirculi $ABCD$ est in recta AC quæ a centro A dividit semicirculum $ABCD$ bifariam, distatq; a puncto A tantum quanta est AO , id est, quanta est duæ quindecimæ rectæ DF sive arcus BCD . Sed in omnibus semicirculis centra gravitatis situm habent similem. Quare centrum gravitatis semicirculi, cujus diameter est DF , distat a puncto D tantum quanta est duæ quindecimæ arcus semicirculi cujus diameter est DF æqualis Arcui BCD . Est autem arcus semicirculi cujus diameter est æqualis arcui

arculi BCD , æqualis (per *Prop. 11.*) quinque semiradiis sive quintuplæ EO . Itaque centrum gravitatis distat a centro D tantum quanta est duæ quindecimæ quintuplæ AB , id est duæ tertiæ semiradii AB . Quod erat demonstrandum.

Confectarium. Dato centro gravitatis semicirculi, datur quoq; centrum gravitatis dimidii ejus; atq; etiam cujuslibet Sectoris qui sit semicirculi quotalibet pars.

B. Methodo (ut videtur) eadem qua centra gravitatis partium Cylindri facti a conversione plani DG circa DF inventa sunt, inveniri possunt etiam centra gravitatis partium Cylindri facti a conversione ejusdem plani DG circa DB ; Quid ergo ea quæ restant non demonstras?

A. Primo quia hæc parata habui, cætera nondum contemplatus sum. Secundo, quia alia Figura describenda esset, in qua semicirculus, cujus diameter est DF esset describenda, & non paucioribus lineis quam hæc onerata est, oneranda; id quod mihi quidem operæ pretium esse non videtur. Nam semicirculorum quidem, & quadrantum, & aliorum sectorum centra gravitatis cognoscere, utilitatem aliquam habet ad magna ædificia, propterea quod saxa grandia talis formæ appensa a centris gravitatum suarum elevari in altum possunt Horizontaliter, & proinde aptè collocari; quod aliter fieri non potest, sine multo labore, atq; etiam periculo, ne dum vectibus detorqueantur, disfringantur.

B. Redigis mihi in memoriam fabulum Vulpis & Racemi.

A. Irride quantum libuerit, ego hæc nihilominus relinquam illis quibus longius speratur tempus vivendi.

Credo te qui demonstrationibus legendis animum acriter intendere solitus es, satis jam tandem defatigatum esse.

B. Ego vero minimè. Delector enim Paradoxis, qualia sunt hæc quæ legimus fere omnia.

A. Itane cis?

B. Quid ni? Quod punctum magnitudinem, etsi aliquando non consideratam, aliquam tamen h. b. at, Paradoxum non est?

A. Est quidem, sequentis doctorum auctoritatem; utentibus autem ratione propria Paradoxum non est.

B. Quod Ratio ea quidem quam habent inter se duo inæqualia quantitas sit, ea vero quam habent duo æqualia quantitas non sit, Paradoxum est. Quod in tribus continè proportionalibus quorum primum est minimum, Ratio primi ad secundum semissis est Rationis primi ad tertium. Quod angulus rectilineus est quantitas conversionis Radii circa centrum. Quod angulus Contactus est quantitas, esse tamen angulos ad quos ille rationem habeat nullam. Deinde illa quæ

hinc deduxisti, nempe, latus quadrati, quod quadratum æquale sit decem quadratis a quarta parte diametri, æquale sit arcui quadrantis, contra *Archimedem*. Quod arcum vel angulum dividis in rationem datam. Quod centrum gravitatis semicirculi tantum distat a centro circuli quanta est $\frac{1}{4}$, arcus ejusdem semicirculi, nonne hæc tua & *Hobbiana* Paradoxa sunt Geometrica?

A. Sunt quidem Paradoxa, nihil tamen impedit quo minus vera sint, & fortasse in rebus, quales sunt hæc, speculationis aliquanto profundioris, nihil tam Paradoxum est quam ipsa veritas.

B. Paradoxum quoque est quod Regulam Algebræ (id est delicatiorum hominum Geometriam totam) in Figuris curvilineis parum aut nihil valere dicis.

A. In scriptis Geometricis aliorum nulla credis esse Paradoxa? Primo, lineam latitudinem non habere, & tamen duci posse. Secundo, angulum planum esse inclinationem quam habent duæ lineæ concurrentes, in ipso puncto concursus. Tertio, posse transiri a majore ad minus per omnia media, nec tamen per æquale. Quarto, duplicatum minus esse quam Simplum.

B. Cujus hoc sit non memini.

A. Nonne omnes affirmant in ratione minoris ad majus duplicata (exempli causa) in his continè proportionalibus 1. 2. 4, rationem 1 ad 4 duplicatam esse rationis 1 ad 2, iidem tamen (cum *Euc. Ele. 5. Prop. 8.*) Rationem 1 ad 2, quæ est simpla, majorem esse quam Ratio 1 ad 4, quæ est duplicata.

B. Non sunt hæc Paradoxa.

A. Quid ergo sunt?

B. Absurda. Sed ultimum hoc de duplicata ratione ex eo natum esse videtur quod *Euclides* utitur voce διπλασίονι semper pro duplicata, nunquam pro dupla.

A. Quid autem? An Geometram decet Theorematum veritatem ex usu verborum, an ex rebus ipsis rectè conceptis æstimare. Sed quod *Euclidem* ais nunquam uti voce διπλασίονι pro duplo verum non est. Lege *Elem. 3. Prop. 20.* quæ sic se habet, Εν κύκλῳ ἡ πρὸς τῷ κέντρῳ γωνία διπλασίον ἐστὶ τῆς πρὸς τῇ περιφερείᾳ, &c.

B. Tua illa quanquam Paradoxa vera tamen sunt, ut mihi videntur, & futura aliquando Endoxa. Interea tu, qui defendis omnem doctrinam *Hobbianam*, quid dicturus es ad ea quæ habet in Physica sua & Politica. Et primo, in Physica, quod omnium rerum naturalium causas dicit esse Motum, eumque Moti & contigui corporis.

A. Sive verum hoc sit sive falsum, Paradoxum certè non est. Nam *Aristoteles* quem sequitur schola, idem dicit, si non & amplius,

pius, cum dicat *Naturam* nihil aliud esse præter *Motum*; *Motum* autem proprium esse corporis. Quod internum esse dicat, non negat quin causam habeat in externo. Nam affirmat alibi *nihil posse movere seipsum*. Ab hoc Principio orsus causas qualitarum sensibilibum & Phænomenon Naturalium fere omnium satis probabiles deducit *Hobbius*; id quod illi quibus Principium hoc videtur falsum facere nunquam poterunt.

B. Maximam partem Effectuum Naturalium deducit ille a motu quodam quem vocat *Circularem Simplicem*, quem motum veteres ne Lectores, exceptis paucis non satis concipiant. Nam etsi talis motus ad producenda Phænomena Naturæ ferè omnia sit omnium motuum aptissimus, quia tamen a nemine ante illum animadversus & explicatus est, Lectores pauci ductum Orationis, qua motus ille describitur & Computatur, facile sequi possunt.

A. Si quis manu teneat corpus aliquod figuræ cujuscunq; , puta Pilam, e qua Pila promineret stylus scriptorius, an difficile est imaginari quo modo ille eo stylo possit literam aliquam Alphabeti ductu continuo exarare?

B. Nihil facilius.

A. Quod si plures simul styli prominerent, ita ut tabellam aliquam omnes simul tangerent, nonne idem eodem tempore literas plures exarare poterit?

B. Mille si vult, & tot sint styli. Sed illæ erunt omnes inter se similes et æquales.

A. Id quidem manifestum est. Sed quis interea motus & qualis dicetur totius Pilæ.

B. Profecio, quem motum habet unius styli cujuslibet cuspis, eundem habebit cuspis styli alterius cujuscunq; ; imo vero punctum unum quodlibet tum Pilæ tum manus.

A. Motus jam Pilæ ipse est, quem appellat ille *Motum Circularem Simplicem*, non modo quando Pilæ puncta describant Circulos, sed etiam quando quælibet alias describunt figuras, modo puncta illa motu suo ad loca redeant unde moveri inceperunt. Cujus motus proprietas una est ut quælibet linea in Pila sumpta feratur sibi semper Parallela. Notandum est etiam hoc, Quod Naturæ non repugnat tali motu quamquam velocissimo describi posse figuram etiam minutissimam. Hunc motum Telluri quidem toti attribuit *Copernicus*; *Hobbius* autem etiam Soli, & Planetis omnibus, & singulis etiam minimis eorum partibus. Aliam ejusdem motus proprietatem ostendit esse quod Heterogenea segregans congregat Homogenea. Atq; ex his proprietatibus causas reddit omnium ferè Phænomenon Naturalium,

ium, satis probabiles, tantas ubiq; Magnitudines & Velocitates supponens quantas effectus cujus causa quaeritur possulat.

B. Nihil a Physicis, quorum Principia, ut Geometrarum, proprio arbitrio certa statui non possunt, amplius requirendum est, quam ut causæ rerum tales esse possint. Itaq; Physica illa *Hobbii* tam diu improbanda non est, quam diu nemo eorundem Effectuum per alios motus causas reddiderit probabiliores.

A. Id quod nunquam, credo, fiet. Nam causa naturalis omnis rei est motus aliquis; si autem qui philosophiæ maximè nunc studentes naturam motus minime contemplati sunt, in hanc unam rem incumbunt, ut nova acquirant Phænomena; cum Phænomena sola experiendo, causæ ratiocinando a Motu cognoscendæ sunt.

B. Qui corpora corporibus admovendo, nova & mirabilia ostendunt Naturæ opera, mirum in modum incendunt animos hominum amore Philosophiæ, & ad causas investigandas non parum intigant, eoq; nomine laude digni sunt.

A. Ita est; nam Historiam Naturalem (sine qua scientia Naturalis frustra quaeritur) locupletant. Sed intueri & admirari Naturæ opera, ut puer Pulchritudinem libri plus Contemplatur quam literas, non est hominis Philosophi; id quod faciunt qui videntes Phænomena, non considerant quo Agente, quo motu, & quo modo generari potuerunt. Nam si experimentia rerum naturalium, scientia dicenda sit, Optimi omnium Physici sunt Pharmacopei.

B. Cæterum Dogmata aliorum de iisdem rebus consideremus paulisper. Luminis quænam est causa efficiens? *Lumen* (dicit aliquis) est corpus cujus particula exeuntes e Sole, penetrant oculos animalium, unde vident. Quidni eadem facilitate & veritate dicant etiam tenebras esse corpuscula, quæ exeuntia ab aliquo corpore tenebroso & delata ad oculos faciunt ut non videant. *Lumen* (dicit alius & magis accedens ad veritatem) est inclinatio ad motum. Sed id quod jam est ad motum inclinatio, quid impedire potest ne non sit ipse motus? Si quæras quæ sint Causæ Rari & Densi, dicit alius quod idem corpus, quo plus quantitatis habet, eo Rarius, quo minus eo Densius esse. Sed quæris (puto) tu qua de causa, & quo pacto effici potest, ut idem numero corpus, idest corpus sibi semper æquale, possit habere quantitatem modo minorem, modo majorem.

B. Ego vero id non quæro. Scio enim quod est impossibile. Sed corpora videmus modo augeri, modo diminui, quæ tamen eadem esse dicimus.

A. Non autem idem numero corpus esse possunt, nisi idem esse sentias Totum & Pars. Sed hæc nihil attinent ad Densum & Rarum.

An.

An putas idem vas plenum Aquæ majus minusve esse quam si plenum esset quocumq; alio corpore?

B. Minime profecto.

A. Quidam ex Philosophis hujus seculi causam Rari & Densi explicat hoc modo. Si dato corpori immisceatur quantitatis plus, fit Rarum; si minus, Densum.

B. Nullus omnino est Effectus naturalis cujus causa non facillime sic expediatur, & eodem modo quo Pharmacopola temperant sua Pharmaca ad præscriptum Medicorum. Recipe Corporis puri ad libitum; Gravitatis gradus octo; quantitatis paululum; Coloris flavi quantum sufficit; Misce. Fiat aurum. Lepidam narras Philosophandi Methodum.

A. Et eam quidem Philosophiæ reformatæ. Vide jam antiquiorem, Quæritur quanam sit Causa quod Magnes ferrum ad se trahit. Respondetur, per *Συμπάθεια*. Quæritur rursus, Quid est *Συμπάθεια*. Respondetur, Occulta qualitas. Quæritur etiam, Quid est, Occulta qualitas. Respondetur, Quam nescimus. Nonne ad primam interrogationem melius responsum esset, Nescio?

B. Minime sane. Sic enim visi fuissent cum jactura aliqua auctoritatis suæ nihilo plus sapere quam vulgus hominum.

A. Ira est. Respexerunt ergo ad utile deserta honestate.

B. In Politica autem, quis unquam ante illum, tantum Summis Imperantibus Juris attribuit, ut quicquid illi jusserint, eo ipso quod jusserint, sine injuria esset?

A. Imo vero, quæ Civitas unquam extitit ubi Summo Imperanti minus Juris concessum est. Civitatis Romanæ Imperium Summum quis Jure habuit?

B. Ipsa quidem Civitas semper, Civitatis autem munus exequabatur modo unus modo alius, & post *Tarquinium*, ante *Cæsarem*, Senatus Populusq; *Romanus*.

A. Legistin' unquam quod *Roma* pro injuria habitum sit, quod de Cive *Romano* constituisset Senatus populusq; *Romanus*?

B. Non memini.

A. Cur ergo injuriam nominaremus nos, id quod constitueret Senatus populusq; *Anglicanus*?

B. Non faceremus, sed quod unus homo vel pars aliqua populi juberet non dubitaremus aliquando injustum dicere.

A. Quid autem intelligis per *Injustum*?

B. Id quod factum est contra Leges.

A. Quid sunt Leges?

B. Jussa Civitatis, id est, jussa Curiz sive Cætus illius qui a Civibus

vibus eligitur, ut totam Civitatem repræsenter. Non enim pars millesima Civium Romanorum potuerunt in forum convenire.

A. Non ergo ille unus homo, aut pars populi habebat Imperium Summum.

B. Minimè.

A. Nondum ergo ostendisti injustum esse habitum quod factum est a Summo Imperante, sed tantum sententiam tuam de Forma Regiminis summi subindicasti, de qua hoc loco disputare nolo. Dicam tantum, quod est verissimum, si singuli Cives representari se jusserint ab uno homine, & per consequens, illius esset Imperium Summum, id quod ille jusserit non minus pro justo habendum esse, quam si idem jussisset Senatus & Plebs eandem habentes auctoritatem. Nihil ergo in Politica peccavit certè hætenus.

B. Nihil profecto. Sed Parturit jam *Anglia*, & hoc ipso die speratur nascitura Pax & Imperium firmum. Quod nisi *Justitia Libra Gladius Belli*, & *Virga schola* in eadem sint manu, diuturnum esse vix potest.

A. Finem ergo sermonibus nostris tandem imponentes, si placeat surgamus, & precemur Deum, ut illis qui de Imperio *Anglia* nunc deliberant, id deceant quod ad ipsius gloriam amplificandam, & ad statum Civitatis confirmandum erit convenientissimum; maxime verò ut velint Imperium in eum locum, unde avulsus est, restituere.


B. Amen.

FINIS.


Quæ sequuntur, Corrediones quædam sunt libri de Corpore Latinè editi, quorum corrediones ex Editione *Anglica* hic apponuntur, eo fine ut liber ille, si cui dignus videbitur aliquando qui operâ sua, unâ cum cæteris Sectionibus denuò imprimatur, veniat in manus Lectorum emendationi. Si vero non videbitur, quid mea qui abeo?


In locum Capitis decimi octavi substituat quod sequitur.

De



Ad fin: dialo: 6 fig: 1





Ad fin: Dialo 6: fig: 3



De Rectarum & Paraboliformium linearum Æquatione.

1. *Data linea Parabolica aequalem exhibere rectam.* 2. *Data linea curva Parabolæstri primi, sive Parabola cubiformis, rectam invenire aequalem.* 3. *De rectis inveniendis cæteris ex genere Parabolico curvis lineis aequalibus methodus Generalis.*

1. Data lineæ Parabolicæ æqualem exhibere rectam.

Sit linea Parabolica data ABC (*Fig. 1.*) & inventa diameter AD. Ducatur basis DC, & compleatur Parallelogrammum ADCE; jungaturque AC, & divisâ AD bifariam in F, ducatur FH æqualis & parallela rectæ DC, secans AC in K, & lineam Parabolicam in O. Deinde inter FH & FO sumatur media proportionalis FP, ducanturque rectæ AO, AP & PC. Dico duas rectas AP & PC simul sumptas æquales esse lineæ Parabolicæ ABOC.

Nam linea ABOC cum sit Parabolica, generata est a concursu duorum motuum, altero uniformi ab A ad E, altero eodem tempore uniformiter accelerato a quiete in A ad D. Cum autem motus ab A ad E sit uniformis, potest AE repræsentare tempora utriusque motus. Sit ergo AE Tempus; quare rectæ in Semiparabola Ordinatæ designabunt partes temporis in qua corpus quod describit lineam ABOC est in unoquoque ipsius puncto, ita ut quemadmodum in fine temporis AE vel DC corpus illud est in C; ita in fine temporis FO erit in O. Et quoniam Velocitas in AD crescit uniformiter, id est in ratione temporum, eadem Ordinatæ in semiparabola designabunt perpetua incrementa Imperiûs, donec fiat maximus, qui maximus Immetus designatur a base DC. Itaque supposito quod motus sit uniformis, corpus quod est in A, tempore FK, propter concursum duorum motuum uniformium in AF & FK, movebitur uniformiter in AK. Et KO erit incrementum Imperus (vel velocitatis) acquisiti tempore FK; & AO describetur uniformiter a concursu duorum motuum uniformium per AF & FO, in tempore FO. A puncto O ducatur OL Parallela rectæ EC, secans AC in L; & IN parallela DC, secans EC in N, & lineam parabolicam in M, & producat ex altera parte ad AD in I; eruntque IN, IM, & IL (per
con-

constructionem parabolæ) in ratione continua , & æqualis tribus rectis FH, FP, & FO singulæ singulis ; & recta quæ sit recta EC parallela transiens per M, incidet in P, & proinde OP erit incrementum Impetus acquisiti tempore FO vel IL. Postremo producat PM ad CD in Q, eritque QC, vel MN, vel PH incrementum Impetus proportionale tempori FP, vel IM, vel DQ. Supponatur jam motus uniformis ab H ad C in tempore PD. Quoniam ergo in tempore FP motu uniformi, & Impetu crescente in ratione temporum describitur recta AP, & reliquo tempore & Impetu, nimirum tempore & Impetu PH, describitur CP uniformiter, sequitur totam lineam APC descriptam esse Impetu toto, & tempore eodem in quo describitur linea Parabolica ABC. Quare linea APC composita ex duabus rectis AP & PC æqualis est lineæ parabolice ABC. Inventa est ergo recta æqualis curvæ lineæ semiparabolæ. Quod erat faciendum.

2. Lineæ curvæ Parabolæstri primi, sive Parabolæ cubicæ, invenire æqualem rectam.

Sit ABC (Fig. 2.) linea curva Semiparabolæstri primi; AD diameter; DC basis; compleaturque parallelogrammum ADCE, cujus diagonalis sit AC. Secetur diameter bifariam in F, ducaturque FH æqualis & parallela DC, secans AC in K, & curvam in O & rectam EC in H. Deinde ducatur OL parallela EC, secans AC in L, ducaturque LN parallela basi DC, secans curvam in M, & EC in N, producatque ex altera parte ad AD in I. Postremo, per punctum M ducatur PMQ parallela & æqualis HC, secans FH in P, junganturque CP, AP, & AO. Dico duas rectas AP & PC simul sumptas æquales esse curvæ ABOC.

Nam linea ABOC, cum sit linea curva Semiparabolæstri, generata est a concursu duorum motuum altero uniformi ab A ad E, altero eodem tempore accelerato a quiete in A ad D, ita ut Impetus crescat in ratione triplicata ejus secundum quam crescunt tempora, sive (quod idem est) longitudines transcurse sunt in ratione triplicata temporum quibus transcurruntur. Nam ut Impetus sive Velocitates crescunt, ita crescunt etiam transcurse longitudines. Et quoniam motus ab A ad E est uniformis, recta AE potest representare Tempus, & per consequens, rectæ ordinatim applicatæ in Semiparabolæstro, designabunt partes Temporis, in quo corpus incipiens a quiete in A, motu suo describit lineam ABOC. Et quia DC, quæ representat Impetum acquisitum maximum æqualis est ipsi AE, eadem ordinatæ representabunt singula incrementa Impetus crescentis a quiete in A. Itaque si supponatur motus uniformis ab A ad F in tempore FK, describetur a concursu duorum motuum uniformium

formium per AF & EK, linea AK uniformiter; & RO est incrementum Impetus pro tempore; & per concursum duorum motuum uniformium per AF & FO, describetur Linea AO uniformiter. Per punctum L ducatur recta LMN parallela DC, secans rectam AD in I, curvam ABC in M, & rectam EC in N; & per punctum M rectam PMQ parallelam & aequalem AC, secans DC in Q, & FH in P. Itaque a concursu duorum motuum uniformium per AF & EP, in Tempore FP describetur uniformiter recta AP. Et LM vel OP erit incrementum Impetus addendum pro tempore FO. Et quia ratio IN ad IL triplicata est rationis IN ad IM, ratio FH ad FO erit etiam triplicata rationis FH ad EP. Et Impetus acquisitus tempore FP est PH. Itaque cum FH sit aequalis PC quæ designabat Impetum totum acceleratione acquisitum, nullum amplius Impetus incrementum computandum est. Jam in tempore PH si supponatur motus uniformis ab H ad C, describetur uniformiter a duobus motibus per CH & HP uniformibus recta linea PC uniformiter. Cum ergo duæ rectæ AP & PC descriptæ sint tempore AE cum eodem incremento Impetus, quò curva linea ABOC describitur eodem tempore AE, id est cum linea composita a rectis AP, PC. & linea ABOC transcurra sit ab eodem corpore eodem tempore, & aequali velocitate, ipsæ lineæ erunt æquales. Quod erat demonstrandum.

Eadem Methodo recta linea inveniri potest æqualis lineæ curvæ cujuscunque Semiparabolæ eorum quæ disponuntur in Tabella Articuli 3ⁱ Capitis 17ⁱ; nempe, secando Diametrum bifariam, & procedendo ut antè.

Cap. 4. Art. 4.

1. antepenultima dele itaque. 1. ultima pro necessarius non est lege necessaria.

Cap. 5. Art. 2.

1. 9. pro ut Nomen copuletur cum Oratione scribatur ut Nomen Rei copuletur cum Nomine Orationis. 1. 27. pro Corporis scribatur Rei. & pro cum Oratione scribatur cum Nomine Orationis.

Cap. 14. Art. 12.

1. 6. inter ipsarum & Angulos interpone ad easdem partes.

1. 15. pro erunt BE, DF æquales scribatur erunt anguli EBA, FDC æquales.

1. 19. pro non ergo interceptiuntur parallela scribatur non erunt ergo Anguli EBA, FDC æquales.

Bb

Cap.

Cap. 14. Art. 14.

l. 10. pro si jam. &c. usque ad finem paragraphi scribatur si jam punctum A intelligatur moveri uniformiter per AB, & eodem tempore punctum B moveri ad C, & omnia puncta F, D, B moveri uniformiter & aequali inter se velocitate per FG, DE, BC, punctum B percurrat BH (aequalem FG) eodem tempore quo punctum A percurrit AF. Et erit ratio AF ad FG ut illius velocitas ad huius velocitatem. Et quando A est in F erit D in K; & quando A est in D erit D in E. Et ut punctum A transit per F, D, B, ita B transit per H, I, C. Et rectae FG, DK, KE, BH, HI, IC sunt (propter parallelismum) aequales. Quare ut velocitas per AB est ad velocitatem per BC, ita est AB ad BC. Id est, singula parallela erunt ad partes a Vertice abscissas ut AF ad FG. Itaque AF. FG :: AD. DE; : AB. BC sunt proportionales.

Cap. 16. Art. 1.

lineis tribus ante finem, inter semissem & Nam interponantur haec verba, alterum, semissem Impetus maximi.

Coroll. 3. Art. 4.

l. 1. pro in motu uniformiter accelerato scribatur in motu ita accelerato, ut Impetus crescat in ratione Temporum duplicata.

Cap. 19.

pro ultimis verbis demonstrabitur Capite proximo sequente Articulo tertio scribatur demonstrabitur alio loco.

Cap. 20.

Paragraphus post finem Coroll. Art. 2. incipiens per scio deleatur. ad finem Consecrarii Art. 3. verba illa & laudes, &c. deleantur.

Cap. 23. Art. 9.

Novem lineis ante finem, pro qua rationes sunt, &c. usque ad finem Paragraphi, scribatur. Sed ratio AL ad AZ componitur ex rationibus AL ad BZ & BZ ad AZ. Jam ratio BZ ad AZ est ratio ponderum reciproca, id est ponderis CIAPE ad pondus CDFE. Itaque ratio reliqua AL ad BZ, id est LB ad BZ est ratio momenti ponderis CDFE ad momentum ponderis CIAPE. Sed ratio AL ad BZ componitur ex rationibus AL ad AZ, & AZ ad BZ, quarum rationum ea qua est AZ ad BZ, est ratio ponderis CDFE

ad

ad pondus CIAPE. Quare (per Articulum quintum) reliqua ratio AL ad AZ est ratio distantiarum punctorum Z & L a Centro Libræ, quod est A. Quare (per Art. 6.) pondus CIAPE æquilibratum erit super rectam OZ. Est ergo OZ altera diametrorum æquilibrii ponderis CIAPE. Sed altera ejusdem ponderis diameter æquilibrii est recta AB. Quare (per Def. 7.) punctum Z est centrum gravitatis ponderis CIAPE quod punctum (per constructionem) dividit axem ita ut pars AZ qua est ad Verticem, sit ad partem reliquam BZ, ut Figura completa CDFE ad Figuram Discrepantem CIAPE. Quod erat demonstrandum.

Books written by this Author besides these Dialogues.

- In Latine { 1. *De Corpore*. The same in English with 6 Lessons to the Professors of Geometry in Oxford.
 2. *De Homine*.
 3. *De Civitate*.

- In English — 1. *Leviathan*.
 2. *Marks of the Absurd Geometry*, &c. of John Wallis Professor, &c.
 3. *Of Liberty and Necessity* against Bishop Bramhall.

(731)

BRITISH MUSEUM



BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

- Cap:




fig. 1.

Ad fin. lib:

XVIII




fig. 2.

Ad fin. Dialo: 5'

